

Deschwanden, G. V.

1902.

Thesis

Bern

1902

Klinische Beiträge
zur
Aether-Narcose.

LANG MEDICAL LIBRARY
300 PASTEUR DRIVE
PALO ALTO, CALIF. 94304

Inaugural-Disertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
einer
hohen medizinischen Fakultät zu Bern

vorgelegt von
Gallus v. Deschwanden
prakt. Arzt in Kerns.



Sarnen
Druck von Josef Müller
1902.



Klinische Beiträge
zur
Äther-Narcose.

Inaugural-Disertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

einer

hohen medizinischen Fakultät zu Bern

vorgelegt von

Gallus v. Deschwanden

prakt. Arzt in Kerns.



Sarnen

Druck von Josef Müller

1902.

Von der medizinischen Fakultät in Bern zum
Drucke genehmigt auf Antrag von Herrn Professor
Dr. Kocher.

Bern, den 12. November 1902.

Prof. Dr. Langhaus

Dekan der Fakultät.

Herrn Dr. med.

Fr. Dumont

Dozent für Chirurgie in Bern

gewidmet

vom Verfasser.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Wohl der segensreichste Fortschritt des letzten Jahrhunderts in der Chirurgie war die Einführung der Anaesthetie. Denn zweifellos wäre die Chirurgie auch mit Hülfe der Anti- und Asepsis nie zur jetzigen Höhe gelangt, hätte sie nicht in der Narkose ein Mittel gehabt, auch die schwersten Eingriffe am Kranken ohne Schmerzempfindung ausführen zu können.

So gross aber auch für die leidende Menschheit der Segen der Anaesthetie war, so schwer zeigte sich für den die Anaesthetie erzeugenden Arzt gar bald die Verantwortung, die mit der Ausübung des schönsten Zweiges seiner Tätigkeit: der Schmerzesstillung verbunden war. Die Beobachtung, dass die anaesthetisierenden Mittel die schlimmsten Folgen für die Patienten haben konnten, machte die Aerzte vorsichtig, ja ängstlich in der Anwendung derselben und der praktische Arzt, der noch vor wenig Jahren fast ausschliesslich auf das Chloroform angewiesen war, betrachtete die ihm unentbehrliche Chloroformmaske mit einer gewissen Scheu und jedesmal, wenn er sie brauchte, sei es das hunderste oder gar das tausendste Mal in seiner praktischen Tätigkeit, tat er dies mit Furcht, wusste er doch, dass trotz sorgfältiger Untersuchung der innern Organe, besonders des Herzens, trotz normalen Befundes, trotz Anwendung aller Kautelen nach wenigen Atemzügen das Herz des Narkotisierten stille stehen konnte — stille stehen für immer.

Es ist deshalb leicht begreiflich, dass seit der Entdeckung der Aethernarkose durch die beiden Amerikaner Jackson und Morton im Jahre 1846 und der Chloroformnarkose durch Flourens und Simpson im Jahre 1847 in der medizinischen Welt ein beständiger Kampf sich bildete für das eine oder andere Mittel und dass hiebei namentlich die

grössere oder geringere Gefährlichkeit in den Vordergrund trat. Es ist auch begreiflich, dass man nach neuen Mitteln und Methoden suchte, um die Narkose möglichst gefahrlos zu machen und dass man in den sog. Mischnarkosen verschiedene Mittel zu kombinieren suchte.

Durchgehen wir die sehr zahlreiche Litteratur, die über allgemeine und lokale Anaesthesia existiert, so kommen wir zum Schlusse, dass diese Frage noch keineswegs endgültig gelöst ist, dass wir ein unschädliches „Idealanaestheticum“, das in allen Fällen und unter allen Umständen angewendet werden kann, nicht besitzen und wohl nie besitzen werden, sondern dass der Arzt wie in allem seinem Tun darauf angewiesen ist, sorgfältig zu individualisieren und nach Berücksichtigung aller Umstände das geeignete Mittel zu wählen.

Aus diesem Grunde dürfte es sich rechtfertigen, trotz der grossen Litteratur zu den vielen „Beiträgen zur Narkose“ noch einen weiteren Beitrag zu liefern und an Hand einer sehr grossen Anzahl von Aethernarkosen einige Gesichtspunkte über diese Narkose zu erörtern.

Es würde zu weit führen, hier auf das Geschichtliche der Aethernarkose näher einzutreten. Es sei uns nur gestattet, kurz das „Schweizergeschichtliche“ zu erwähnen. Die Aethernarkose wurde in der Schweiz zuerst von Demme¹⁾ im Inselspital in Bern angewendet und zwar „bei der Operation eines bösartigen Nagelgeschwürs, eines Lippenkrebses und der Extirpation einer Halsgeschwulst.“ Die Erfolge waren nicht sehr befriedigende infolge zu komplizierter Methode der Darreichung. Demme konstruierte dann einen eigenen Apparat und war von da an mit den Narkosen zufrieden.

Ausser Demme haben auch die HHr. W. Emmert und Bourgeois im Inselspital ätherisiert. Unangenehme Zufälle wurden nicht beobachtet. Sowohl Demme als Bourgeois haben in Aethernarkose den Thermokauter angewendet. In Lausanne konstruierte auch Mathias Major eine Vorrichtung zum Ätherisieren: unter ein Wachstum wurde eine Schale mit Äther gebracht, der verdampfte und eingeatmet wurde. Wie fast überall im Ausland, so wurde auch in der Schweiz der Äther bald durch das Chloroform-

¹⁾ Fucter Aethernarkose.

verdrängt. Erst im Jahre 1877 fing Julliard in Genf infolge eines Chloroformtodes¹⁾ wieder mit der Aethernarkose an. Im Februar 1891 veröffentlicht Julliard in der „Revue médicale de la Suisse romande“ seine Ansichten und Erfahrungen über die Aethernarkose unter dem Titel: *l'éther est-il préférable au chloroforme?* Die Antwort fällt sehr zu gunsten des Aethers aus. Wie sehr der Aether vergessen war und wie sehr man sich an das Chloroform gewöhnt hatte, geht aus dem Umstand hervor, dass Julliard in Genf beinahe 10 Jahre mit vollem Erfolge die Aethernarkose anwendete, ohne dass in der übrigen Schweiz auch nur ein Versuch damit gemacht wurde; Julliard schreibt deshalb in der „Revue“ mit Recht auch in Bezug auf die Narkose: „il est difficile de dépouiller le vieil homme et de revêtir l'homme nouveau.“

Im Jahre 1885 fing Roux in Lausanne an, zu ätherisieren und war damit sehr zufrieden. Er veröffentlichte seine Ansicht über die Aethernarkose im Jahre 1888 im „Korrespondenzblatt“ Nr. 18, wo er zum Schlusse sagt: *on peut revendiquer en faveur de l'éther une plus grande sécurité pour le malade, la rapidité de la narcose et la quiétude pour l'opérateur.*

Im Jahre 1886 wurde Dumont bei Anlass eines militärischen Operationskurses auf die Aethernarkose aufmerksam. Er schreibt darüber im „Korresp. f. Schw. Aerzte“, Jahrg. XVI, Nr. 21: „Die chirurgische Klinik wurde täglich besucht. Was uns dabei bald auffiel, war die Aethernarkose. In Genf wird, wie in Lyon, bei den Operationen stets Aether verwendet und das Chloroform seiner Gefahren wegen bei Seite gelassen oder nur auf gewisse Fälle verspart, bei denen der Aether geradezu contraindiciert ist. Wir gestehen offen, dass der erste Eindruck der Aethernarkose bei uns, die wir mit dieser Methode nicht vertraut waren, kein günstiger war. Das stertoröse Atmen der Patienten, die bald eintretende Cyanose, waren Symptome, die bei der Chloroformnarkose gerade gefürchtet sind und wir konnten uns anfangs nicht recht vorstellen,

¹⁾ P. Campiche. Contribution à l'étude de la narcose à l'éther. Julliard, l'éther est-il préférable au chloroforme?

dass dieselben beim Aether nichts zu bedeuten hätten. Als wir dann täglich solche Narkosen rasch und ohne jeden Zwischenfall verlaufen sahen, als uns Prof. Julliard in einer Extraklinik die Gründe auseinandersetzte, warum er das Chloroform bei Seite lasse und den Aether vorziehe, und als er uns endlich mittheilte, dass seit ca. 12 Jahren, da er diese Methode der Narkose benutze, er noch nie einen exitus erlebt habe, da machte sich eine deutliche Umstimmung zugunsten des Aethers bei uns geltend und mancher unter uns nahm sich damals vor, die Sache im eigenen Wirkungskreise später zu probieren.“ Dumont wendete sodann den Aether bei seinen chirurgischen Fällen im Spital Salem in Bern überall da an, wo keine Contraindication vorlag und wurde bald ein ausgesprochener Freund des Aethers. Es erhoben sich natürlich die Anhänger des Chloroforms gegen ihn und brachten eine Menge Einwendungen, auf die wir später eingehen werden, gegen den Aether vor.

An der Versammlung des ärztlichen Centralvereins in Olten im Jahre 1887 erklärte sogar Kappeler, er halte die Anwendung des Aethers zur Narkose für einen bedenklichen Rückschritt in der Chirurgie. Im Jahre 1888 berichtete jedoch bereits Fueter in seiner Arbeit: Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Aethernarkose über 170 Fälle, machte auf die günstigen Resultate aufmerksam und widerlegte eine Anzahl Einwände.

Professor P. Müller in Bern versuchte den Aether ebenfalls und es erschien im Jahre 1870 aus Müllers Klinik eine Arbeit von Howald über die Aethernarkose in der Geburtshilfe und Gynaecologie. Wir kommen später auf die Arbeit zurück.

Eine wichtige und interessante Arbeit erschien sodann im Jahre 1895 von Alfr. v. Lerber, Assistent am Salem, über die Einwirkung der Aethernarkose auf Blut und Urin. Die darin aufgestellten Thesen finden durch die klinische Beobachtung ihre volle Bestätigung. An der chirurgischen Klinik des Herrn Professor Kocher in Bern fand der Aether zuerst Anwendung in der Mischnarkose mit Chloroform. Kocher leitete die Narkose mit Chloroform ein und unter-

hielt sie mit Aether. In seiner 4. Auflage der Operationslehre vom Jahre 1902 sagt nun Kocher ausdrücklich: „Das normale Verfahren bei der Narkose ist gegenwärtig das Aetherisieren und zwar in allen Fällen, wo nicht eine Behinderung der Atmung oder eine Affektion der Atmungsorgane vorliegt.“

Auch Kappeler bekehrte sich bald zum Aether und seine Pulsuntersuchungen sind von grossem Werte gewesen für die Erklärung der Mindergefährlichkeit des Aethers gegenüber dem Chloroform. Kappeler sagt, dass bei seinen Pulsuntersuchungen unter den verschiedenen Anaesthetics der Aether die günstigsten Bedingungen aufweise, indem er zwar auch gefässerschlaffend wirke, aber weit weniger intensiv als das Chloroform. Ein syncopischer Aethertod würde dabei weniger häufig sein, als ein syncopischer Chloroformtod.

Im Jahre 1890 sagt Kappeler im „Archiv Langenbeck“ p. 848: Bei einer solchen Statistik (Stat. die Narkose mit Chloroform und Aether von Bartholomeu) wird allerdings für die Beteiligten nichts anders übrig bleiben, als vom scharfen Messer, dem Chloroform, zum stumpfen, dem Aether, überzugehen oder das Anaesthesieren bleiben zu lassen.

Nach hartem Kampfe mehrten sich also die Freunde des Aethers, indem Versuche und Beobachtungen zeigten, dass derselbe weniger gefährlich sei als Chloroform. Prof. Dr. C. Garré sagt in seinen „Mitteilungen aus chirurg. Klinik“ zu Tübingen v. d. 1891 Nr. 7: „Ich gestehe gerne, dass ich viel ruhiger an eine Operation herantrete, wenn ich den Patienten in Aethernarkose weiss, als wenn Chloroform angewendet wird. So war denn auch Dumont, trotz sorgfältiger Individualisierung, meistens in der Lage, bei seinen Operationen Aether statt Chloroform anzuwenden und die Zahl seiner Aethernarkosen seit dem Jahre 1886 beträgt nicht weniger als 2850. Dumont hat uns diese Fälle in sehr zuvorkommender Weise für unsere Arbeit zur Verfügung gestellt und wir sprechen ihm hierfür den wohlverdienten Dank aus. Wir stellen sämtliche Fälle nach dem Julliardschen Schema tabellarisch zusammen und werden an Hand der Zahlen unsere Schlüsse ziehen.

Nr.	(Geschlecht)	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1	M	23	Synovitis purulenta genu	Incis n. Auswch. d. Gelenkes	85	5	35	230	Erbrechen.	Starke Excitation.
2	M	63	Contraction des Beines n. Pirogoff	Tenotomie d. Biceps	85	5	19	150	—	Trotz Potator N. sehr gut.
3	W	62	Abscesse d. Weichteile des In- cisions	Incision	85	11	35	175	—	Empysem. sehr gut.
4	W	25	Unguis incarnatus	Entfernung	85	4	5	120	—	—
5	W	18	Coxitis tuberculosa	Resectio Coxl.	85	7	89	225	—	Sehr g. N. rasch. Eintritt.
6	M	34 $\frac{1}{2}$	Überstandene Osteomyelitis	Nekrotomie d. l. Tibia	180	20	50	225	Erbrechen.	Sehr schwacher Puls.
7	M	67	Abscess	Incision	120	9	19	180	do.	—
8	W	47	Carcinoma mammae	Amput. mammae mit Achsel- höhlenausräumung	65	5	94	130	—	—
9	W	18 $\frac{1}{2}$	Ostitis condyli int femor	Igni punctur	100	8	50	150	—	—
10	M	34	Bursitis praepalearialis sin	Excision	150	13	45	175	—	—
11	M	46	Bursitis do.	do.	100	12	53	235	5 Std. langer Schlaf.	Potator.
12	M	50	Periostitis tibiae	Nekrotomie	90	15	37	150	—	—
13	W	16 $\frac{1}{2}$	Nekro e des Endphalanx d. r. Mittelfingers	Totalresection d. Phalanx	60	8	18	100	2 mal Erbrechen.	Cyanose.
14	M	61	Rechtseitig Leistenhernie	Radicaloperation	125	10	20	160	—	—
15	M	37	do.	do.	75	10	53	240	Durst & Kop weh.	—
16	W	52	do.	do.	135	13	40	175	—	—
17	M	19	—	Nervendehnung & redresso- ment forcé.	90	10	49	190	—	Cornealreaction stets er- halten.
18	M	52	—	Exarticulatio metacarpo phalang.	75	10	32	155	—	—
19	M	64 $\frac{1}{2}$	—	Abliatio cruris	150	24	38	225	—	—
20	M	19	Caries ossis ilei	Ausratzung	60	8	40	115	Erbrechen 2 mal.	Collaps. Erholt sich.
21	M	69	Epididymitis tuberculosa	Castration	25	6	51	150	—	—
22	W	32 $\frac{1}{2}$	—	Uterus exstirpation	80	7	140	400	—	—
23	W	—	Abscess cruris	Ausräumung	40	9	26	125	—	—
24	M	9 $\frac{1}{2}$	—	Nachresection genu	50	4	57	90	2 mal Erbrechen.	Sehr gute N. ohne Wü- rgen oder Erbr.
25	M	19 $\frac{1}{2}$	—	Igni punctur ossis cuboidei	100	11	5	160	Erbrechen.	—
26	M	49	Abscess	Incision & igni punctur	70	9	23	90	—	—
27	M	19	Hirngehirnhautentzündung	Resectio cranii	70	6	85	160	Erbrechen, Zittern.	Sehr schwacher Puls.
28	M	11	Bursitis tub.	Excision	50	5	30	125	2 mal Erbrechen.	—

29	M	68	—	Ablatio antebrachii.	60	6	43	140	Starkes Zittern nach u. während d. Operation.	—
30	M	73	Tuberkulöse epidid.	Castratio,	50	18	72	160	Erbr., 1 mal während 3 mal n. d. Op.	—
31	M	49	Erfrierungsgangrän der Zehen	Ablatio.	50	8	25	140	—	N. d. Op. Temp. 35,5.
32	M	19	Unguis inc.	Entfernung.	70	9	6	70	Starkes Zittern.	—
33	M	50	Hydrocele	Radical-Op.	60	12	56	130	Erbrechen 1 1/2 Std. nach N. d. Op.	Temp. 35,8.
34	M	40	Epidid. tub.	Doppel-Castration.	100	9	96	270	—	—
35	M	54	Abcess am Fuss	Incision.	125	13	35	170	Leichtes Erbrechen.	—
36	M	34	Caries pollicis	Necrotom.	125	14	24	135	2 m. Erbr. post. Op.	—
37	M	25	Necrosis metatarsi	Ausräumung.	110	8	57	200	Erbr. w. u. nach d. Op.	—
38	M	20	Caries d. Hüftgelenkes	Resektion	60	4	24	135	Etwas Erbr. n. d. Op.	—
39	M	14	Periostitis process mastoid	Incis.	50	4	22	100	—	—
40	W	—	Arthritis fungosa pedis	Ablatio supramall.	60	3	68	165	—	—
41	M	14	Nekrosis proc. mastoid.	Evidement.	50	2	30	100	—	—
42	W	21	Arthritis fungosa coxae	Resectio coxae	100	4	87	305	2 mal Erbr.	Zittern.
43	W	12	Art. fung. ped.	Res. tali, calcanei maricuaris cuboidei.	30	2	77	115	Brechreiz	Puls aussetzend, Diarrhö
44	W	5	Ohreiterung	Untersuchung.	30	1	25	60	Nachh. Erbrechen.	—
45	W	75	Nekr. d. Endphal. des r. Mittelfingers.	Nekrotomie.	75	12	15	105	—	—
46	M	47	Gangrän d. 2. r. Zehe.	Exartic.	40	9	28	50	Zittern.	—
47	M	27	Arthritis fung. genu.	Resectio genu	75	5	90	175	do. Erbr.	w. d. Op. Zittern.
48	M	14	Nekrosis proc. mast.	Eröff. d. Proc.	35	1	72	160	2 mal Erbr. n. d. Op.	2 Exitationsstadien.
49	W	26	Nekrosis capitis metatars I.	Nekrotomie.	65	8	33	100	do.	Herzfehler
50	W	17	Ung. incarn.	Entfernung.	75	4	5	75	Leichtes Erbrechen.	—
51	M	7Mo.	Doppeldarmen.	Ablatio.	15	1	8	20	—	—
52	W	16	Lymphad. coll.	Inc. v. Nach-Res d. Fussgelenkes	30	3	45	130	—	—
53	M	53	—	Transpl. nach Thiersch.	130	15	25	130	Zitt. 2 m Erbr. n. d. Op.	Potator.
54	W	18	Ung. incarn.	Excision.	50	2	15	125	Erbrechen.	Patientin vorh. gegessen
55	M	57	—	Lisfranc'sche Ampu.	125	7	45	200	Potator. Starke Exitation.	—
56	M	55	—	Res. cubiti.	60	6	69	195	—	—
57	W	19	Ung. inc.	Excision.	40	2	10	60	—	—
58	M	23	Fractura cruris.	Repos. u. Gypsverb	40	2	20	75	1 m. Erbr. Schwäche. Zittern.	—
59	W	64	Ostitis tali et navic.	Excis. part. tali. et totalis navicul.	50	4	66	215	1 St. n. d. Op Erbr.	—
60	M	55	—	Ablatio pedis.	65	7	63	210	2 " " " 2 Erbr.	—
61	W	12	Abcess am Fuss	Auskratzen.	35	2	19	50	3 m. n. " " d. Op.	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Nark.	Eintritt d. Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
62	M	4 Mo.	Hernia inguin. inc.	Herneotomie	50	4	43	134	Vorher Bronchitis, nachher etwas stärker.	—
63	M	3	Paralysis infant.	Achillotenotom.	30	2	14	45	—	—
64	M	70	r. Leisten hernie	Herniotomie	50	3	75	175	1 mal Erbr.	Potator.
65	M	21	Abscess	Ausräumung	60	5	20	90	—	—
66	W	16	Arthrit. fung. genu	Ablatio femoris	35	2	75	100	—	Hochgradig-Rach.
67	W	24	"	do	25	3	65	115	—	Vorh. allgem. Schwäche.
68	W	65	—	Resectio partial. calcanei	65	5	38	80	—	—
69	M	—	Phimosis congen.	Spaltung	50	6	22	60	—	—
70	M	4 1/2	Hernia ignis	Radicalop.	25	1	60	50	2 m. Erbr. n. d. Op.	—
71	M	22	Hydrocele sin.	Spaltung und Excis	80	5	45	110	Erbr. n. d. Op.	—
72	M	1	Phimosis congen	Spaltung	25	1	15	25	—	—
73	W	16	—	Resectio cub. dext.	30	2 1/2	70	70	Öftr. Erbr., hochgr. Cyan.	—
74	M	4	Nekrosis calcan.	Resectio part. cate	10	1	30	25	Zittern.	—
75	M	65	Hydrocele sin.	Radicalop.	65	7	70	125	—	—
76	W	59	Hernia ing. incarc.	Herneotomie	35	4	85	140	—	—
77	W	59	Nekrosis metacarpi III	Resectio	45	4	60	60	—	—
78	M	27	Nekrosis tib.	Necrotomie	60	5	60	100	—	—
79	W	20	Res. coxae sin.	Untersuchung	50	4	25	50	Schleimbr. n. d. Op.	Bei Beginn fadenförmiger Puls bis 164.
80	W	20	—	Exartic. ex.	40	5	90	100	—	—
81	M	16	Humerus fract.	Repos. und Verband	40	2	20	50	—	—
82	W	53	Carcinoma ovarii urinsque	Doppelovarectomie	50	2	75	125	Nur Brechbewegungen.	—
83	M	48	Ostit. cap. tib.	Inc. ignipunctur	70	5	17	90	—	Potator.
84	W	59	Hernia crural. incar.	Herneotomie	75	5	50	100	Erbr. n. d. Op.	Herzfehler.
85	M	55	Phimosis cong.	Spaltung	75	6	45	125	—	—
86	M	21	Nekrosis tib.	Necrotomie	80	10	60	100	Zittern.	—
87	M	40	Hernia crur. inc. m. Gangrän.	Darmresection 20.5 cm	60	4	90	200	—	Morphinist.
88	M	21	Bursitis supr. ex. digit. ped.	Excision	50	2	35	75	Erbr., Kopfweh.	—
89	M	20	Phlegmone ped.	Incision; drain.	45	3	30	70	—	—
90	M	42	Hernia inguin.	Radicalop.	50	2	105	175	Starker Reizhusten mehrere Tage.	Emphysema.
91	W	58	Hernia crur. inc.	Herneotomie	30	1	60	75	Sehr starke Cyanose, unregelmässige Atmung.	Bestehende heftige chron. Bronchitis, nachh. nicht schlimmer.

92	M	14	Fissura ani.	Spaltung	30	2	10	30	—	—
93	M	54	Nekrosis phalang II pollicis	—	50	2	20	50	—	—
94	W	37	Otitis media	Eröffn d. Proc. mast.	50	1	35	110	—	Trotz furchtbarer Aufregung Narkose gut.
95	W	24	Multiple tuberc. ostitis am Fusse	Evidements	40	1 1/2	45	75	Ausgedehntes Erythem.	—
96	W	59	Skirrhus mammae	Amp. mam. Austr. d. Axilla	50	1 1/2	120	100	Erythem auf der Brust.	Struma.
97	M	13	Angioma fac.	Excision	50	1 1/2	25	100	Erbrechen.	—
98	M	57	Lymphadenitis	Incision u. Auskratzung	30	1 1/2	30	60	Zittern, Cyanose, Erbr.	—
99	M	22	Phymose	Spaltung	50	2	20	60	Erythem, Schleimbr.	—
100	M	4	Abscess cubit. fung.	Incision	40	1	20	40	—	—
101	M	80	Ostitis sterni et costae	do. Evidement	50	2	30	60	—	—
102	W	30	Lymphomata col	Excision	50	2	60	120	—	—
103	W	15	Unguis incarn.	Excision	40	1	30	60	Leichtes Schleimerbr.	—
104	W	15	Arthr. fung metacarp. phallang	Resection.	50	40	25	50	—	—
105	M	48	Fungöse Entzündg. d. Flexorensehnen d. r. Vorderarm.	Incision resp. Excis.	55	2	45	125	Schleimerbr., Köpfweh.	—
106	M	48	Phimosis	Plim Op.	55	3	30	80	Hefiges Zittern.	Starker Potator.
107	M	18	Fungös; Granulationen v. einer früh. Kniewunde	Excis.	30	1 1/2	35	70	Etwas Schleimerbrech.	—
108	M	32	Nekrose d. Daumen phalax	Nekrotomie	30	2	15	50	—	Starker Potator, trotzdem keine Aufregung.
109	M	54	Entzündetes Atherom	Excis	50	4	45	120	Gar keine.	Herzfehler. Puls gut.
110	M	41	Fractura colli fem.	Untersuchung in Narkose	50	4	—	110	Starkes Zittern.	Potator.
111	M	23	Lymphadenitis colli.	Ausräumung	45	2	15	45	2 m. Erbrechen	—
112	M	53	Caries metacarp. I. sin.	Resectio partialis	60	3 1/2	25	100	Etwas Zittern.	—
113	M	44	Nekrose d. 2 Mittelfingers	Exarticulatio digiti n. vernachlässigtem Pan-aritium	50	2	30	90	—	—
114	W	22	Lymphomata colli	Evidements.	50	1 1/2	60	120	2 m. Schleimerbrechen.	—
115	W	1 1/4	Ostitis tuberculosa calcanei et metatarsi.	—	25	55	25	30	—	Erythem auf d. Brust.
116	W	37	Unguis incarn	Excis.	50	1 1/2	10	60	—	Rechts pleuritisches Exsudat. Tabes, paraplegie d. unt. Extremitäten.
117	M	67	Carcinom labii inf.	"	30	2	10	50	—	—
118	W	27	Ung. incarn	"	50	2	15	60	Ganz wenig Schleimbr. Brechen.	Stark. Empysem m. Kat
119	M	64	Hemecia inguinalis	Radicalop.	30	2	90	90	—	Sehr decrepides Kind.
120	M	3	Ohrpolyp.	Entfernung	30	1 1/2	35	30	—	—
121	W	16	Lymphomata colli	Excis.	50	1	85	150	Etwas Schleimerbrechen.	—
122	M	27	Alte Resectio gem mit Fisteln	Auskratzung; Gypsverband	50	2 1/2	35	75	Erythem der Hände; Schleimerbrechen.	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
123 M	6		Synovitis fung. ped.	Resectio pedis n. Kocher	40	1	70	75	—	—
124 W	58		Fract. sup. malleol. fibulae m. Luxatio tali	Reposition-Verband	50	2	50	70	—	—
125 W	15		Alte Resek. metacarp. phall.	Entf. frischer Granulationen	45	50	25	55	—	—
126 M	75		Nekrosis radie, Entzündetes Artem. a. Oberschenkel	Evidements, Exc.	50	3	90	120	—	—
127 M	3		Otitis media	Trepanation d. Proc. mast.	25	50	35	25	—	—
128 W	45		Otitis navicul. et tali	Resect. part.	50	2	60	125	2 m. Brechen,	2 m. Pleuritis durchgem.
129 W	20		Lymphadenitis colli	Inc. Auskratzung	50	1 1/2	20	50	—	—
130 W	34		Nekrose des 2. v. Phal. d. r. Hand	Necrotomie	50	1 1/2	30	55	—	—
131 M	53		Sarcom v. d. Scapula ausgehend	Sarcom v. d. Scapula aus-Entf.	50	2 1/2	75	100	—	—
132 M	26		Multiplicaries pellois et fe- moris Abscesse	Spaltung u. Drainage	50	2	25	60	—	—
133 M	26		Lymphomata colli.	Excis.	50	2	120	230	—	—
134 M	13		Bauchabsz. n. Perityphlitis	Incis. Drainage	40	1 1/2	35	65	—	—
135 M	29		Luxat. subcoracoid. hum.	Reposition n. Kocher	50	2	15	60	—	—
136 M	15		Nekrosis der Endphal. des Zeigefingers	Exarticulatio	50	1 1/4	50	75	—	—
137 ?	5 Mo.		Angiomata brachii et thoracis	Ätzung m. Salpetersäure	20	1	16	30	—	Vor der Op. Albuminurie, nachher noch 3 Tage.
138 W	45		Adeno cystoma mammae	Excis.	50	1 1/4	35	60	—	—
139 ?	?		Carci nom des Uterus und seiner Adnexe	Untersuchung in Narkose	50	1 3/4	15	70	—	—
140 M	36		Ischias	Nervendehnung	50	2	10	50	Kopfwch.	—
141 M	29		Multip. ostitis am Becken und Oberschenkel	Evidements.	50	2	15	50	—	—
142 M	3		Pedos varo-quinii cong.	Excis. tall rechts, Exc. cap. tali	25	40	60	15	—	—
143 M	27		Multip. Abscesse nach Haut- tuberculose	Incis, Auskratzung	50	2	30	50	Starkes Zittern,	—
144 W	38		Ischias	Nervendehnung	50	1 1/2	15	60	Erythem an Thorax, Schleimbrecchen,	—
145 W	26		Periostitis mandibulae phlegmone	Inc.	50	2 1/4	20	50	Leichtes Erythem,	—

146	M	24	Lymphonata inguinis.	Exc.	50	2	40	130	Starkes Zitter. Schollimbr.	Unruhige Narkose.
147	M	45	Caries des Polsenbeines	Auskratzung	45	1	18	45	—	Potator. Hatte vorher Cognac getr.
148	M	42	Fractur	Untersuchung	50	2 1/4	10	50	—	—
149	W	38	Gestieltes Fibroid d. Uterus	Enucleation per laparotomiam.	50	2	180	210	—	—
150	W	65	Hernia crur. incarc.	Radicalop.	45	1 1/2	45	60	—	—
151	W	38	Fibroma uteri	Untersuchung	50	2	15	50	Mehreremal Erbr.	Vorher probew. Alkohol.
152	M	2	Pedes equinovari cong.	Doppelte Achillototenomie, Gypsverband	25	3/4	25	25	—	—
153	W	45	Multiple Fibroide d Uterus	Untersuchung	50	2	15	70	Isst etwas schon Nachmittags ohne Erbr	—
154	M	27	Multiple tuberculose ostitis	Evidements	45	1 1/4	15	45	—	Hatte früher bei Chloroform 7 m. erbr.
155	W	45	Multiple Fibromyome uteri	Hysterotomie	50	2	120	150	Erbricht erst am 3. Tage.	Tr. Verb. Eier gefrühst.
156	M	17	Gangrän des 1. Zeigefingers	Amputation	50	2	20	55	Starkes Erbrechen.	Vorher Suppe gegessen.
157	M	41	Ostitis metatarsi digiti III	Tenotomi der Flex. digit.	50	2	8	50	Kein Erbrechen.	—
158	W	22	Ostitis metatarsi digiti III pedis	Exarticulatio.	50	2	20	55	—	—
159	M	47	Fract. supracondyllea humeri	Reposition, Gypsverband	50	2 1/2	30	85	Nachher etwas Schleimbrechen.	Alkoholiker. Hatte Cognac getr.
160	W	22	Abscess an der l. Brusthälfte	Ausräumung	50	2	25	75	Nachher etwas Schleimbrechen.	—
161	W	19	Multiple Zahnaries	Extraction v. 14 Zähnen	50	9	20	125	—	Pat. steht sofort auf u. besorgt Aufr. i.d. Stadt.
162	M	34	Phimosi	Phim. Op.	50	2	20	85	3 m. Erbrechen.	Starke Excitation.
163	M	50	Hernia crur. incarc.	Radicalop.	80	5	80	150	Langes Excitationsstad.	—
164	M	24	Tuberculosis testium	Castratio duplex	80	5	80	200	Starke und lange Excit.	Probew. vorher Alkohol.
165	M	32	Tuberculose testis	Castration	60	4	90	225	Erw. Husten, 2 m. Brech.	—
166	W	16	Alte Osteomyelitis fibiae	—	50	1 1/2	15	55	Mehrerem, starkes Erbr.	Pat. hatte frühl. b. Chlorof.
167	W	28	Tuberculosis des Ellbogen-gelenkes	Resection	50	2	30	60	Leichtes Schleimbrechen.	3 Tage u. Nächte erbr.
168	M	6	Fractura crucis complicata	Reposition, Jodoform verbd. Gypsverbd.	30	1/2	40	30	Erwas Schleimbrechen.	—
169	M	2 1/2	Caries metacarpi II dext.	Evidements.	25	1 1/2	20	25	—	—
170	M	46	Necrosis phalax post panarit. Amput.	—	50	2	30	80	—	Potator. Isst nach 3 Std. zu Mittag u. geht fort.
171	M	58	—	Reamputation des Oberschenkels	50	3	60	120	—	Hatte Bronchitis. Keine Verschlimmerung.
172	M	6	Pedes vari congen.	Keilform, Excision beider.	25	2	75	70	—	—
173	W	25	Pes equinus	Achillototenomie	50	1 1/2	20	50	—	—
174	M	25	Calculus vesicae	Lithotomia supra pubica	50	2	90	120	—	—
175	W	54	Uterus fibroid	Untersuchung	50	1	10	50	Schleimbrechen.	—
176	M	—	Multiple tuberc. v. Haut u. Kn.	Evidements	50	2	35	95	do.	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
177 M	41		Varicocele duplex	Excision v. Venen beiders.	55	2 1/2	45	105	—	—
178 W	6		Rachitische Verkrümmung d. Unterschenkeis	Osteotomie	35	1 1/4	35	55	—	—
179 W	54		Filomigome uteri	Hysterotomie	50	1	75	150	—	—
180 W	10		Gangrän d. 1. Zeigefingers	Ablatio	40	50	30	40	—	—
181 M	64		Osteomyelitis tibiae sin.	Necrotomie	50	2	45	90	—	—
182 M	60 1/2		Carcinomatische Inguinaldrüs.	Excision einerseits	60	4	45	100	—	—
183 M	3		Schnittwunde des Fingers	Ablatio	30	2	35	60	Erbrechen nachher.	Hatte gegessen.
184 W	32		—	Untersuchung auf ovarial tumor	40	4	17	75	—	—
185 M	51		Gangräna senilis pedis	Ablatio	60	3	25	100	—	—
186 M	14		Otitis media	Eröffnung d. Proc. mastoid	50	1/2	35	50	—	—
187 M	3		Gangrän d. 2. Mittelfingers	Ablatio	20	1 1/2	20	20	—	—
188 W	42		Periostitis mandibulae	Incision	50	2	20	55	—	Früher sehr schlechte Chloroform-Narkose.
189 M	54		Hernie inguinalis sin.	Radicaloperation	50	2	60	100	—	—
190 W	27		Synovitis humeri	Ignipunctur u. Excision	50	2	50	125	—	—
191 M	—		Ma-tarminstiel	Spaltung u. Excision	50	2	20	50	Schleimbrechen.	—
192 M	—		Hernia cruralis incarc.	Darmresection	50	2	175	175	—	—
193 W	22		Alte Fractur des Unter- schenkels	Darm-Resection	50	2	30	69	Erwas Cyanose. Kleiner Aortensuffizienz. Puls. Unregelmässiges Atmen u. Erbrechen.	—
194 M	47		Verletzung des Kleinfingers	Spaltung	50	3	30	80	—	—
195 M	41		mit Phlegmone	Exarticulatio	50	5	45	100	—	—
196 W	—		Phlegmone antibrachii.	Incisionen; drainage	50	1	55	65	Nachher Erbrechen.	Hatte Wein getrunken
197	—		Doppelstrige Ma-tis	—	47	4	22	80	—	—
198 W	4		Fractura antibrachii	Reposition; Gysverband	15	1 1/2	15	15	Erbrechen der vorher eingenommenen Nahrung.	—
199 W	19		Synovitis genu	Extension	50	7	20	60	Erbrechen b. Erwachen.	—
200	—		Haemorrhoiden	Abbinden	50	5	30	85	—	—
201 W	25		Cariöse Zähne	Extraction von 14 Wurzeln	60	4	55	300	Brechen.	—
202 W	20		Lymphomata colli	u. Zählen Excision	50	1 1/2	60	100	Schleimbrechen, Hoch- grad. Cyanose.	—

		Extrac. v. 5 Wurz. u. 2 Zähn.	50	3	50	250	Erbrechen	Hatte Thee getrunken.
203 W	29 Car. Zähne	Incision	50	1 1/2	15	50	—	—
204 W	17 Altes Panaritium	do.	50	2	15	50	—	—
205 W	15 Phlegmone hinter d. Ohre	do.	50	2	15	50	—	—
206 W	13M Abscess d. Oberschenkels	do.	25	1	25	25	—	—
207 W	11 Ostitis calcanei	Incision	50	1 1/4	35	50	—	Ist tuberkulös.
208 W	51 Ostitis tali m. Abscess	do.	60	2 1/2	30	75	—	—
209 W	63 Osteomyelitis metatarsi IV	Resection	50	5	30	75	Erbrechen.	—
210 M	14 Haematom d. Oberschenkels	Spaltung	40	4	30	60	—	—
211 W	m. Infektion	—	—	—	—	—	—	—
212 W	18 Carcinoma mammae	Entfernung des Care. und Ausräumung d. Axilla	50	3	95	125	—	—
213 M	46 Hydrocele sin.	Spaltung und Excision	50	5	40	85	Schleimbrechen.	—
214 W	29 Bursitis praepatellaris	Excision	50	4	30	75	Starke Cyanose.	—
215 W	33 Parovarialzyste	Ovariectomie	50	2	120	150	—	—
216 W	23 Abscessus femoris	Incision	50	1 1/2	15	50	—	—
217 W	32 Cystoma ovarii sin.	Ovariectomie	50	2	90	150	—	—
218 W	24 Zahncaries	Extraction v. 12 Zähnen	75	10	30	175	—	—
219 M	24 Lymphonoma colli	Excision	75	2	30	75	—	—
220 M	45 Beckenostitis m. Senkungsabscess	Spaltung u. Auskretzung	75	3	60	125	—	Sehr unruhige Narkose.
221 M	45 Phlegmone dorsi pedis	Incision	50	1 1/2	15	50	—	Hatte bereits Haemoptoe und Husten.
222 W	46 Arthritis genu	do.	59	2	15	75	—	—
223 M	49 Abscess d. Gallenblase m. Perforation. Secund. peritonischer Exsudat mit Darmverschluss	Spaltung und Ausmeisslung d. Tiba	50	1 1/2	70	85	—	—
224 W	19 Ostitis fungosa femoris et Resectio genu	Laparotomie	50	2	60	75	Exitus in operatione.	—
225 —	—	—	—	—	—	—	—	—
226 M	—	Periarteriitis	25	2 1/2	35	75	—	—
227 W	—	Necrosis d. 1. phalax des Necrotomie	73	15	30	125	Sehr starke Excitation.	Potator.
228 W	—	Kleinfingers Lymphadenitis axillae	50	7	15	50	—	—
229 —	—	Veroiterte Hals- u. Achsel-drüsen	50	3	15	50	—	—
230 W	—	Veroiterte Halsdrüsen	30	3	10	30	—	—
231 M	—	Ostitis cunei form et meta tarsal	50	3	15	60	—	—
232 W	—	Lymphadenitis inguinis	45	10	20	75	—	—
233 W	—	Gangrän d. Zeigefingers	50	3	30	100	—	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
233	W	—	Abscessus fem post partum Incis	Drainage	50	4	39	50	—	—
234	—	—	Otitis media	Trepanation d. proc. mast.	45	5	45	140	—	—
235	M	18	Unguis incarn.	Entfernung	60	3	25	75	—	—
236	M	37	Fistula ani	Spaltung	50	2	20	80	—	—
237	W	22	Ostitis metatarsi V und II. Lisfranc	—	50	2	34	60	—	—
238	M	47	Spermatocele dext.	Spaltung und Excis.	100	5	30	110	—	—
239	M	44	Ostitis calcanei et cuboid	Igni punctur	75	4	30	100	—	—
240	W	43	Hernea crur. incarc.	Radicaloperation	50	2	50	50	—	—
241	W	32	Tuberkulose der Niere	Nierenexstirpation	52	2	120	125	—	—
242	M	15	Hydrocele sin. per magna	In- und Excision	100	5	60	150	—	—
243	W	—	Arthritis pedis	Ablatio cruris	50	2	45	100	—	—
244	W	51	Ostitis ulnae	Igni punctur	50	3	10	50	—	—
245	M	15	Ostitis pelvis nebst Abscess	Eröffnung	45	2	90	130	—	—
246	W	—	Fissura ani	Spaltung	50	4	30	80	—	—
247	M	10	Periostitis mandibul.	Incision	45	2	10	45	—	—
248	W	24	Ostitis pelvis m. Senkungs- abscess	Eröffnung	50	2	90	125	—	—
249	W	—	Necrose der tibia	Nekrotomie	50	2	50	65	—	—
250	M	54	Hydrocele duplex	In- und Excision	75	3	55	125	—	—
251	M	52	Senkungsabscess n. Rücken- ostitis.	Incision	60	2	50	60	—	—
252	M	4	—	Incision am Kniegelenk	25	2	30	30	—	—
253	M	2	Abscess am Fussgelenk	Eröffnung	25	2	20	30	—	—
254	M	16	Unguis incarn	Entfernung	40	4	10	75	—	—
255	M	18	Ostitis tibiae	Resection d. unt. Tibiaendes	50	2	40	50	—	—
256	W	55	Senkungsabscess v. Rippen- ostitis ausgehend	Eröffnung	50	2	45	75	—	—
257	M	—	Abscess am Kniegelenk	Incision u. Drainage	30	2 1/2	20	75	Am 2. Tag Erbrechen.	—
258	M	16	Synovitis fungosa manus	Arthrectomia manus sec. Kocher	45	2	35	45	2 mal Erbrechen.	—
259	W	13	Lymphadenitis colli	Incisionen — Evidements	40	2	7	40	—	—
260	W	—	Ovarial tumor	Probelaparotomie	50	2	60	100	—	—
261	W	19	Arbit. fungosa inoperphalang	Resection des Gelenkes	50	1 1/2	15	50	—	—
262	W	—	Mittelfingerentzündung	Trepanation proc. mast.	50	4	10	100	—	—
263	M	52	Necrosis costae	Rippenresection	60	3	25	60	—	—
										Vollständ. Erschließung der Bauchdecken

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Blutritzt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
300	W	—	Drusen in d. Axilla	Excis.	50	3	45	100	—	—
301	M	5	Coxitis fungosa	Resectio coxae	25	1	60	30	—	—
302	M	12	Fractura cruris	Reposition u. Gypsverband	30	2	15	30	—	—
303	M	20	Hernia epiploica inguin.	Radicalop.	50	2	60	125	—	—
304	M	—	Tuberculosis epididym.	Doppelcastration	75	2	60	150	—	—
305	W	—	Lymphadenata colli	Excision	25	1	55	75	Cyanose u. Brechbeweg.	—
306	M	3 1/2	Pos varico-equinus cong.	Redressement forcé, Gyps- verband	10	1 1/2	10	15	—	—
307	W	30	Ovarialcyste	Ovariectomy	50	1	90	150	—	—
308	W	—	Abortus	Auskratz. v. Placentarresten	50	1	15	75	—	40,8° Temp. Sehr her- untergekommen.
309	M	—	Phimose	Phim. Op.	50	5	45	100	Etwas Schleimbrechen.	—
310	M	20	Gelenkmäuse im l. Knie	Incis. und Entf.	45	5	35	100	Viel	—
311	W	16	Rechtwinkl. knöcherner An- kylose des l. Knies	Nach-Resection u. Keilexeis	15	1 1/2	60	100	Cyanose und Schleimb.	—
312	W	18	Zahnaries	14 Z und 4 W.	50	3	20	100	—	—
313	W	20	do.	7 " 8 "	75	5	20	125	—	Starke Struma.
314	W	21	do.	24 "	50	4	20	130	—	—
315	W	27	do.	14 "	50	4	40	175	Erbr. 2 m.	—
316	W	35	Skirrhus mammae	Excis.	50	1 1/2	60	60	—	—
317	W	37	—	Untersuchungsnare.	40	2	20	70	Cyanose.	—
318	W	47	Zahnaries	17 Zähne	50	5	15	100	Brechen d. verschluckt.	Starke Struma.
319	W	37	Carcinoma coeci et col. asc.	Laparotomie	50	2	50	125	Blutes.	—
320	M	23	Osteomyelitis tib.	Spaltung	75	4	40	75	—	—
321	W	25	Mastitis dupl.	Incis. Drainage	40	2	30	70	—	—
322	W	25	Multip. Chondrome d. Hände	Enucleation m. Iguipunctur	50	2	60	100	Viel Erbrechen.	—
323	W	23	Bursitis cap. metatars I	Resection des Gelenkes	50	3	25	80	Erbrechen.	—
324	W	55	Hämorrhoiden ext. u. int.	Abbinden u. Excis.	50	2	50	110	—	—
325	W	39	Carcinoma cervicis uteri	Keilexeis.	50	1 1/2	40	115	Schleimbrechen.	—
326	M	58	Alte Hydrocele. Zurückge- lassener Tampon	Entf. d. Tampon.	50	2	15	60	—	—
327	M	18	Ung. incarn.	Entfernung	50	1	15	50	Schleimbrechen.	—
328	M	1	Coxitis fungosa	Resectio coxae	25	1	15	25	Oeffenes Erbr. Collaps.	—
329	M	19 1/2	Abcess volae manus	Incis.	100	2	10	100	—	—
330	W	13	Retroflexio uteri Dammitis	Alexander u. Colpo-perineo- plastie	100	2	165	75	—	—

		Untersuchungsnahe.		40		3		10		60			
331	W	26	—	Untersuchungsnahe.		40		3		10		60	
332	W	42	Lypoma brachii	Excis.		50		1		65		100	
333	M	28	Phimosi	Phim. Op.		75		2 1/2		20		100	
334	M	12	Verkrümmung n. Resectio Reresectione genu	Resectio coxae		25		1 1/4		45		75	
335	M	6 1/2	Granulationen im Nasen-Excis.	Resectio coxae		35		1		5		35	
336	M	18	Deviation septi nar.	Kellf. Excis.		50		2		16		50	
337	W	37	Para und peri metritis	Untersuchungsnahe.		70		4		15		70	
338	M	19	Hernea ing.	Radicalop.		50		2		75		100	
339	W	24	Coxitis	Resectio coxae		50		2		60		75	
340	M	12	—	(Gypsverband n. Resect. gen.		20		2		30		25	
341	W	32	Fractura radii	Rep. Verb.		60		2 1/2		20		75	
342	M	1	Ostitis proc. mast.	Trepan, d. Proc. mast.		25		1		60		60	
343	M	17	Deviation sept. nar.	Kellf. Excis.		50		2 1/2		20		20	
344	W	49	Carc. uteri	Untersuchung		50		8		20		70	
345	M	26	Zahnaries	6 Wurzel		50		4		25		75	
346	W	24	Hallux valgus	Resection des Metatarsus I		60		4		30		60	
347	M	55	Arthritis tuberculosa pedis	Ablatio cruris		90		3		45		90	
348	M	33	Constric. hallucis	Entfernung des Nagels		45		5		10		55	
349	W	19	—	Untersuchung		50		2		10		60	
350	W	4 1/2	Angioma brachii	Excis		15		1 1/2		15		15	
351	W	14	Otitis media	Trepan, d. Proc. mast.		25		1		45		50	
352	M	—	Fractura scapulae luxatio humeri	Reposition u. Immobilisation		80		2		15		80	
353	W	23	Dermoidcyste d. l. Ovariums	Ovariectomie		50		2		90		90	
354	W	22	Recidiv v. Abdominalsarcom	Untersuchung		50		2		15		70	
355	W	24	Caries der Paukenhöhle	do.		50		2		30		80	
356	W	32	Zahnaries	Extr. von 7 Wurzeln		50		2		35		150	
357	W	24	do.	do. „ 16 „		60		3		30		125	
358	W	23	Recidiv ein. Ovarialsarkoms in d. Retroperitonealdrüsen	Probelaaparotomie		50		2		75		100	
359	M	3 1/2	Abscess	Evidements		10		1		10		10	
360	M	54	Carc. oesophagei	Gastrostomie		50		2		40		70	
361	W	23	Unguis incarn.	Entfernung		40		2		5		40	
362	—	—	Verstopfung der Tränenwege	Eröffnung		30		1 1/2		5		30	
363	W	23	Zahnaries	20 Zähne		50		3		60		200	
364	W	32	Abscess nach Parametritis	Eröffnung Drainage		40		1		50		70	

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
365	W	22	Zahnaries	4 Zähne	50	4	15	100	—	—
366	M	2 1/2	Contractur des Knies	Redressement forcé	25	3	15	30	—	Sehr geschwäch. Kind.
367	W	30	Hydrosalpinx	Punction u. Ausschaltung	50	2	120	150	Mehrere Tage	Erbrechen.
368	W	53	Carc. uteri	Untersuchung	50	2	15	50	—	—
369	W	33	Endometritis fungosa. Recid.	Hysterectomy	50	2	165	205	—	—
370	W	53	Carc. corp. uteri	Probelaparatomie	30	3	60	75	—	Bauchdeck. vollst. erschl.
371	W	16	Chancr. d. Endophalax d. Grosszehen	Ablatio inter phalang	50	2	20	75	—	Starke Struma.
372	W	39	Vereiterte Haematocoele	Punction und Incis.	50	3	25	50	—	Nark. in Steinschnittlage
373	M	39	Haemorrhoiden	Entfernung	150	5	30	150	—	—
374	W	32	—	Problemeis. w. Nephrectomie	50	2	35	70	—	Pat. sehr heruntergek.
375	W	42	Retroflexio uteri. Cysto- u. Alexander u. Colpoperineo-rectocoele	plastic aut et past Radicalop.	50	2	180	190	—	—
376	W	71	Hernea crur. incarc.	Auskratzung	50	3	20	50	—	—
377	W	43	Carc. uteri	Evidements	55	2	15	70	Schleimbreehen.	—
378	W	—	Necrosis metacarpi IV	Radicalop.	25	5	20	50	Starke Cyan. Schleimbr.	—
379	M	66	Hernea inguin.	Radicalop.	100	10	55	175	—	—
380	M	30	Synovitis metacarpo phalang. Indic.	Exarticulatio	75	7	20	125	Unregelmässige Atmung. Sehr schl.	Stark.
381	M	38	Lymphomata colli	Excis.	90	7	80	230	—	—
382	W	14	—	—	30	2	50	65	—	—
383	M	—	Fistel nach Resectio coxae	Auskratzung.	25	2	10	25	Erbrechen.	—
384	M	52	Mastdarmfistel	Spaltung	75	5	10	75	—	—
385	W	68	Arthritis purulenta genu	Ablatio fem.	50	3	45	100	—	—
386	W	—	—	Resection eines vorstehend. Amputationsknochens	70	5	20	70	Viel Erbrechen nachher.	—
387	W	34	Zahnaries	10 Zähne	50	4	25	125	Bluthreehen.	—
388	W	25	do.	25 do.	4	4	35	100	—	—
389	M	16	Contractur des Kniegelenkes nach Abscess	Briseiment forcé	50	1 1/2	15	75	—	—
390	W	58	Carcinoma uteri inoperabel	Auskratzung	50	3	15	50	—	—
391	W	28	Zahnaries	15 Zähne	50	4	45	200	Bluthreehen.	—
392	W	—	Bartholinitis suppur.	Ausschaltung	50	1	60	70	Erbr. u. starke Cyanose.	Grosse Struma.
393	W	30	Lymphomata suppur.	Incis. u. Auskratzung	30	3	20	50	—	—

394	W	24	Zahnaries	9 Zähne, 11 Wzl.	50	4	20	160	—	—
395	—	2	Fingerverwachsung	Einführen einer Bleikugel	25	2	10	25	—	—
396	W	27	Zahcuries	13 Z.	50	4	20	125	—	—
397	M	45	Ostitis cuboidei	Incis. u. Ignipunct.	75	5	15	75	—	—
398	M	41	Erfrierungsgangr. d. Zehen	Exarticulatio v 2 Zehen	50	6	40	125	—	—
399	W	18	Lymphomata colli sup.	Incis. Evidements	25	1	45	100	Erbrechen nach.	—
400	W	32	Zahnaries	2 Zähne	100	6	15	100	Cyanose, Erbrechen.	—
401	M	42	Rippennecrose	Auskratzung	90	12	35	100	Schleimbrechen.	—
402	M	—	Thrombose d. Vena saphena magna	Excis. Thrombus	60	7	35	100	Erbrechen.	—
403	W	66	Polypi uteri Haemorrhoid.	Entfernung	50	5	30	100	Etwas Cyanose.	Vorher Bronchitis.
404	W	50	Carcinoma uteri	Auskratzung	60	6	20	60	—	—
405	—	6 1/2	Lymphadenitis colli	Incis.	10	1	10	15	—	Vor 1 Mon. doppelseitige Pneumonie durchgem. Hatte gegessen.
406	M	—	Endometritis fung.	Auskratzung	75	8	30	125	—	Struma.
407	M	—	Wunde an d. Stirne	Naht.	20	3	10	30	Erbrechen.	—
408	W	—	Vaginismus	Discision hyminis.	70	5	20	120	—	—
409	W	—	Retensionskatarrh im sinus frontalis	Eröffnung ders.	75	7	60	300	—	—
410	M	39	Vulnera manus. Fractura Verband	—	65	4	45	115	Erbrechen.	—
411	—	—	complic. metacarp. Fingerverwachsung	Durchtrennung	20	1	20	20	Cyanose.	—
412	M	15	Ostitis synovialis fung. pedis	Exarticulatio digit ped.	30	3	20	30	—	—
413	M	17	Osteomyel. tib. dext. Abscess	Necrotomie v. Incis. und Drainage l.	50	5	75	120	—	—
414	W	34	fem. sin. Phlegmone colli.	Incis.	35	2	10	35	—	—
415	W	—	Zahnaries	16 Z. und 3 Wzl.	50	5	30	175	Erbr. des verschl. Bräutes. Musste früher n. Chloroform 3 Tage liegen.	—
416	W	21	Retroflexio uteri u. unguis inc.	Alexander-Entfernung	70	8	80	120	—	—
417	W	33	Bartholinitis	Ausschüttung	70	5	45	120	—	—
418	M	—	Strictura ureth.	Urethrotomie	65	5	20	75	—	—
419	M	32	Synovitis fungosa genu	Arthrectomie partial	80	7	45	110	—	—
420	M	11	Lymphomata colli	Enucleation	50	5	60	110	—	—
421	W	17 1/2	Zahnaries	14 Z. und 1 Wzl.	60	13	20	80	—	—
422	M	42	Otitis media	Trepanation d. Proc. mast	50	5	30	60	—	—
423	W	36	Parametrischer Abscess	Eröffnung	50	8	25	90	—	—
424	W	28	Parovarial cyste	Punction u. Carbolinjection	30	2	30	65	—	—
425	W	42	Pelvieo peritonitis	Untersuchung	75	6	20	100	—	—
426	W	45	Fibroma uteri	Hysterectomie	40	2	135	180	Später Erbrechen.	—
427	W	8	Lymphomat. axill.	Evidements	25	2	25	50	Cyanose, Erbrechen.	—

Vor 2 Jahren b. Chlorof. schwerer Collaps.

Nr.	Geschlechts	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
428 M	—	—	Epididymitis tuberc.	Castratio	75	6	35	100	Schleimbrechen.	Schwächlich.
429 M	19	19	Arthritis fung. genu m. Abs- cessen	Abstr. Ablatio fem.	60	5	60	100	—	—
430 M	23	23	Zahnaries	16 Zähne	100	15	15	175	—	—
431 W	22	22	do.	4 do.	50	2	15	100	—	—
432 W	39	39	Carcinomatöse Endometrit	Hysterectomie supravagin.	50	4	135	175	Stk. Cyan. Am 2.Tg Erbr.	—
433 M	—	—	—	Resectio v. 2 Wirbeldornen	50	2	40	100	—	—
434 W	18	18	Oritis media	Eröffnung d. Proc. mast.	50	3	30	75	—	—
435 M	3 ¹ / ₂	3 ¹ / ₂	Naevus dorsi	Excis.	5	2	20	20	—	—
436 M	3	3	Multiple caries	Evidements	15	2	20	35	—	—
437 M	43	43	Lymphadenitis axill	Spaltung. Ausstümm. Ther- mokauter	80	7	30	175	—	—
438 W	51	51	Zahnaries	11 Zähne	50	4	15	125	Blutbrechen.	—
439 M	—	—	Hernia ing. cong.	Radielop.	15	1	60	75	—	—
440 W	6	6	Arthritis fung. genu	Resectio genu	25	1	15	75	—	—
441 W	—	—	Parametrit. Abscess	Punction. Entleer. Drainage	50	3	40	100	—	Struma. Heimggk. Pat.
442 W	17	17	Axillarbrusen	Enucleation	50	1	75	135	—	—
443 W	7 ¹ / ₂	7 ¹ / ₂	Pedes vari congen.	Tenotomie-Redressen. forcé	5	45	25	20	—	—
444 W	17	17	Arthritis fung. meta- carpi	Resectio	25	2	30	50	Erbrechen während.	Hochgrad. Scrophulose.
445 W	18	18	Zahnaries.	5 Zähne	60	4	10	90	—	—
446 W	65	65	Necrosis calcanei	Evidements u. Ignipunctur	50	5	45	75	Erbrechen nachher.	—
447 W	50	50	Retroversio uteri	Alexander	60	5	75	100	—	—
448 M	33	33	Arthritis fungosa genu	Resectio	125	5	90	150	—	—
449 W	—	—	Polypus uteri	Entfernung	75	5	20	160	—	—
450 W	—	—	Mastitis	Incis. Drainage	50	4	10	50	—	—
451 W	25	25	Retroflexio uteri	Alexander	50	5	90	125	—	—
452 M	—	—	Empyem antri highmori	Eröffnung d. Fovea canina	100	20	50	200	—	—
453 M	—	—	Ostitis media	Trepanat. d. proc. mast.	75	8	50	100	—	—
454 W	54	54	Cystoma ovarii dextri	Ovariotomie	50	5	85	200	—	—
455 W	—	—	Hern. inguin.	Herniotomie	100	5	60	200	—	—
456 W	—	—	—	Untersuchung	30	3	15	60	—	—
457 W	37	37	Fibroma uteri	Enucleation	25	1	120	150	—	—
458 W	—	—	—	—	50	4	10	50	Erbrechen nachher.	—
459 M	15	15	Perforativperitonitis nach Perityphlitis	—	25	2	120	125	—	—

Vollständ. Erschlaffung
d. Bauchdecken.

160	W	10	Prolapsus uteri	Colpoperineoplastic	30	2	130	140	—	—	—
461	W	65	do.	do.	25	3	120	130	—	—	—
162	W	14	—	—	20	2	20	50	—	—	—
163	W	65	—	—	80	10	45	170	—	—	—
164	W	48	—	—	60	7	165	260	—	—	—
465	W	39	Hæmatosalpinx	Hysterotomie	75	4	90	180	—	—	—
466	M	30	—	—	70	3	5	10	—	—	—
467	M	30	Lymphadenit. coli u. axillae	Ausräumung	70	7	60	150	—	—	—
468	M	1 ¹ / ₂	Hydrocele	Punction und Injection von Carbonsäure	30	2	15	30	—	—	—
469	W	36	Fibroma uteri	Untersuchung	50	2	15	75	Schleimbr. Stk. Aufreg	—	—
170	W	—	Otitis med.	Trepanat. proc. mast.	25	1	30	50	—	—	—
171	W	24	Rippencaries u. Abscess	Resection	25	1 ¹ / ₂	40	60	—	—	—
472	W	12	Lymphomata coli et axillæ	Ausräumung	50	4	60	100	—	—	—
473	W	—	Dammriss	Colpoperineoplastic	50	1	90	150	—	—	—
474	W	—	Abscess fem. Ostitis interna	Colpoperineoplastic	50	7	30	100	—	—	—
475	M	18	Arthritis fung. manus	Spaltung. Trepan. proc. mast	30	3	45	75	Erbrechen.	—	—
476	M	57	Ostitis fung. manus	Resectio manus nach Kocher	30	3	45	75	nachher.	Potator.	—
477	W	40	Ostitis fung. mall. ext.	Resect. nebst Ignipunct.	75	5	30	100	nachher.	Völl. Erschl. d. Bauchw.	—
478	W	18	Fibroma uteri	Ausschl. u. Ovariectomie l.	40	2	120	175	Erbrechen	—	—
479	M	50	Lymphadenitis coli	Incis. Evidements	50	3	30	100	Erbrechen.	—	—
480	M	6	do.	do.	60	4	30	60	—	—	—
481	M	49	Synovitis fung. ped.	Arthrectomie sec. Kocher	20	1	60	60	Schleimbr.	—	—
482	W	32	Ulcus uteri post pessarium	Schluss des Ulcus nach Anfrischung	50	4	90	150	do.	—	—
483	W	35	Lymphoma coli	Enucleation	50	7	60	150	—	—	—
484	W	28	Zahnear.	9 Z. und 3 W.	50	3	20	125	Blutbrechen.	—	—
485	M	4	do.	16 W.	100	4	20	175	—	—	—
486	W	50	Phimosis	Phim. Op.	15	1	20	20	Cyanose.	Struma.	—
487	M	13	Ostitis claviculae	Ausräumung	40	2	15	50	—	—	—
488	W	49	Otis int.	Trep. proc. mast	35	2	20	100	Erbrechen.	—	—
489	W	16	Dammriss	Colpoperineoplastic	50	5	120	125	—	—	—
490	W	32	Zahnear.	7 Z.	50	3	15	150	Blutbrechen.	—	—
491	M	6	Retroflexio uteri	Alexander	50	5	45	100	Später Schleimbr.	—	—
492	M	22	Arthritis fung. genu	Resectio	15	2	60	100	—	—	—
493	W	16	Necrosis tibiae	8 Z. und 14 W.	75	4	40	200	Brechen.	Starke Blutung.	—
494	W	—	Necrosis des Nasenbeins	Spaltung u. Ausräumung	50	4	20	100	—	Matte gegessen.	—
495	W	67	Carc. mammae	Evidements	30	3	15	60	—	Fettherz.	—
496	M	39	Hydrocele	Amputatio mammae	50	5	45	150	Schwacher Puls.	—	—
497	M	30	Lymphadenitis coli	Radicalop.	100	5	60	200	Starke Excitat.	—	—
498	W	29	Lymphadenitis coli	Spaltung und Ausräumung	70	15	35	140	—	—	—
499	W	29	Retroflexio uteri	Alexander	60	8	95	200	—	—	—

Nr.	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Narb.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
499 M	7		Resectio ped. n. Kocher	25	2	25	45	Nach 10 Min. Athm. pfeif	Dieses Erschl. geht bald vor-
500 W	17	Zahnar.	7 Z.	50	5	50	130	Stk. Cyan. Pupill. weit.	über n. Wegl. d. Aethers
501 W	29	Dammis	Colporrhineoplastie	75	12	20	250	—	Nach der Op. Collaps.
502 M	47	Vulvera coxae	Nahr	75	7	90	250	Mehrf. Erbr.	geht bald vorüber.
503 M	28	Fractura zweier Finger	Ablat o	35	5	25	100	—	Hatte gegessen.
504 W	24	Ung. inc. dupl.	Excis.	50	5	15	75	—	—
505 M	14	Ung. inc.	Entfernung	75	5	10	90	Erbr. w. und n.	—
506 M	57	Ostitis tali calcanei et tibiae	Ablatio supramall.	100	6	40	175	—	—
507 M	7 1/2	Osteomyelitis tibiae, Abscess	Spaltung	25	2	20	50	—	—
508 W	32	—	Untersuchung	75	5	15	75	Schleimbrechen.	—
509 W	51	Verkäste Lymphdrus a. Hals	Excis.	75	5	30	100	—	—
510 M	49	Haematoma cruris	Spaltung und Entleerung	30	5	7	75	—	—
511 M	41	Necrose der Nagelphalax	Spaltung und Extract.	75	10	20	100	—	—
512 W	47	Carcinoma mammae	Amputat. mam.	75	10	80	150	Erbr. w. und n.	Schwache Herzaktion.
513 —	10 W	Pes varoquinus congen.	Tenotomic Redressen forcé	15	3	10	25	—	Sehr schöne Narkose.
514 M	7 1/2	Osteomyelitis tib.	Eröffnung d. Diaphyse an 2 Orten	25	2	30	60	—	—
515 W	24	Zahnar	14 Zähne	75	6	25	225	Erbr. während.	Hatte schw. Kaffee getr.
516 W	45		Untersuchung	50	5	15	100	do. do. u. nach.	—
517 W	37	Carcinoma mamm. et axillae	Excis.	75	6	90	275	Später Erbrechen.	—
518 W	17 1/2	Graviditas 7 Mon	4 Z.	75	4	12	125	—	—
519 W	26	Zahnar.	17 Z. und 2 W.	75	8	25	250	—	—
520 W	29	do.	17 Z.	75	7	25	175	—	Vollständ. Erschlaffung
521 W	45	Fibroma uteri	Myotomie	100	7	135	300	—	d. Bauchwände!
522 W	52	Ostitis capit. tibiae	Incis. Iguipunct.	50	7	30	75	—	—
523 M	21	Epidymitis tuberc.	Castratio.	100	7	25	130	—	—
524 W	17	Schmengg. d. Vorderarm.	Incis.	50	6	10	125	—	—
525 W	59	Darmcarcinom	Laparotomie	80	10	75	150	—	—
526 M	33	Ostitis tarsi	Pirogoff	75	10	85	225	—	Vollständ. Erschlaffung
527 W	25	Cystadenom mammae	Excis.	75	8	60	175	—	der Bauchwände!
528 M	36	Gangrän digit.	Exarticulatio metacarp. phal.	100	5	30	150	—	—
529 —	7 1/2	Pes equino var. cong	Achillotomie, Redresse- ment forcé	15	2	7	25	—	—

530	M	44	Necrosis pollicis	Excis.	90	7	20	90	—	Bei Gaslicht ausgeführt!
531	W	4	Nierensarkom	Enterotomie	20	1	60	10	—	—
532	W	—	Abscess fem.	Incis.	70	10	20	100	—	Struma.
533	W	52	Zahnear.	Ext. 11 Z.	90	6	15	160	—	—
534	W	19	do.	14 "	75	8	10	90	—	—
535	M	24	Osteo chondrom septi nar.	Resection	75	5	45	100	—	—
536	M	6	Abscessus subchronchaer	Incis. Epidemics	25	3	45	30	—	—
537	M	40	Luxatio axillaris	Reposition	150	5	10	150	—	Potator.
538	W	36	Zahnear.	32 Zähne	70	6	25	150	—	Erbr. von Blut.
539	W	17	do.	9 do.	50	4	15	75	—	—
540	W	22	Salpingitis sin.	Laparotomie	100	5	90	195	—	—
541	M	8 $\frac{1}{2}$	Angioma fem.	Excis.	10	2	5	15	—	Pat nimmt öft Aether ein
542	M	22	Hernea inguin	Radicalop.	75	5	45	150	—	Bauchd. voll. erschläft!
543	W	33	Varice der Epigastrica. Gra- vidität	Excis.	75	5	50	200	—	Cyanose, 2 m. Erbr.
544	W	31	Sarcum labii major.	do	75	7	75	150	—	Op. i. Steuschmittl. Stru.
545	M	15	Hallux valgus	Resect. d. Metatarsusköpfch.	40	6	30	100	—	Hatte gefrühstückt.
546	M	62	Osteomyelitis humeri	Necrotomie	100	6	45	200	—	Potator.
547	W	31	Zahnear.	25 Z.	100	12	30	125	—	—
548	W	16	Ostitis int.	Trepanat. proc. mast.	75	5	45	120	—	—
549	M	22	Caries scapulae m. Abscess	Eröffnung u. Resect. des unt. Drittels des Schulterblattes	75	6	45	175	—	Sehr scrophulös.
550	W	27	Zahnear.	10 Zähne.	50	4	20	150	—	—
551	W	18	do.	4 do.	50	3	10	60	—	—
552	M	13 $\frac{1}{2}$	Pedes equini	Redressement forcé nach Achillotenotom	30	3	25	50	—	—
553	W	24	Tenosynovites purul. Flexor. Spaltung man.	Spaltung Untersuchung	80	4	45	120	—	—
554	W	57	Cystom parovarii	Castratio	50	5	20	50	—	—
555	M	32	Epididym. tuberc.	Resectio	175	7	60	275	—	—
556	M	17	Ostitis costae	Phim. Op.	40	5	75	150	—	—
557	M	9	Phimosis	Spaltung und Excis.	40	4	20	60	—	—
558	M	43	Hydrocele	Excis. u. Ausräum. d. Axilla	100	10	40	150	—	—
559	W	43	Carcin. mammae	Sequestrotomie	50	5	75	150	—	Bereits Bronchitis.
560	M	9 $\frac{1}{2}$	Osteomyelitis fem.	Evidement. Thermokauter.	50	5	60	90	—	—
561	M	49	Necrose der Handwurzel	Resectio partial.	75	6	35	125	—	—
562	M	31	Ostit. d. Trochant major. fem.	Entfernung d. Knochens	75	10	50	150	—	—
563	W	33	Necrosis d. Endphalax	Enucleation	25	2	15	25	—	—
564	W	23	Partholinitis	Incision.	50	4	45	125	—	Gravida.
565	W	20	Ostitis int.	Trepan. proc. mast.	50	4	45	100	—	—
566	W	15	Embolische Gangrän beider Oberschenkel	Doppelamput. d. Oberschenkel.	30	5	60	125	—	Mitralinsuffic. u. Stenose. Ansetzend. schw. Puls

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. lt. Mark.	Eintritt der Markose	Dauer der Markose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
567	W	57	Hemera cur. epiploic.	Radicaloperation	50	10	40	125	—	—
568	W	19	Myositis chron. d. Rückens	Ignipunctur	50	8	20	100	—	—
569	M	3	Ostitis int.	Trepan. proc. mast.	30	2	30	100	—	—
570	M	68	Clavis halluc.	Exarticulatio hallucis	150	10	20	150	—	—
571	M	19	Arthritis. fung. genu.	Resectio genu	50	3	45	150	—	—
572	W	2	Fungoese Ostitis a. d. Füssen	Excisevents	20	1	15	25	—	—
573	W	19	Osteomyelitis fem.	Invis. Drainage	75	5	30	100	—	—
574	M	7	Ostitis tarsi	Resectio	50	3	45	75	—	—
575	W	43	Periarticular. Abscess coxae	Eröffnung Drainage	75	6	40	125	—	Durch Fieber sehr hoch- untergekommen.
576	W	43	Ostitis tarsi	Pirogoff	130	15	45	200	—	—
577	M	6	Periarticular. Abscess nach Eröffnung Scharlach	—	30	1	15	50	Schleimbrechen.	—
578	M	47	Tenosynovitis flex. man.	Invis.	100	7	60	150	—	—
579	M	66	Carcinoma recti.	Exstirpation	75	7	120	225	—	—
580	W	41	Papillomata faciei, Zahnwe.	Excels. Extr. 8 Zähne	100	6	45	200	—	—
581	M	52	Abscess	Ignipunct.	75	6	10	75	—	Stark kypthodisch.
582	W	—	Pereostitis mandibul	Invis.	125	6	15	125	—	—
583	M	16	Stoma coloides	Excels.	70	5	70	150	—	—
584	W	39	Arthritis. fung. genu	Resectio genu	75	8	75	200	—	—
585	M	21	Deviatio septi. nar.	Excels.	100	10	40	350	—	—
586	M	25	Caries d. Gehörganges	Trepan. proc. mast.	60	7	90	170	—	—
587	W	43	Lipom d. Rückens	Excels.	100	10	60	120	Schleimbrechen.	—
588	M	8	Ostitis tuberc. sterni et eos	Resectio	100	10	60	120	—	—
589	M	21	Metastatische Chondritis der 11. Rippe	do.	100	10	60	175	—	Vorher Mo. 0,01 injic.
590	W	70	Seroma maligna nebst Drüsen	Excels.	100	7	120	350	—	—
591	M	19	Geschwulst der Parotis	do.	75	1	60	175	—	—
592	W	46	Fibroma uteri	Myomotomie	150	10	135	350	—	—
593	W	35	Dermoid cyste d. r. Ovar	Ovariectomie	50	3	75	175	—	—
594	W	3	Beckenabscess	Eröff. Drainage.	75	12	60	175	—	—
595	W	21	Zähne r.	14 Zähne.	75	5	20	125	—	—
596	W	21	do.	9 Zähne	75	6	20	115	—	—
597	W	38	Myoma uteri	Hysterectomie	50	5	135	275	—	—

398	W	33	Carcinoma vaginae	Excis in Steinschnittlage.	78	5	80	200	—	Durch Geburt u. starke Blutg. s. heruntergek. Vorher Mo. 0.01 injic.
599	M	28	Fractura fibul.	Reposit u. Gypsverbdl	100	7	20	125	—	
600	W	25	Zahnear.	9 L.	50	4	10	100	—	
601	—	51 $\frac{1}{2}$	Lipoma dorsi	Excis.	10	2	50	30	Heftige Bronchitis.	Sehr schw. Kind.
602	W	35	Hernia crur. epipl. incarc.	Radicaloperation	75	5	45	100	—	—
603	W	8	Lymphoma colli	Excis.	25	5	120	150	2 mal Erbr.	—
604	M	16	Schusswunde in den Oberarm, Fractur humeri	Entfernung von Knochen- splittern u. Schrotkörnern	50	5	60	125	—	Blutverl. u. Fieber 39 $\frac{1}{2}$
605	W	30	Zahnear.	11 Z.	150	12	15	175	—	—
606	M	10	Osteomyelitis metatarsi III	Resect.	25	5	20	50	Cyanose, Mehrf. Erbr.	—
607	W	—	Atheroma faciei	Excis.	50	4	15	75	—	—
608	W	—	Fistel nach Resect. cosac	Auskratzung	15	1	10	25	—	—
609	W	—	Ostitis condyl. int. hum	Eröffnung u. Evidements	75	6	60	200	—	—
610	W	36	Zahnear.	12 Z.	100	12	15	200	Starke Excit.	—
611	W	47	Sarcoma mandib.	Exploratio incis.	100	7	15	100	—	—
612	W	43	Hernia incar. crur. in Perforation und Peritonitis	Annus praeter naturalis	75	5	60	150	—	Pat. bereits moribund.
613	M	68	Carbunculus nuchae	Incis	60	5	15	60	—	—
614	M	67	Spermatocele	Excis	75	5	50	120	—	—
615	W	47	Lymphom. colli	Auskratzung	15	2	8	15	—	—
616	W	15	Vulnus labii major	Naht	50	4	10	50	—	—
617	M	69	Carbunc. nuchae	Incis	75	4	15	75	—	—
618	M	19	—	Untersuchg.	50	3	20	90	—	—
619	M	31	Sarcoma cruris	Excis	50	5	35	80	—	—
620	W	60	Empyema atri highmori	Eröffnung	50	4	30	25	—	—
621	M	27	Phlegmone brachii	Multiplex Incis	45	5	35	120	Cyanose, Collaps.	—
622	M	62	Ostitis humeri	Evidement	50	5	30	75	—	Struma.
623	W	22	Zahnear.	14 Z.	60	5	25	200	—	—
624	W	41	Carc. mammae	Amput. n. Achselaräumg	100	12	75	220	Erbrechen.	—
625	W	15	Arthritis tub. gen.	Resectio genu	40	5	60	60	—	Kurz vorher Pleuritis.
626	M	9	Cariës d. Hammers	Exstirpation	30	5	25	60	Erbr.	Vorher gegessen.
627	M	19	Ostitis med. dupl.	Trepan. proc. mast.	75	10	25	105	Cyanose.	—
628	W	22	Tenosynovitis tub. flex.	Excis und Reinigung jeder einzl. Sehne.	45	7	75	150	Erbr. während.	—
629	M	—	Sequester d. Humerus	Sequestrotomie.	60	5	15	90	—	Potator. Hatte vorh. Wein getrunken.
630	W	21	Cortinoma mammae	Excis	50	7	45	75	—	Sehr schwach. Exitus $\frac{3}{4}$
631	M	37	Nierentumor	Nierenexstirpation	60	7	100	160	—	Std. post op. an acuter Verblutung.
632	M	41	Cariës tali	Resection d. Fusses	180	15	20	180	—	Potator.
633	M	28	Ostitis cristae ilei	Sen-Mehrf. Incis. u. Evidements.	160	10	50	200	Erbr. nach	—

Nr.	Frischheit	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Blut d. Nark.	Plintir der Narkose	Pinner der Narkose	Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
634	W	19	Zahnar.	10 Z, 5 W.	60	4	15	105	Etw. Blutr.	—
635	W	6	Spinaventosa.	Ausmesselung und Evid.	45	1	10	45	Brechen nach.	—
636	M	17	Ostomyelitis der phalax	Auskratzung	70	7	20	70	—	—
637	M	8	Ostit tub. ped.	Ausräumung	50	3	30	70	Erbr. nach	—
638	W	38	Resectio genu mit schlechter Stellung und Abscess	Resectio.	90	15	40	110	Erbr. nach	Porator
639	W	46	Cystona ovarii	Ovariotoom.	50	3	90	120	—	—
640	M	18	Lymphom. colli	Excis.	80	10	40	90	—	—
641	M	51	Necrose d. Daum. endhalaux.	Necrotomie	60	5	15	80	Erbr. nach	—
642	M	21	Ostit. tub. metatars I	Resectio	100	7	40	125	—	—
643	—	4 $\frac{1}{2}$	Pes. varus cong	Achillotomie. Redressem. forcée.	40	3	15	40	—	—
644	M	15	Pes. equinus nach Fractur	do.	60	5	20	100	—	—
645	W	11	Coxitis dext.	Resect. coxae	30	4	60	45	—	—
646	W	30	Petrochanter Abscess.	Incis u Auskratzung	90	5	30	100	—	—
647	M	27	Haemorrhoiden	Op. in Steinschnittlage	40	5	15	80	—	—
648	M	29	Alt. Fractura cruri m. Hyperdroph. Callus am Anal. nat.	Abmesselung	120	7	60	220	—	—
649	M	2	Doppelseitige Ellbogenge- lenkenzdg.	—	20	2	30	40	—	—
650	M	—	Senkungsabscess n. Rippen- ostit. Lipona darsi.	Resectio pedis	60	5	35	100	Später Erbr.	—
651	W	63	—	Eröffnung. Excis.	40	5	30	100	—	—
652	W	50	Ostitia d. u. Scapula winkels	Resection	35	4	20	140	Nachh. 2 m. Erbr.	—
653	W	32	Eng. incarn.	Excis	40	5	10	60	—	—
654	W	29	Vaginismus	Multiple Incis.	60	5	15	130	Cyanose. Erbr.	Struma.
655	W	39	Retroflexio uteri	Abscess.	60	8	90	130	—	—
656	W	32	Empyema antri highmori	Eröffnung	75	10	25	110	Blutbr.	—
657	W	17	Zahnar	6 Z.	60	6	45	130	—	—
658	W	62	Carc. mammae	Ablatio u. Achselraumg.	60	4	60	190	—	—
659	W	8	Tub. Hals- u. Achseldrüsen	Exstirp.	35	4	70	100	Erbr. nach.	—
660	W	21	Tuberc. Peritonitis	Untersuchung	50	3	10	50	Cyanose. Erbr.	Struma.
661	M	16	Alte Coxitis	Kellexcis	60	10	60	110	Anfangs Erbr.	—
662	M	3	Coxitis	Resectio coxae	20	2	50	50	—	—

663	W	35	Carc. uteri	Hysterectomie	40	4	130	210	—	—
664	W	49	Osteomyelitis des unteren Radiusendes,	Resectio	40	5	35	80	—	—
665	M	22	Ostitis scap.	Ignipunctur	40	6	10	60	—	—
666	W	21	Ovarialcyste	Laparotomie	45	3	70	180	—	—
667	W	24	Zahnear	21 Zähne	40	6	20	120	—	—
668	M	59	Bursitis	Excis.	80	8	45	120	—	—
669	M	21	Ung. incarn.	do,	60	8	30	100	Schleimbr. w. u. nach,	—
670	W	36	Retroflex. uteri m. Dammriss	Alex. etc.	60	7	90	220	—	—
671	W	—	Carc. mammae recid.	Excis.	80	5	35	160	Erbr. w. u. nach,	—
672	W	51	Carc. mammae	do,	50	4	45	120	—	—
673	W	71½	Fractura capt. hum.	Reposit. Gypsverbod.	25	3	15	50	Erbr. nach,	—
674	W	51	Lymph. axillae	Excis.	50	6	35	120	Schleimbr.	—
675	W	61	Ostitis metatars I u. II	Lisfranc	40	7	45	150	Erbr. nach,	—
676	W	—	Lypoma thoracis	Excis.	50	4	35	100	—	—
677	M	34	Luxatio axill.	Reposit.	100	8	20	100	—	—
678	M	22	Vulnus manus	Excis.	60	7	60	240	Mehrm. Erbr.	Hatte Thee getr.
679	W	34	Cyste am lig. rotund.	5 Zähne	50	7	55	120	—	—
680	W	26	Zähne.	Excis.	50	5	15	80	—	—
681	M	71	Hygroma praepetellare	Evidements	60	7	40	140	—	—
682	W	61	Ostitis der Endphalauz	Radicalop.	40	5	15	60	Mehrf. Erbr. nachh.	Hindernisse im Nasen-Rachenraum. Sehr schlechte Narose.
683	M	28	Hernea inguin.	—	100	15	55	125	Häufiger Hustenreiz	—
684	M	19	Ostitis.	Igni punctur	60	4	10	60	—	—
685	W	18	Arthrit. fung. cub.	Resect cub.	40	4	40	80	—	—
686	M	31	Ostitis sterni.	Resectio	80	8	40	210	—	—
687	W	49	Arthrit. fung. manus.	Evidements	60	5	20	90	—	—
688	M	57	Hydrocele	Radicaloperation	60	5	60	60	—	—
689	W	15	Lymphoma colli	Excis	35	4	35	110	—	—
690	W	22	Mult pl Lymphomae a. Hals	do,	50	4	105	140	—	—
691	W	56	—	Resect. genu	40	4	100	225	—	—
692	M	16	Lymphomata colli	Excis.	40	4	45	160	—	—
693	M	—	Fungoöser Abscess a. Thorax	Evidements	30	4	30	60	—	—
694	M	—	Arthrit manus	do,	40	5	30	80	—	—
695	M	5	Paraphymose	Reposition	15	2	15	20	—	—
696	W	23	Periproctischer Abscess	Incis. u. Auskratzung	50	8	35	120	2 m Erbrechen	—
697	W	59	Arthrit. fung purul. cub.	Resect. cub.	60	5	50	100	—	—
698	W	51	Lymphadenitis colli	Incis. Drainage	50	4	15	65	Schleimbrechen.	—
699	—	2	—	Ignipunctur d Condyl. m. Fem.	25	1	10	25	Erbr. nach.	—
700	W	45	Retroflexio uteri	Alexander	50	4	70	120	—	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Blutr. d. Nark.	Blutritzt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
701	M	8 $\frac{1}{2}$	Hernia inguin.	Radicaloperation	10	2	40	25	—	—
702	W	47	—	Untersuchung	60	5	15	60	—	—
703	M	8 $\frac{1}{2}$	Pedes equinovari cong.	Achillo tenotomie, Redr. forcé.	5	2	15	15	—	—
704	M	38	Phimosi.	Phim. Op.	100	5	20	125	Erbr. nach	—
705	M	38	Ostitis crissae thei.	Auskratzung u. Drainage	40	10	25	100	Erbrechen	—
706	W	33	Ostit. media	Eröffnung d. Proc. mast.	10	7	20	100	Brechen nach	—
707	W	7 $\frac{1}{2}$	Arthrit. fung. genu.	Arthrectomie	20	5	50	55	—	—
708	W	34	Ung. incarn.	Entfernung	40	7	20	60	—	—
709	M	50	—	Untersuchung	100	10	20	100	—	—
710	W	43	Stiltorsion e. Ovarialeystoms	Ovariectomy	60	6	90	160	—	—
711	W	—	Carcin mammae	Ablatio mammae u. Axilla- ausräumung.	10	1	70	120	Schleimbrechen	—
712	W	34	Retroflexio l. erm. Dammis	Alexander u. Larson Tait.	60	5	115	160	Mehrmals Erbr.	—
713	W	14 $\frac{1}{2}$	Osteomyelitis i. ob. Femur- rephyse	Incis.	10	2	15	10	—	—
714	W	33	Ostitis fung. mecatars I.	Exid.	60	7	30	80	Nachh. Erbr.	—
715	W	18	Ostit. tib.	Exid. u. Iguipunktur	60	5	25	80	Erbr. nachh.	—
716	M	31	Fistula ani	Spaltung	170	10	170	170	—	—
717	M	29	—	Untersuchung	80	7	15	80	—	—
718	W	19	Lymphoma colli	Exel.	80	7	50	120	Erbrechen	—
719	W	33	Carcin. mammae	Amput. mammae m. Achsel- ausräumung	60	5	50	90	nach	—
720	M	12 $\frac{1}{2}$	Osteomyelitis acuta humi	Exid. des Humerus	40	4	15	80	—	—
721	W	37	Sclerosis tympani	Tenotom. d. Tensor tympani	60	1	10	60	Erbrechen nach	—
722	W	37	Parametrisches Exsudat	Incis.	50	5	15	50	—	—
723	M	33	Hernia crur. incarc.	Hemectomie	60	8	50	120	—	—
724	M	35	Hernia inguin.	Radicaloperation	90	9	65	160	—	—
725	W	65	Ostitis cuboidi	Exid. u. Iguipunktur	60	8	30	80	Erbrechen nach	—
726	M	12 $\frac{1}{2}$	Osteomyelitis femi	Exid. d. Condyl. ind.	20	1	20	20	—	—
727	M	18	Knochen-splitter am Knie	Extract.	30	7	22	70	—	—
728	M	5	Pedes equinovari cong.	Kellexis. beiderseits	30	3	80	60	—	—
729	M	34	Periproctitis	Spaltung	90	10	40	110	—	—
730	W	18	Zahnneur.	4 Wurzeln	110	5	15	130	—	—
731	M	1 $\frac{1}{2}$	Phimos.	Phim. Op.	10	2	15	10	—	—

Hatte 10 11^o Fieber.
Sehr abgemattet.

732	M	52	Stricture ani	Dilatation forcée	80	9	15	80	—	—
733	W	47	Pyosalpingitis	Laparotomie	80	10	70	140	—	—
734	M	18	Lymphomata colli	Evid.	70	12	17	70	—	—
735	W	20	do.	Excis.	40	5	30	70	Erbr. nach	—
736	W	40	Cystoma tubæ	Laparotomie	70	7	75	160	—	—
737	M	36	Epididym tub.	Papulin	100	13	35	120	Mehrm. Erbr.	Struma. Vollständ. Er- schlaffung
738	M	26	Arthrit. fung gen.	Resectio genu.	80	10	70	140	—	—
739	M	17	Arthrit fung cubit.	Resect. cubit nach Kocher	60	10	55	105	—	—
740	W	—	Zahnar.	3 Zähne	90	10	15	90	—	—
741	W	22	—	Gypsverband	50	5	15	100	Erbrechen nach	—
742	M	4	Phimosi	Phim. Op.	20	4	10	30	do.	—
743	M	22	Hernia inguin	Rad.-Op.	60	7	30	80	do.	—
744	M	25	Sekungsabscess u. Becken- ostitis	Incis. Drainage	80	8	20	100	—	—
745	M	37	Lymphadenitis colli	Incis.	70	6	15	70	—	—
746	M	32	Spondylitis lumbalis m. Abs- cess	Incis Drainage	60	8	20	80	—	—
747	W	32	Lymphom. axillæ	Excis	50	6	45	100	Erbrechen	—
748	M	2	Senkungabscess b. Spondy- litis	Incis Drainage	10	3	15	20	—	—
749	W	22	Ostitis specif. oss. parietal.	Trepau. proc mast.	60	7	60	150	Erbr. während u nach	—
750	M	1½	Ostitis int	Rad.-Op.	20	4	15	40	—	—
751	M	33	Hernia ing.	Untersuchung	90	15	35	150	Erbrechen, Cyanose	Stk. Potator.
752	W	46	—	Excis	40	4	20	80	—	—
753	M	25	Hydrocele	Excis	40	8	45	100	Erbrechen nach	—
754	M	11	Ostitis purul. digiti III	Exartic. metacarpö phalang	40	8	30	90	do.	Heruntergek. Potator.
755	M	16	Ostitis metacarp V	Evidement	40	6	30	80	—	—
756	M	18	Ung. incarn	Excis	40	5	15	60	—	—
757	M	6	Tenosynovitis fung.	do	20	3	35	60	—	—
758	M	42	Hæmatome femor.	Incis. Drainage	70	10	30	90	—	—
759	W	26	Hernæ epiploic. crur.	Rad -Op.	40	7	30	60	Erbr. Cyanose	—
760	M	16	Arthrit. fung gen.	Resect. gen.	20	5	45	80	Erbr. nach	—
761	W	69	Mammacarcinom recidiv	Excis	40	7	50	100	—	Struma.
762	M	17½	Ostitis metacarp VI	Evidement	40	6	20	70	Etwas Schleimbrechen	—
763	M	43	Hæmorrhoiden. Prolapsus recti.	Ligatur und Thermacauter	80	12	45	140	—	Fetherz
764	W	46	Ung. incarn.	Entfernung	60	7	10	60	—	—
765	W	17	Lymphoma colli. Zahnar.	Excis u. Extrh. 4 Zähne	50	5	25	120	—	—
766	W	11	Coxitis	Resect. xæ	30	4	60	70	Erbrechen	—
767	M	27	Lymphadenitis axillæ	Excis	80	7	30	120	Cyanose. Erbr.	—
768	M	18	do. colli.	Incis	60	5	10	60	—	—
769	M	36	Epidid. tub.	Castratio	80	10	55	130	Erbrechen	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
770 M	61	Carbunculus	Incis.		60	8	12	60		
771 M	24	Lymphad. colli	do.		60	10	25	100	Erbr. nach	
772 W	22	Dammriss Prolapsus uteri.	Alexander. Lawson Tait		40	5	120	140		
773 W	9 1/2	Abscess d. Proc. mast.	Incis		40	3	10	40		
774 W	1 1/4	Otitis med.	Trepan d. proc. mast.		10	2	10	20		
775 W	11	Ung. incarn.	Entfernung		30	6	20	60		
776 W	43	Hernia conr. Lymphad. axill.	Rad.-Op. Excis		40	5	65	130		
777 W	20	Recidiv Artrit gen.	Excis		20	5	15	40		
778 M	60	Abscess femor	Incis Drainage		60	8	15	80		
779 M	76	Tenosynovit. flex. brach.	In. und Excis		40	6	25	80		
780 W	8	Arthrit fung gen.	Resekt. gen.		20	3	30	50	Erbr. nach	
781 M	10	Lymphom colli et. axillae	Excis		20	2	50	150	do.	
782 W	24	Necrosis femor.	Incis		40	6	25	80		
783 W	43	Lymphad. colli.	Incis und Evid.		40	2	10	40		
784 W	31	Tubercul. S. clavic.	Excis.		40	5	70	120	Stk. Husten. Schl. Nark. Bestehende Bronchitis.	
785 W	42	Ostitis pelvis m. Abscess	Incis Drainage		40	6	45	80		
786 M	42	Sarkoma testis	Castrat.		80	12	30	110	Pot	
787 M	43	Carcinoma ventriculi	Probelaparotomie		60	4	45	140		
788 W	15	Ostit tarsi.	Excis d. Metatars III, IV u V.		40	2	40	80		
789 M	2	Phimos	Phim.-Op.		20	2	20	25	Erbr. von Speiseresten	
790 W	8	Resectio genm	Gipsverband		2	2	7	20	Hatte gegessen	
791 W	15	Spondylit sacral. nebst Senkung abscessa.	Eröffnung und Drainage des Abscess.		30	4	30	60		
792 W	69	Arthritis deform humeri	Abnähm.-segg. d. vorstehenden Tubern.		40	80	60	140	Schleimbrechen	
793 M	69	Gangraena diabet. crur.	Ablatio cruris		40	8	60	140		
794 W	61	Hernia epiploic. incarc. Li.	Herniotomie, Excis		40	5	55	80		
795 W	38	poma femur.	Laparotomie		40	3	60	100		
796 W	58	Tumor pelvis	Hysterectomie per vias sa- crates		40	4	140	170	Erbr. n.	
797 M	55	Otitis med	Trepan proc. mast		70	7	25	120		
798 W	20	Lymphoma axillae	Enucleatio		40	3	10	40		
799 M	15	Osteomyel. fem.	Spaltung und Drainage		40	1	30	60		
800 M	25	Lymphom coll	Excis.		60	10	50	200		

801 M	35	Fistula ani.	Spaltung und Auskratzung	50	12	10	140	—	St. Pot.	In Steineinmittl.
802 W	24	Carcin. mammae	Ablatio	40	7	60	140	—	—	—
803 M	6	Arthrit fung ped.	Resect. ped. n Koeh.	30	3	35	60	—	—	—
804 M	51	Ostitis tars.	Resect.	40	5	30	120	—	—	—
805 M	5	Abscess cox	Incis und Drainage	20	2	10	40	—	—	—
806 W	43	Lymphom axillae	Excis	40	4	70	120	—	—	—
807 W	31	Hernia crur. incare	Rad.-Op	40	7	35	80	—	—	—
808 M	26	Fistel n Hydrocele-Oporat.	Excis der Fistel.	50	7	45	140	—	—	—
809 W	69	Hernia crur incare.	Rad.-Op.	40	4	40	100	—	—	—
810 W	8	Arthrit fung cub.	Resect. cubit nach Koeh.	20	4	40	40	—	—	—
811 W	18	Condylomata vulvae u. ani.	Kauterisirung m. Paquelein.	40	3	5	40	—	—	—
812 W	47	Lymphome axillae	Excis.	40	7	50	120	—	—	—
813 W	7	Arthrit fung cox	Resect. cox	20	3	50	50	—	—	—
814 M	12	Myositis traumatica, rect. int. femor	Resect. int. Excis.	20	4	20	50	—	—	—
815 M	35	Alte Fract u. Luxat tali	Excis tali.	120	15	105	320	—	—	—
816 M	31	Phim.	Phim-Op.	70	5	20	100	—	—	—
817 M	8	Arthritis fung coxa. Ostitis pelvis.	Resectio coxae. Gypsverband. Zur Extension Fractura fem.	25	4.	75	100	—	—	—
818 —	15	Synovitis genu pur. nach Spaltung	Drainage.	40	7	25	80	—	—	—
819 W	—	Ostitis uln. Osteomyel femor	Incision. Evid. d. Thermo-kauter.	40	5	20	80	—	—	—
820 —	—	Naevus faciei	Excis	20	2	30	40	—	—	—
821 M	17	Ostitis pelvis mit Senkungs- abscess.	Incis. Drainage	40	5	20	100	—	—	—
822 W	42	Lymphom colli	Excis.	40	8	35	120	—	—	—
823 M	5	Doppeldarmen	Exartikulat d. Darms	15	2	10	20	—	—	—
824 M	5 1/2	Hernia inguin	Rad.-Op.	10	2	30	30	—	—	—
825 M	51 1/2	Ostitis pedis	Pirogoff	50	10	40	120	—	—	—
826 M	12	Osteomyelitis tib. sin.	Neuromie.	20	5	30	60	—	—	—
827 W	—	Fibroma uteri	Untersuchung	20	2	10	30	—	—	—
828 W	42	Tumor cerebri	Trepanation	120	18	80	300	—	—	—
829 W	58	Endometritis	Untersuchung	80	4	85	140	—	—	—
830 W	34	Zahnear.	Extract. 28 Zähne	60	4	35	140	—	—	—
831 M	45	Luxatio subcorac hum.	Repositio sec. Koeh	60	8	15	100	—	—	—
832 W	52	Recidiv eines carcinom. mammae	Excis d. carc.	40	5	65	120	—	—	—
833 W	38	Empyem des antrum Hyg-mori	Trepan. v. d. Fossa canina.	40	7	15	100	—	—	—
834 W	20	Ohrpolyp	Excis	40	5	10	50	—	—	—
835 M	42	Epilepsie (n Schrotschuss?)	Trepan cerebri.	60	15	55	200	—	—	—
836 W	63	Alte Fistel	Darmresect.	40	4	140	340	—	—	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnos.	Operation	Verbrauch Eintr. d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
837	W	58	Carcinoma uteri	Hysterectomie per vias sacrales.	60	4	140	140	—	—
838	W	19	Fistel der Tibia n. Osteo myelit	Excision der Narbe	40	5	15	60	—	—
839	W	63	Ileus nach Darmresection	Eröffnung der Abdomen.	40	3	75	100	—	—
840	W	35	Carcin uteri inoperabel	Probelaparotomie.	60	4	90	120	—	—
841	W	37	Thrombose d. Saphen nach Puerper.	Ligatur d. Saphena major	60	6	15	100	Erbr. w.	—
842	M	71	Lipom d. Netzes.	Bruch Excis d. Lipoms u. Netzes	60	5	65	200	—	Fettherz
843		24	Aneurysma art. mal articul.	Schluss der Bruchpforte	40	6	140	200	—	Zuerst in Bauchlage dann i. Rückenlage Vor der Operation schon starkes Brechen
844	M	58	Arthritis fung. genu. sin.	Arthrect. gen. Excis. Anec- risma	60	10	25	200	Erbr. nach	—
845	M	3	Abscess femor.	Incisio, Auswaschung	15	2	10	15	—	—
846	M	29	Hernia inguin.	Rad.-Op.	60	5	25	100	Erbr. n.	—
847	M	12	Abscess post coxitalen	Incis Drainage	20	5	15	20	—	—
848	W	21	Fibroma mammae	Excis	50	7	25	80	Erbr. w. und nach	—
749	M	31	Fractura cruris	Abmeisselung von Fractu- renden. Coaptation ders.	80	10	80	260	—	Pot
850	M	25	Phimosis.	Incis.	120	10	10	120	Erbr. n.	—
851	M	22	Schnittwunde d. Handrücken nach Durchtrennung der Extenschnie.	Tenorchaphice d. Extens. indie. sin	50	4	25	80	Schleimbr.	—
852	M	4	Phimosis	Phim.-Op.	10	2	12	15	—	—
853	M	56	Hernia inguin duplex.	Rad.-Op.	70	6	50	140	—	—
854	M	18	Exostose der l. fem	Excis	60	8	45	145	—	—
855	W	—	Zahnaries	10 Zähne u. Wurzeln.	40	1	30	40	—	—
856	W	—	do.	17 Zähne u. Solomon	80	7	25	110	—	—
857	M	12	Häemorrhoiden	Abbindg. n. Solomon	60	9	60	120	—	—
858	M	51	Abscess n. Pirogoff.	Incis. Auskratzung	60	8	15	100	Schleimbr.	Bruchid Herzschl. Unregelm
859	W	12	Abscess resp. Fistel nach Resect. coxae	Auskratzung.	30	4	15	40	—	—

860 M	42	Altes Empyom m. Fistel	Resectio costae.	70	9	40	120	Links etwas Bronchitis.
861	76	Sarcom in d. flex. des r. Vorderarmes.	Excis.	40	5	45	100	Etwas Katarrh
862 W	42	Fibroma uteri	Hysterectomie p. Laparotom	60	8	160	250 Schleimbr.	—
863 —	22	Hallux valg.	Resectio	50	5	35	110 Erbr.	—
864 M	37	Fracturen nicht geheilt	Durchziehung, Silberfadens an der fr. Op.-Stelle	60	8	75	180	—
865 W	36	Dammriss	Kolpoperineoplastik	40	5	75	200	—
866 W	37	Retroflexio uteri	Alexander	60	6	60	200	—
867 W	43	Carcinoma uteri	Auskratzung weil inoperable	80	4	20	100	—
868 W	30	Tumor ovarii	Untersuchung	40	4	10	80	Mehrf. Erbr. Häßliche Narkose.
869 W	40	Extrauterine Schwangersch.	Laparotomic, Extrakt. ein. Foetus in 3 Mon.	40	4	60	90	Bei hochgr. Blutverlust
870 M	65	Arthritis fung cubit Abscess.	Incis.	60	4	15	60	Infiltrat. pulm sin.
871 M	4	Otitis med.	Auskratzung d. Paukenhöhle	40	4	20	50	—
872 M	19	Coxitis dextri nebst Abscess.	Resectio coxae	30	4	60	100	Erbr. w. und nach 2-3 St. nachh. Erbr.
873 M	7	Coxitis dextri	"	15	2	50	45	—
874 W	23	Zahncar.	5 Zähne 6 Wurzeln	40	7	30	100	Erbr. währ. u. n
875 W	9	Hernia ing. dupl.	Rad.-Op.	30	10	55	80	—
876 W	29	Perityphlitischer Abscess	Incis.	30	4	30	70	Erbr. n.
877 M	9	Arthritis fung genu	Resect. genu.	35	4	45	60	—
878 W	30	Extrauterine Schwangersch	Laparotomie Extract.	80	10	90	210	Erbr. n.
879 W	43	Multipl. Uterus fibroide.	Hysterectomia	45	6	180	320	Erbr. n.
880 W	30	Struma mit Stenose	Strumectomie rechts	50	8	120	70	—
881 W	60	Prolapsus recti	Excis eines 10 cm. langen Rectumstückes	45	10	115	120	—
882	32	Ostitis sterni m. Abscess	Resectio sterni part. Eröff. nung d. sternoclavicular pl.	50	8	75	120	Erbr. n.
883 W	28	Vereiterte Ovarial-Cyste	Laparotomie Excis d. Cyste	40	8	65	80	do.
884 W	12	Lymphoma colli	Excis	30	5	20	40	Erbr. w.
885 W	22	Prolapsus uteri	Kolpoperineoplastik	40	5	90	120	Erbr. n.
886 W	21	Cholesteatome des Mittelohres	Auskratzung	40	6	30	100	Erbr. w.
887 M	39	Contractur des Palmaraponeurose	Excis der Aponeurose	50	8	35	120	Erbr. w. u. n.
888	34	Abscesse	Excis derselben	40	5	35	90	—
889 W	22	Prolapsus uteri	Alexander	40	5	60	100	Erbr. w. u. n.
890 W	16	Hernia ing. dext.	Rad.-Op.	40	5	35	100	—
891 W	66	Hernia epipl. crur sin inc.	Herneotomie	30	6	35	50	Erbr. m
892 M	60	Hernia epipl. crur. dextr. incarcerata	"	60	7	30	90	—

Schr heruntergekommen
Puls. schwach

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	(Gesamter Verbrauch)	Nachwirkungen	Bemerkungen
893	W	51	Metrorrhagien	Ausratzung	60	5	30	80	Erbr. n.	—
894	W	58	Carcinoma mammae dextr. Ablatio mammae.		40	5	60	110	—	—
895	W	48	Necrose d. Endophalax d. Necrotomie		30	5	7	50	—	—
896	W	42	1. Daumens	Reposit.	40	6	20	80	Stk. Cyanose.	—
897	W	36	Fractura cruris	Lawson tail.	40	3	45	90	Erbr. w. u. n.	—
898	W	43	Dammriss	Excis	40	8	25	70	Erbr. n.	—
899	W	46	Adenoma mammae	16 Zähne und 6 Wurzeln	70	10	15	100	—	—
900	W	21	do.	15 " " 9 "	45	5	30	130	—	—
901	W	24	do.	11 " " 9 "	70	8	15	110	—	—
902	W	24	Mastitis sin.	Incis. Drainage	30	2	15	50	—	—
903	M	30	Hydrocele sin.	Operation	40	4	25	80	—	—
904	M	35	Fistula ani.	Spaltung resp. Thermocauter	80	9	20	100	—	—
905	M	58	Abscessus thoracis	Spaltung	60	6	20	60	Hochg. Cyanose währt.	—
906	M	29	Carcinoma colli ascend.	Laparotomie	50	8	70	120	—	Bronchitis.
907	W	52	Hernia crur dextr. incarc.	Rad.-Op.	30	3	20	50	—	—
908	W	39	Cystoma ovarii urinsque	Ovariectomie	40	5	55	100	Brechen direkt nach	Unvorbereitet als Notfall
909	W	32	Salpingitis	Salpingectomie p. Laparot.	60	5	105	190	—	—
910	W	50	Endometrit fung.	Untersuchung	60	5	30	120	—	—
911	M	58	Angioma d. Magengegend	Excis	40	5	15	60	Erbr. n.	Fettheiz. Puls voll w. d. N.
912	W	44	Cystoma d. r. Ligament	do.	70	8	35	110	Erbr. n.	Ist seit Jahren magenkr.
913	W	36	Lymphoma colli	do.	40	5	35	90	Erbr. n.	Fettheiz.
914	W	26	Zahnear.	22 Zähne und Wurzeln	85	13	30	125	Blutbrechen	—
915	M	19	Tendovagin fung. flexit. man. Excis. n. breiter Bröföffnung dext.		30	1	75	110	Erbr. n.	—
916	W	23	Varice	Unterbdg. der Saphen. map. oberh. d. Knies.	50	6	50	60	do.	—
917	W	32	Retroflexio uteri.	Alexander	40	8	70	125	—	—
918	W	33	Zahnear.	20 Zähne und Wurzeln	65	6	20	100	Etwas Blutbrechen.	—
919	W	27	Tuberculoze salpingitis	Laparotomie	50	8	65	110	Hochgr. Cyanose	—
920	W	33	Zahnear.	16 Zähne und Wurzeln	75	7	20	135	Blutbrechen n.	—
921	M	13	Arbit fung. genu dextr.	Resectio genu.	40	8	75	100	Erbr. n.	—
922	M	56	Valvus digiti post. contusion	Ausratzung	40	1	10	40	—	—
923	W	12	Fibromata uteri	Hysterectomie supravaginal.	50	7	120	190	Nach 3 St. etw. Brech.	—
924	W	24	Zahnear.	5 Zähne	75	4	10	95	—	—

925	W	45	—	Untersuchung	80	6	15	100	—	—
926	W	7	Arthritis fung. genu dextr. (Recidiv n. Arthritis)	Resectio genu	20	4	55	60	Erbr. n.	—
927	W	25	Lymphadenitis colli	Incis. u. Auskratzung	50	8	10	50	—	—
928	W	17	Lymphadenitis axillae	do.	30	4	15	45	—	—
529	W	18	Lymphadenitis colli	do. Tamponade	50	5	15	80	—	—
630	W	31	Cyste der r. Scheidewand	Excis	40	5	25	60	Schleimbreehen nach	—
931	W	40	Retroflexio uteri	Alexander	40	4	55	100	—	—
932	W	46	Carcinoma uteri	Hysterectomie per vias sacrales	50	80	90	120	—	—
933	M	27	Synovitis fung pedis	Incision und Excis	60	8	30	100	Erbr. n.	—
934	W	10	Ostitis media	Trepan d. proc mast.	25	4	30	40	—	—
935	M	28	Struma colloïd	Strumectomie	70	10	90	140	—	—
936	M	56	Varices	Unterbdg. d. Saphena major	40	5	8	40	—	—
937	M	1½	Hernia inguin cong. sin.	Rad.-Op.	10	5	55	20	—	—
938	W	23	Lymphomata colli	Excis	60	10	30	100	—	—
939	M	52	Tuberculos. epididym	Castratio sin.	50	5	15	70	—	—
940	M	6½	Hernia ing. epipl. in car.	Rad.-Op.	20	5	40	50	Erbr. w. u. n.	—
941	W	19	Retroflexio uteri	Alexander	60	7	60	110	—	Früher v. Rheumatismus
942	W	42	Struua col.	Strumectomie	40	5	60	150	—	Herzkl.
943	W	4	Neurom nach Amput. crur.	Ablatio fem.	40	5	45	60	—	—
944	W	28	Tubar schwangersch.	Excis d. Tub.	50	4	50	110	Erbr. n.	N. 3 Tg. Pneumonie
945	M	12	Phimosiis	Phim.-Op.	40	3	10	60	Erbr. w. u. n.	—
946	W	35	Zahnar.	6 Zähne	65	4	4	65	—	—
947	M	29	Carcinoma coeci col. ascend	Ileo coecal Resect. Res d. Colasc.	100	11	255	400	—	feine Narkose.
948	M	51	Carcinoma hep.	Probelabaratomie	40	5	60	90	—	—
949	M	29	Bursitis praepatellar.	Excis	60	7	20	80	Erbr. n.	—
950	W	38	Retroflex. uteri	Alexander	40	5	70	100	—	—
951	W	25	Lymphomata colli	Excis	60	8	80	140	Erbr. n.	—
952	W	15	Lymphadenitis colli	Incis und Auskratzung	40	5	10	40	—	—
953	—	41	Ostitis pelvis	Erweiterung der Fistel und Spaltung	70	5	15	70	—	—
954	M	53	Fractura crur. compl. dext.	Resect. d. verspr Knochen- nerven. Erweit. d. Wunden	70	6	40	110	—	—
955	W	36	Cystöse Degenerat d. Ovarien	Castration	50	6	60	120	Erbr. n. d. Op.	—
956	W	32	Retroflexio uteri.	Alexand.	40	5	65	130	do.	—
957	M	53	Fractur crur compl.	Ablatio femoris.	50	4	90	130	—	4 Tg. nachh. Pneumonie
958	W	36	—	Castratio	40	6	60	120	—	hatte Bronch.
959	M	30	Hallux incar	Operation.	50	5	10	50	—	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
960	W	38	Fibroma uteri	Hysterectomy	40	7	120	120	—	3 Tg. nachh. Pneumonie.
961	M	20	Ostitis tub. metastar. phal. indic.	Resectio d. Gelenkes.	60	7	20	125	Erbr. w.	—
962	M	53	Pyohaemie	Incis u. Thermocauter	60	4	15	80	—	—
963	M	31	Abscessus dorsii	Incis.	60	7	10	60	—	—
964	W	17	Lymphadenitis axill. sin.	do. u. Auskratzung	40	6	10	60	Erbr. w. u. n.	Sehr fett. Puls etw. schw.
965	W	11	Lymphoma colli.	Excis.	40	6	25	70	do.	—
966	M	18	Caries metastar. dext. Lym-phomata cubit.	Excis. Auskratzung des Metacarp	80	10	50	140	—	—
967	M	13	Osteomyelitis tibiae dext.	Necrotomy	40	6	35	80	—	—
968	M	6	Coxitis sin. Hysterische Contractur	Extension u. Gypsverband	30	4	12	50	—	—
969	W	48	Abscessus pedis Phlegmone	Breite Incisionen.	50	6	25	60	—	—
970	M	21	Vulbus scissum penis	Nahit	40	7	12	70	—	—
971	W	40	Cystomata renis	Nierenexstirpat.	50	7	110	210	—	—
972	M	21	Empyem d. Antr. Highmori	Eröffnung beiderseits.	100	10	30	140	—	—
973	M	53	Pyohaemie Abscess am Deltoid.	Eröffnung	40	5	20	70	—	—
974	W	20	Cystöse Degenerat d. Ovar.	Castratio sin.	10	5	60	120	Erbr. n.	Puls elend, weil schon lg. nicht gut ernährt.
975	M	55	Darmfistel u. op. Hernie.	Darmresectio	40	3	140	120	—	—
976	W	50	Varices	Ligatur u. Saphena maj.	40	4	10	40	—	—
977	W	63	Ostitis mall ext u. calcane. carc. facili	Excis der Carcinoms, Auskratzung der Ost.	40	5	35	60	Erbr. n.	—
978	W	10	Necrosis mandibul	Auskratzung	30	5	10	40	—	—
979	W	45	Fistula am Paraproct. Absc.	Spaltung und Eröffnung	100	10	20	100	—	—
980	M	77	Myxom d. Sehnenscheid. d. Flex d. r. Vorderarms.	Recidiv op.	50	4	40	100	—	—
981	W	40	Retroflexio uteri	Alexander	60	7	75	100	Erbr. w. u. n.	—
982	W	1 1/2	Microcephalus	Trepan	10	1 1/2	60	60	—	—
983	W	17	Multiple Tuberculose	Incis und Auskratzung	40	5	20	90	Erbr. u.	Besteh. Bronchitis.
984	W	32	Myoma uteri	Enucleation.	40	7	90	170	—	—
985	W	7	Multiple Tuberculose	Incis und Auskratzung	20	3	25	50	Erbr. w. u. n.	—
986	M	21	Ung. incurn.	Entf. d. Nagels u. Bettes	60	4	10	80	—	—
987	M	53	Ostitis costae m. Abscess	Eröffnung u. Auskratzung	70	6	40	110	—	—

988	M	28	Unguis incarn	Entfernung	60	6	15	60	—	—
989	M	43	Tuberculosis testis sin	Castratio sin.	80	10	45	150	—	Potator
990	W	29	Verkürzung der Grosszehen d. Contractio d Extensor- sehne.	Tenotomie d. Extensorschne	50	8	20	80	—	—
991	W	11	Seckungsabscess v Becken	Incis.	30	3	15	40	—	—
992	M	18	Unguis incarn.	Entfernung	40	4	15	60	Erbr. n.	—
993	M	30	Schnittwunde d. Flexoren Schnen	Tenographie.	100	8	40	120	—	—
994	M	40	Arthritis deformans coxae sin	Resectio coxae	60	7	45	100	—	—
995	M	19	Ostitis tali et calcanei	Evidem.	50	4	35	80	—	—
996	M	1 $\frac{1}{2}$	Ostitis med. m. Abscessbildg. 4 Wochen nach Scharlach	Trepan. d. proc mast.	30	3	15	40	—	—
997	M	68	Necrosis metacarp u. phal. I.	Resectio digiti et metacarp dext. 3 manus dext	50	6	25	60	—	—
998	W	18	Struma colloid	Strumectomy	40	6	40	90	Etw. Schleimbr.	—
999	W	17	Arthrit fung. cubit sin	Resectio cubiti sec. Kocher	40	6	60	90	—	—
1000	W	18	Struma coll.	Strumectomy	40	8	45	90	Schleimbrechen	—
1001	W	48	Tenosynovitis cubit mit Bursitis der Flexoren	Excision	50	6	60	90	—	—
1002	W	40	Retroflexio uteri	Alexander	40	5	30	80	—	—
1003	M	36	Hernia inguin permagna dext.	Rad.-Op.	100	10	70	250	Fassl. Nare, Cyan, Schlbr.	Potator
1004	W	32	Adenoma mammae	Excis.	40	5	45	100	—	—
1005	W	54	Struma profunda	Strumectomy	40	3	30	60	—	Emphysema pulm.
1006	W	29	Lymphomata axil. u. fossae infraclavicul	Excis.	60	7	110	220	—	—
1007	W	18	Lymphadenitis colli	Incis u. Evid.	40	4	10	40	—	—
1008	M	9	Phimosi	Phim.-Op.	30	4	10	40	Mehrm. Erbr. n.	—
1009	W	11	Ostitis med.	Trep. an d. proc. mast	40	3	15	50	Nachh. etw. Schleimbr.	—
1010	W	53	Hernia umbil. incarc	Darmresection (50 cm.)	40	5	90	140	—	—
1011	M	8	Lymphomata colli	Excis.	30	4	55	60	Schleimbr.	—
1012	W	1 $\frac{1}{2}$	Arthrit fung cubit	Partielle Resection	20	3	45	60	—	—
1013	W	12	Spondylitis, Psoasabscess	Eröffnung des Absc.	30	4	30	70	Erbr. n.	—
1014	W	32	Bartholinitis sin	Incis.	30	3	15	30	Schlbr.; 3 Std. spät Erbr.	—
1015	W	35	Retroflex uteri	Alex.	40	3	45	110	—	—
1016	M	31	Empyem; antri Hygmoni sin.	Eröffnung v. d. Fossa canina	100	10	25	100	Erbr. v. verschl. Blut	—
1017	W	44	Bauchbruch n. früherer La- parotomie	Vereinigung d Bauchdecken. Excis. d. Periton	40	5	100	200	Erbr. n.	—
1018	W	17	Lymphadenitis colli	Incis u. Tampon.	60	5	25	120	Cyanose	—

Nr.	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1019	W 60	Struma colloid. nebst Stenose Enucleation		60	2	45	170	—	Stark, Atherom Unregelmässige Herzaktion
1020	M 50	Epididym. tub.	Castratio dupl.	60	5	55	120	—	—
1021	M 37	Fractura und luxat cubiti	Arthrotomie u. Reposit der Fragmente	60	5	45	150	—	—
1022	W 25	Haemorrhoiden	Haem. op.	60	8	15	80	—	—
1023	M 47	Otitis med	Eröff. der proc. mast.	60	5	40	200	Erbr. n.	Fettherz. Polator.
1024	M 17	Struma m. Stenose	Strumectomie	70	5	60	160	do.	—
1025	W 62	Ostitis costae m. Abscess	Incis und Auskratzung	40	5	35	70	Erbr. im Bett	—
1026	W 22	Tumor ovarii	—	40	5	40	80	—	—
1027	W 22	Haemato salpinx	Punction u. Drain, Unters. do.	40	5	40	60	—	—
1028	W 47	Mixosarcom uteri	Excis.	40	5	15	60	—	—
1029	W 18	Lymphoma colli	—	80	8	30	120	Nachher Cyanose.	—
1030	M 23	Osteomyelitis fem.	Eröffnung d. Knochens	80	5	30	100	Nachher Erbr.	—
1031	M 21	Abscessus pectoral	Incis. Tampon	60	5	20	80	—	—
1032	W 13	Coxitis sin	Resect. coxae	50	6	45	100	Erbr. im Bett	Ist epileptisch. In der Nacht s. aufgert. Kein Anf. d. Nare. ausgelöst
1033	W 31	Haemorrhoiden	Excis.	50	5	35	100	—	—
1034	W 21	Entfg. eines Querdrains aus 1 Cyste	—	40	3	10	40	—	—
1035	W 25	Retroflexio uteri	Alex.	40	3	60	100	Im Bett Erbr.	—
1036	W 39	do.	do.	40	3	80	160	do.	—
1037	W 24	Zahnear.	10 Zähne u. Wurzeln	70	6	15	110	—	—
1038	W 45	do.	8 " und 10 Wurzeln	125	20	25	150	—	Pat. s. nerv. u. ängstlich
1039	W 24	do.	3 " 2 "	105	10	15	115	—	—
1040	M 31	Struma	Strumectomie	90	6	90	140	—	—
1041	W 61	Struma calc. Asthma.	do.	60	5	50	80	Hochgradige Cyanose. Schleimbr. im Bett.	Herz etw. schw. Bronchitis Sciolos. Hatte wg. Iridectomie f. Chlorophare. in welchem er collapsirte. Sehr schw. Collaps.
1042	M 71	Sarcoma femor sin.	Excis. m. Resect. d. vena femoral.	40	5	45	110	—	—
1043	W 48	Carc. uteri post. vag.	Extirpation uteri (Sacral methode)	30	5	150	210	—	—

	1044	M	17	---	Hautentnahme z. Transplan-	60	6	48	70	—	Vorh. 0,01 Mo. injici
	1045	M	6	do. Combustio	tation Transplant der Gesichtsggd. n. Combust.	30	4	60	—	—	—
	1046	W	45	Carc. rect	Untersuchung	70	10	27	100	—	—
	1047	W	34	Retroflex uteri	Alexander	90	10	80	140	Brechr. Sp. Erbr.	—
	1048	W	45	Carc. rect.	Laparotomie anus pr. nat.	40	5	50	80	—	—
	1049	W	34	Ovarialeysten	do. Entleerung von zwei Ovarialeyst.	80	10	75	120	Erbr. i. B.	—
	1050	—	4T	Spina bifida	Excis und Plastik	20	5	50	40	Erw. Erbr. b. Erw.	Empyem d. r. Pleura.
	1051	W	53	Empyem	Resect. cost V.	20	3	90	120	—	—
	1052	W	52	—	Untersuchung.	60	5	10	60	Erbr. i. B.	—
	1053	W	30	—	Enucleatbulbi oculdextr.	50	10	15	90	do.	—
	1054	W	25	—	Dilatat Ut Auskratzung	60	5	25	60	—	—
	1055	M	53	Ostit. med.	Trepan d. proc. mast.	80	5	40	120	—	—
	1056	M	4	Synovit fung. genu.	Incis.	20	2	35	25	—	—
	1057	M	53	Angioma lab.	Excis	80	6	30	120	—	—
	1058	W	16	Beckenabscess	Incis	30	5	20	50	—	—
	1059	W	30	Retroflex. uteri	Alex	60	8	60	120	Erbr. n.	—
	1060	M	17	Osteomyelitis femor.	Necrotomie	40	6	60	100	Erbr. Hochgr. Cyanose	Pat. vor der Op. schr
	1061	W	27	Adenoma mammae	Excis	60	10	45	100	ängstlich. Früher Chlorof. in Frei-	burg.
	1062	M	7	Resectio genu in Freiburg	Resectio genu sin.	20	3	40	40	Erbr. n.	—
	1063	M	23	Recidiv	Necrotomie	50	7	85	140	do.	—
	1064	M	55	Osteomyelitis femoris	Luxat. subcorac inveterat.	90	8	15	110	—	—
	1065	M	7	Ohrpolyp	Reposition sec. Kocher Entfernung u. Auskratzung der Paukenhöhle	20	3	25	60	Erbr. n.	—
	1066	M	77	Myxosarcoma antebrachii	Exarticulacst ubiti	30	5	45	80	—	—
	1067	M	15	Ileus.	Entero Anastomose	40	4	160	180	—	—
	1068	M	3	Phimosi	Phim.-Op.	20	3	10	20	Cyanose, stk Erbr	—
	1069	W	22	Cholesteat d. l. Ober-	Eröffnung der Paukenhöhle Martorsellen Entfernung d. Cholesteat.	60	8	75	160	Cyanose, stk Erbr Anfangs stark. Exitat nacher ruhige Nare.	—
	1070	W	32	Tuberculose Arthrit. ped.	Resectio pedis sec Kocher	50	6	105	140	Schleimbr. i. B.	—
	1071	M	—	sin Lupus d. Gesichtes	Cauteritat d. Lupus	20	3	45	50	Erbr.	—
	1072	M	26	Brandwunden des Rückens	Transplantation n. Tiersch	60	5	15	100	—	—
	1073	M	32	Ernzündetes Hühnerauge.	Excis	30	4	75	120	—	—
	1074	W	27	Perityphlitis m. Peritonitis.	Laparotomie Resect proc. verm.	40	4	10	40	—	—
	1075	W	27	Salpingitis dext.	Untersuchung	30	4	85	140	Erbr. n.	—
	1075	W	27	Salping. tub. utriusque	Salpingectomie	30	4	85	140	—	—

Nr.	(Geschlecht)	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1076	W	45	Myoma uteri	Untersuchung	40	5	10	60	—	Puls klein infolge Blut- verluste
1077	W	33	Varice saphen. maj. utr. que an der Einmündungsstelle in Femoral Vene	Exeis	40	4	50	80	Erbr. n.	—
1078	W	27	Dermoidcystö d. Ovariums.	Ovariectomie	40	5	65	100	—	—
1079	M	7	Ohrpolyp	Auskratzung der Pauken- höhle.	40	4	60	60	Mehrm. Erbr. n.	—
1080	W	45	Fibroma uteri m. s. starker Blutung	Kaiserschnitt, Enucleat. d. Fibroms. Uterus naht	30	4	90	100	—	Puls klein, Durch Blu- tung stark herunterge- kommen. Patient schon eachelek- tisch.
1081	W	45	Parametritischer Abscess v. L. Carc. recti ausgehend	Eröffnung u. Drainage	40	4	70	95	—	—
1082	W	22	Cholesteatom auris sin.	Auskratzung d. Paukenhöhle	40	4	20	60	Erbr. n.	—
1083	M	6	Idiotismus	Circuläre Craniectomie	15	2	70	100	Mehrm. Erbr. n.	—
1084	W	7	do.	do.	20	3	70	40	Erbr. w.	Patient stirbt ca 2 Std nach Op.
1085	M	8/12	Phimosis.	Phim.-Op.	20	3	10	20	—	—
1086	W	34	Abscessus abdom.	Laparotomie nachher Ent- leerung	50	7	70	80	—	—
1087	W	43	Hernia crur. dext.	Rad.-Op.	10	5	40	80	—	—
1088	W	1/2	Pes varus congen.	Achillotomomie, Redressem- forcé Gypsverbnd.	20	3	15	20	Erbr. n.	—
1089	M	27	Hernia inguin. magna.	Op.	80	8	50	140	—	—
1090	M	51	Hernia crur. epiploic. sin	Rad.-Op.	40	5	30	100	Schleimbrennen w. hoch-Pot. gradige Cyanose	—
1091	W	34	Prolapsus uteri	Exeis	40	5	70	90	Nach 2 Tg. Pneumonie	—
1092	M	29	Meniscitis traum.	Arthrotomie genu	50	6	20	80	Erbr. n.	—
1093	W	38	Carcinoma vaginae.	Exstirpat. v. hinten	50	6	120	140	—	—
1094	W	28	Hernia umbilic. epiploic.	Rad.-Op.	50	5	30	70	Erbr. n.	—
1095	M	33	Hernia inguin. dext.	Rad.-Op.	60	5	35	120	—	—
1096	W	16	Lymphomata colli u. axillae	Exeis	40	5	60	100	—	—
1097	W	23	Abscessus cubiti	Incis	30	4	15	60	Erbr. n.	—
1098	W	66	Carcinoma mammae	Ablatio mammae m. Aus- räumung u. Axilla	40	5	60	100	—	—

1099	W	43	Salpingitis	Laparotomie	40	5	55	100	Starke Cyanose.	—
1100	W	19	Struma colli	Enucleation	40	4	45	80	3 mal Erbrechen.	—
1101	W	33	Fibroma uteri	Ausschälung und Naht.	40	5	65	100	Erbrechen nachher.	Struma mit Stenose, Systol. Geräusch am Herzen
1102	W	—	Salpingitis	Untersuchung	30	5	10	30	—	—
1103	W	40	Pyelonephritis	Incis und Drainage	30	4	45	60	—	—
1104	M	30	Hernia inguin dext	Rad.-Op.	40	6	40	70	—	—
1105	M	49	Fistula tub. an, Hernia per mag. sin dext.	Rad.-Op. Spaltung.	30	5	75	120	—	Phthisis
1106	M	47	Bursitis des Tibiakopf	Excis.	80	7	20	120	Etwas Schleimbr. nach.	—
1107	M	20	Angiona labii sub.	Lippenplastik.	60	7	25	120	Erbrechen während.	—
1108	M	44	—	Untersuchung	60	5	25	100	—	—
1109	W	45	Hernia umbilic epiploie in-carcer	Rad.-Op.	50	5	40	100	—	Etwas Fettherz
1110	W	27	Zahncar.	23 Zähne	70	10	15	100	—	—
1111	W	25	Dysmenorrhöe	Auskratzung, Incis	40	3	15	50	—	—
1112	W	28	Retroflexio uteri	Alex.	40	3	40	60	—	—
1113	W	37	Abortus.	Auskratzung.	40	3	20	60	—	—
1114	W	19	Tuberkulose d. Rad. l. v. d. Tarsal kn. r.	Resectio, Evidement.	40	5	90	12	Erbrechen w. u. n.	—
1115	W	—	Fibroma uteri	Enucleation.	40	7	75	100	—	—
1116	W	30	Otitis media, Cholesteatom incip.	Trepan, d. proc. mast. Auskratzt, d. Paukenhöhle, Entf. d. Gehörknöcheln I. u. II.	60	5	85	130	—	—
1117	M	57	Struma	Strumectomy.	70	10	70	140	—	—
1118	W	72	Arthrit. fung. cubiti	Ablatio humeri	30	3	30	50	—	—
1119	M	20	Struma	Strumectomy.	80	7	45	120	Erbrechen nachher.	—
1120	W	19	Arthrit. tuberc. metatars phalang I dext.	Resectio d. Gelenkes.	40	5	30	70	do.	—
1121	W	30	Hernia nach Laparotomie	Laparotomie u. Rad.-Op.	40	5	30	80	Mehrf. Erbr. nachher	—
1122	W	9	Otitis med.	Proc. mast. Trepan.	40	3	30	60	—	—
1123	W	59	Carcinoma d. Haut u der Leistendrüsen r.	Excis.	40	5	50	70	—	—
1124	W	30	Adenoma mammae sin.	do.	50	8	30	90	Erbrechen nachher	—
1125	M	44	Zerreißung d. Insertion d Semituskeln a. l. Knie	Eroffg. u. Excis d. infiltr. Part.	90	8	30	120	—	—
1126	W	—	Idiotie myoccepholie	Circul Craniectomy.	15	3	55	25	—	—
1127	M	16	Otitis med. sin. Necros. mandib. Arthritis fung metacarp. phalang.	Resectio, Auskratzung	40	3	50	100	Erbrechen nachher	—
1128	M	22	Abscessus femor. post osti-tidem.	Incis und Entleerung.	40	5	30	60	—	—
1129	M	9	Otitis med.	Eroffg. d. proc. mast.	40	8	60	80	—	—

Nr.	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1130	W	Ostitis radii m. Abscess-Entleerung u. Auskratzung	40	40	20	40	Erbrechen nachher	—	—
1131	M	Arthritis metacarpi phal. I.	40	40	5	7	40	do.	—
1132	W	Bauchbr. m. Hysterectomie	Exces d. Bauchbr. Schluss (Unblutig).	60	6	75	160	Mehrmals Erbrechen	Sehr fetter Patient, etw. Fetherz
1133	W	Aneurisma arter. supra or- bital.	Excis nach Unterbdr.	60	12	60	160	Erbrechen nachher	—
1134	W	Knieabscess von einer Bur- sit. praep. ausgehend	Excis an Knie Excis resp. Iguipunctur	30	4	60	95	do.	—
1135	W	Ophoritis	Castratio	30	1	60	120	—	—
1136	W	Fibroma uteri	Laparotomie	40	5	60	130	Erbrechen nachher	—
1137	W	Arthritis genu sin.	Resectio arthr.	30	3	75	60	do.	—
1138	M	Abscess.	Incis	60	5	5	60	—	—
1139	W	Lymphom tub. coll. axill.	Excis	80	7	90	160	Mehrm. Erbr. nachher	—
1140	W	Arthritis fung. tub. genu	Resectio genu.	60	7	90	120	—	—
1141	W	Pes var. congenit. dext.	Tenotomie. Gypsverband	20	3	10	20	—	—
1142	W	Bursitis praep. sup.	Excis	40	5	20	50	Erbr. nachh., Cyanose	—
1143	M	Necrose des Unterkiefers	Auskratzung	60	7	35	100	Erbrechen	—
1144	M	Otitis med.	Löffelg. d. Proc. mast.	60	7	35	100	Erbr. nachh., Cyanose	—
1145	W	Carcinoma mammae recidiv.	Excis	40	5	80	140	—	—
1146	W	Sarcoma dupl.	Laparotomie, Excis	40	5	60	100	Erbrechen	—
1147	M	Lymphomata axillae tub.	Excis z. Untersuchung	60	5	50	90	—	—
1148	M	Hernia inguin. dext.	Rad.-Op.	50	7	15	80	Erbrechen nachher	—
1149	W	Osteomyelitis fem. dupl.	Incis, Necrotomie	40	5	90	90	—	—
1150	W	Otitis med.	Bröfing. d. Proc. mast.	40	3	10	40	—	—
1151	W	Carcin. ovarii, secundär des Neiz, Periton u. Blase	Laparotomie	60	6	20	60	Erbrechen nachher	—
1152	M	Lymphomata coli.	Excis	80	8	80	160	—	—
1153	M	Tubercul. otitis cubiti u. pedis.	Evidements.	30	3	15	60	Erbrechen nachher	—

1154	45	Fibroma uteri	Untersuchung	60	4	10	80	Erbrechen n.	—
1155	36	Fibromata uteri	Ovar. d. Enucleation, Ovariotomie	50	7	60	140	Mehrm. Erbr. n.	—
1156	37	Embollische Gangraen d. l. Kleinfingers.	Exarticulat metacarp. phalang. Alex.	80	6	20	80	—	—
1157	W 27	Retroflexio uteri	Resections, Enucleation	70	8	60	100	—	—
1158	M 71	Stram (Cystica permagna n. Stenose.	Excis	40	6	65	100	—	—
1159	W 67	Recidiv eines Mammac sarcom	Excis	40	4	15	40	—	—
1160	W 20	Osteomyelit fem.	Incis	40	5	15	60	—	—
1161	W 21 1/2	Otitis med und Mastoiditis	Eröffnung d Proc. mast. Resectio costae	20	3	40	40	Erbr. n.	—
1162	M —	Empyema	Arthrotomie genu	40	5	30	60	Erbr. w.	—
1163	W 20	Fungöse Synovitis gen Arthrit fung. phalang.	Excis	50	6	8	110	—	—
1164	W 22	Drusen	Exstirpat.	60	7	45	110	Erbr. n.	—
1165	M 47	Carc. rect.	Excis	60	6	180	270	—	—
1166	M 10	Otitis med	Paraenthesse beiderseits	40	6	12	50	Erbr. w.	—
1167	M 43	Steckenbleiben ein. Prothese mit 2 Zähnen im Oerophagus	Strumectomie, Oesophagotomie	80	12	90	160	—	—
1168	W 28	Ovar, cysten Salpingit.	Eröffnung verschied. extra- und in Ara - artikulärer Abscesse.	60	5	75	90	—	—
1169	M 10	Multiple Osteomyelitis	Spaltung	35	5	75	80	—	—
1170	M 22	Phlegmone der l. Hand.	Incis.	50	5	75	70	—	—
1171	W 19	Fistula ani	Laparotomie, Salpingotomie Ovariet.	50	10	20	80	Erbr. am Ende d. N.	—
1172	W 32	Extrauterin Schwangersch.	1. Alexander Tenotomie	30	3	65	120	Erbr. n.	—
1173	W 40	Prolaps uteri	Eröffnung d. Sinus frontal Zahnfistel (?) Excis und Cu- rettenentf.	70	10	140	170	Pleuronemonie	Struma, Hatte schon einige Tage Seitenstech.
1174	M 1/2	Pedes var.	Eröffnung d. Sinus frontal	5	2	15	15	—	—
1175	W 18	Frontalsinus empyem	Zahnfistel (?) Excis und Cu- rettenentf.	20	2	30	90	—	—
1176	M 19	Zahnfistel (?)	Trepan, d. Proc. mast. Rad - Op	110	20	45	170	Erbr. n.	Exitus an Herzschwäche (Gehirnverletzung in d. Alfaktoriusgegend.)
1177	M 62	Otit. med	Excis.	60	10	55	120	—	Langes Excitationsstad (Potator ?)
1178	W 32	Hernia umbilic	Rad - Op	50	10	65	140	—	—
1179	M 27	Hydrocele test. s. Phimose.	Excis.	60	10	45	110	Erbr. am Ende d. N.	—
1180	M 5	Hernia umb. ing. dext.	Rad - Op.	20	3	35	50	—	—
1181	M 44	Carc. Anie. Hernia epigast	Laparotomie	50	15	70	140	—	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1182 M	35		Osteomyelit. occipital	Rr. Incis am Nacken	40	3	30	80	—	—
1183 M	38		Hernia ing. dir.	Rad.-Op.	80	7	50	170	Erbr. n.	—
1184 W	28		Phlegmone d. r. Hand	Incis	80	5	7	40	do	—
1185 M	37		Geschw i d. r. Schenkelringd.	Eröffnung, e. t. strum. Abscess	85	3	35	130	—	Bekommt einen Malari- anfall, hohes Fieber Einige Tage vorh. Bron- chit
1186 M	64		Struma maligna	Auskratzen					—	—
1187 W	14		(Drüsen) Haut bc. unter dem r. Ohr		60	10	60	120	—	—
1188 W	18		Ganglion man	Excis	20	15	20	45	Erbr. n.	—
1189 M	24		Ulceration a. r. Unterschl.	Incis, Auskratzen	60	3	30	100	w.	—
1190 W	10		Idiotie traum. Ost. cranii	Trepanat. pariet. dextr.	50	10	30	110	n.	—
1191 M	41		Ostit. Abc. Tibiæ	Resectio a. Tibia-Talus-Gel.	30	10	60	80	Erbr. n.	—
1192 W	50		Drüse	Excis	80	7	65	150	—	Herzfehler
1193 W	15		Ostit. bc. man.	Trepanat. metacarpi II	40	3	25	80	—	—
1194 M	3		Phimose	Circumcision	40	10	30	80	—	—
1195 M	19		Hernia ing. indir	Rad.-Op.	20	2	15	20	Erbr. n.	—
1196 W	47		Struma	Strumectomie	40	7	30	60	do	—
1197 M	48		Ostit tub. ped. d.	Amput. cruris	30	5	55	60	do	Schwach. Puls
1198 M	34		—	Trepan d. Oberkiefers	40	10	45	90	—	—
1199 M	2		Phimose	Circumcisio	80	10	30	100	—	—
1200 —	17		Drusen	Excirpation	10	2	20	10	Erbr. n.	—
1201 M	7		Hypospadie	Plastik	60	5	40	160	do	—
1202 W	4		Arthrit. Abc. beider Füße und d. Radius am linken Handgelenk	Auskratzen u. Entfernung d. Sequester	25	3	20	45	—	—
1203 M	3		Phimose	Circumcis.	25	3	60	60	Erbr. n.	—
1204 W	11		Sarcoma Fibul. d.	Exarticul. Fibulæ	150	10	10	150	Erbr. w.	Systol.-Aorta u. Mitrilal- geräusch
1205 W	6		Pedes vari	Resection der Fussgelenke	20	1	90	110	—	—
1206 M	75		Arthrit fung. ped. d.	Amput. cruris.	30	1	95	80	—	—
1207 M	17		Drusen am Halse	Exstirpat.	20	2	25	40	—	Vereinzelt Raselge- räusche über die Lun- genspitzen
1208 W	16		Coxitis	Resect. coxae	30	1	15	100	Erbr. n.	—
1209 M	54		Rippenabscess	„ costae	30	1	15	70	do.	—
1210 W	60		—	Untersuchung	80	5	40	110	do.	Früher Bronchialkatarrh
					40	5	12	05	—	—

1211 M	19 Struma colloid.	Strumectomie	80	5	1	45	140 Erbr. n.	—
1212 W	28 Necrose d. l. Phalang dig II in Folge Phlegmone	Entfernung d. Sequester	20	2	7	50	do.	—
1213 M	5 Necrose a. d. Ulna (Osteomyelitis b.)	do. Auskratzung	10	2	8	20	do.	—
1214 W	35 Unguis incarn	Entfernung d. Nagels. Excis.	40	1	12	60	Etw. Schleimbr. n.	—
1215 W	62 Carcinoma mammae	Exstirpat. mammae d.	20	3	60	110	Erbr. n.	—
1216 M	60 Carcin. Recti ileus	Colostomie	80	5	35	130	—	—
1217 M	28 Schnittwunde a. d. l. Hand	Sehnenmaht	60	4	40	120	Heft. Excitat. n.	—
1218 W	24 Ostitis Patellae	Eröffn. n. Thermocauter	40	4	60	80	Erbr. n.	—
1219 M	45 Angiosarkom. Digit	Excis	100	10	25	130	—	—
1220 W	35 Arthritis. genu profus	" c. Gelenkwucherung	40	3	33	60	—	—
1221 W	41 Gonitis fung.	Resect. genu	40	5	30	100	—	—
1222 M	21 Lymphoma colli	Excis	100	15	50	240	—	—
1223 W	20 Otitis med.	Entfernung des Gehörknöch.	60	5	30	80	Erbr. n.	Leicht Potator
1224 M	2 1/2 Gliom d. N. Optic.	Resectio. Optici n Enucleat.	40	5	10	70	do	—
1225 W	11 Gonitis fungos.	Resect. genu	40	3	40	50	—	—
1226 M	20 Epidym. the.	Castrat. s.	50	10	25	100	Erbr. n.	—
1227 W	30 Hernia inguin	Rad.-Op.	60	4	40	100	do	—
1228 —	5 1/2 Phimose.	Circumcis.	10	2	15	10	—	—
1229 —	5 1/2 Hernia ing. dup.	Rad.-Op.	10	2	50	20	Erbr. n.	—
1230 W	13 Drüsen am Hals.	Exstirpation	70	5	60	120	Erbr. w. u. n.	Grosse Struma
1231 W	31 Carc. uteri	Exstirp. Uteri. Sacral Me.	40	3	105	140	—	—
1232 M	31 Hernia ing. sin epiploic. recid.	Rad.-Op.	40	5	45	90	—	—
1233 W	18 Ostitis os. front	Trepan. os. front	50	6	60	110	—	—
1234 M	27 Clavus inflammat.	Thermocauter.	50	3	10	100	—	—
1235 M	12 Sarc. fib	Exarticul. cruris	40	6	60	80	—	—
1236 M	21 Hautdefect nach Periostit.	Transplantat. n. Thiersch u. Auskratzung	50	5	20	100	Erbr. n	—
1237 M	65 Verstopfung der Tränenk.	—	50	5	25	120	Etw. do.	—
1238 W	36 Otitis sclerot	Paracenth. Entfernung von Hammer und Ambros	60	7	25	110	Erbr. w.	—
1239 M	23 Otit med	Trepan d. Proc mast.	60	6	100	240	Erbr. n.	—
1240 M	5 Spina sept nar	Wegmeisslung	30	2	20	60	Erbr. w.	—
1241 M	21 Hernia ing.	Rad.-Op.	60	5	55	130	—	—
1242 W	33 Ovarialeyste	Untersuchung	40	5	20	100	Erbr. w.	Struma
1243 W	52 Carc. mammae	Amput. mammae s.	60	3	65	160	Erbr. n.	Kurz vorher Bronchitis
1244 W	34 Struma	Strumectomie	40	3	50	100	Erbr. n.	—
1245 W	15 Ostit the. metacarpis	Auskratzung	30	2	18	50	—	—
1246 W	33 Dermoidcyste d. l. Ovariums/Exstirpation p. Caparat	—	60	5	75	140	Etw. Erbr. n.	Strum. Pt. i. Grav. i 5. M

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1247	W	67	Carcin. col	Laparotomie	60	10	60	110	—	Strm d. gl. u. d. f. T. Bld.
1248	W	35	Hydrosalpinx dupl	Ovario und Salpingotomie	40	5	105	180	—	—
1249	—	53	Phlegmone a. Oberschenkel	Incis	6	5	20	140	—	—
1250	M	30	Ranula	Excis	60	5	25	120	Erbr.	—
1251	W	27	Ostit the. Tibiae	Necrotomie	40	5	40	90	Starke Schweisssekretu	—
1252	M	50	Epididym. the	Castr.	50	5	45	140	Erbr. n.	—
1253	M	27	Gonitis fungosa s.	Resect. genu	60	7	85	130	do	—
1254	W	6½	do.	Arthrotomie	30	2	65	60	do	—
1255	W	6	Otitis med. sin	Eröffnung d. Proc. mast.	20	6	45	80	Schleimbrechen w.	Lk. Lungensp. verd.
1256	M	8	do.	do.	20	10	55	160	Erbr. w.	—
1257	M	27	Recidiv e. oper. Lstenhern.	Rcd.-Op.	40	10	75	200	—	—
1258	W	35	Salpingitis dupl.	Salpingectomie	60	5	130	220	—	—
1259	M	17	Hernia inguin dextr.	Rad.-Op.	40	5	10	120	—	—
1260	W	46	Salpingitis dupl.	Salpingectomie	30	3	80	160	—	—
1261	W	18	Struma colli	Strumectomie	30	4	25	60	—	—
1262	W	45	Carc. uteri	Hysterectomie sacral	40	3	105	150	Erbr. n.	—
1263	W	44	Hernia ing. ext sin	Rad.-Op.	60	6	60	130	—	—
1264	W	57	Otitis med. dextr.	Trop. d. Proc. mast.	60	6	50	110	—	—
1265	W	6	Gonitis fung. s.	Arthrotom	25	5	8	100	Mehrm. Erbrechen w.	—
1266	W	6	Zerreiſſung d. Dorsalf. der Extensor - Sehnenhaut und r. Hand der Maschine	Transplantat.	25	5	25	180	—	—
1267	M	39	Ostitis pelvis	Resectio crista ilei dextr.	40	7	40	140	—	—
1268	M	30	Stricture uretr.	Sondirung	50	3	10	100	—	—
1269	M	22	Zahnabscess	Incis a. d. Wange, Zahnextr.	100	10	15	100	Erbr. n.	—
1270	M	36	Drüse (verreirte) am Hals	Incis	40	5	20	80	do.	—
1271	M	32	Struma colli	Strumectomie	30	5	55	60	do.	—
1272	M	13	Osteomyel. fem. dextr. invetr.	Necrotomie	20	2	50	70	do.	—
1273	—	34	Osteomyel. Tibiae s.	do	80	15	35	120	—	—
1274	W	22	Tubargeschwulst	Laparotomie	20	2	60	120	—	—
1275	W	33	Struma	Strumectomie	60	10	90	120	Erbr. n.	—
1276	W	30	Fibromyom	Hysterectomie abdom	40	5	110	170	do.	—
1277	M	18	Otit med. s.	Trepan. d. Proc. mast. s.	40	5	23	140	—	—
1278	W	42	Lipom üb d. untern rechtern Rippen i. d. Axillarlum	Exstirpat	40	3	100	100	—	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachbemerkungen	Bemerkungen
1317	W	34	Ovarialeyste d	Laparotomie	60	5	70	130	—	Im Anfg. d. N. Coll., d. d.
1318	M	6½	Sequester nach Op.	Necrotomie	40	2	15	40	Schleimbrechen n.	Entf. v. Schl. a. d. Mund- höhle sofort gehoben w.
1319	W	11	Pross. Inguinal Anphl. Knicks	Exstirpation	20	2	55	60	Erbrechen w.	—
1320	W	20	Otitis med.	Trepan d. Proc. mast.	80	10	85	220	—	—
1321	W	80	Hamulung d.	Rach.-Op.	40	3	45	100	—	Struma
1322	W	9	Ostit. tub. otitisch u. d.	neis. Auskratzung.	20	2	25	40	Erbr. n.	—
1323	M	25	Fract. Phal. I Indic. s.	Repositio	120	12	48	180	Erbr. n.	Trenor. Hattr. gegess.
1324	M	27	Otitis med. d.	Trepan. d. Proc. mast. d	80	10	25	160	—	S. ge. str. Trem. Cyan
1325	W	23	Inguinaldrüse d	Incis.	60	8	10	80	—	—
1326	W	56	Carc. uteri	Sacrale Hysterectomie	100	7	90	210	Erbr. n.	Inj. v. s. Spr. Aether w. schw. p. sof. n. Op.
1327	M	33	—	Eröffnung d. Sinus ethmoidal	120	10	35	200	—	Stark. Excitat.
1328	W	55	Carc. mammae ad	Anst. mammae	50	3	40	90	—	Struma. Obesitas.
1329	—	49	Ostit. fung. tili	Ext. Tali. Res. d. Malleolen	60	6	45	180	—	—
1330	W	38	Vereiterte Fibromyome	Laparotomie	70	6	40	90	Erbr. n.	—
1331	M	33	—	Exstirpat. des Tränensackes und der Tränendrüse	160	7	50	380	—	Schw Puls.
1332	M	46	Ostit fung. capit hum	Resection humeri	40	5	45	160	—	—
1333	W	20	Otit med. d.	Trep d. Proc. mast.	140	10	60	240	Erbr. n.	—
1334	W	27	Struma colloid haemorr.	Strumectomie	100	10	85	220	Erbr. w. u. n.	Stenose d. Trachea
1335	M	58	Ulcus cruris s.	Unterbindung	40	3	8	50	—	Struma
1336	M	19	Osteomyelitis humeri d.	Necrotomie	60	5	45	100	Erbr. nach	—
1337	W	24	Periostitis malleol ext	Auskratzung	60	4	15	80	Erw. Schleimbr.	—
1338	W	52	Beckenabs. sub sp. s. a. os. il	Incis. Necrotomie	60	4	15	80	Erbrechen w.	—
1339	W	52	Carcin. uteri	Auskratzung	80	10	150	100	Erw. Erbr. w.	—
1340	M	56	Carc. Recti	Sacrale Exstirpat.	170	12	65	170	—	—
1341	M	33	—	Exstirpat. des Tränensackes	80	10	60	100	—	—
1342	W	35	Lupus d. l. Wange	Exstirpat. u. Kauterisat.	60	5	10	100	—	—
1343	M	41	Hämorrhoiden	Ligatur	100	10	25	140	Schleim reichl. expect.	—
1344	W	26	Empyem d. sin. front.	Eröffnung	60	5	30	100	—	—
1345	M	17	Struma profunda	Strumectomie	60	5	50	120	—	—
1346	M	25	Lux at. Mus. int. art. gen. d.	Excis. der abgespr. Menisc.	100	5	30	140	—	—

1318 M	32	Hern ing dir. d.	Rad.-Op. Resect. d. process vermi fonis	100	5	60	200	—	Sehr anäm. Albuminur.
1349 M	30	Urethrafistel	Urethrotomia posterior	100	5	35	160	Erbr. n.	—
1350 M	29	Drusen am Hals	Exstirpat.	60	3	25	80	—	—
1351 M	—	Otit. med s.	Trepan. d. Proc. mast	120	15	35	200	—	—
1352 M	6	Pilegnone man s.	Incis	30	4	2	35	—	—
1353 W	20	Dammriss	—	70	1	—	—	—	Struma coll.
1354 W	20	do.	Perineoplastik	40	5	80	130	—	Erythema a. Hals u. Brust
1355 M	32	Contract. dig V s.	Exe d. Verw. d. Flex.-Sehn.	100	5	40	140	Erbr. n.	—
1356 M	13	Ostit. fung. ped. d	Inc Auskr. v. Metast. I Calc.	20	2	30	60	—	—
1357 M	22	Necrose phalang II pollic. s.	Necrotomie	80	5	7	100	—	—
1358 W	30	Empyem d. s. front	Trepan. d. Front. d.	40	5	15	100	—	—
1359 W	30	do.	do.	80	10	40	190	—	—
1360 W	37	Extrauterinschwangerschaft in 2 bis 3 M.	Laparotomie	70	16	60	140	—	—
1361 W	18	Struma cystica	Strumectomie	40	3	30	190	Erbr. n.	Kurze ab. heft. Excitir.
1362 W	20	Ganglion an der Sehne d. adduct pollic.	Excis Incis	60	3	15	100	do.	—
1363 W	30	Arthritis genu	do. Auskratzung	60	5	20	90	do.	—
1364 W	15	Abscess	Excis	40	5	30	80	do.	—
1365 M	19	Schneideverletzung am Index	Excis d. Verwachsungen	80	7	25	130	Brechb. w. Excit. b. Erw.	—
1366 W	16	Drüse unter dem Kinn	Excis	20	5	18	60	Erbr. n.	—
1367 M	6	Lymphom.	do Auskratzung	20	2	20	40	do.	—
1368 M	3	Hernia ing s.	Rad.-Op.	20	2	35	50	Erbrechen w.	—
1369 M	31	do.	do.	100	10	50	210	Reichl. Schleimsecret.	—
1370 M	57	Carc. labii int.	Excis	100	10	45	250	—	—
1371 M	19	Spina ventosa r. Mittelfg.	Necrotomie	100	6	15	100	—	—
1372 W	38	Dammriss	Dermaplastik	80	10	75	20	—	—
1373 W	30	Retroflexio uteri	Alexander	50	5	70	180	—	—
1374 M	63	Carc pylori	Gastroenterostomie	40	20	130	320	Brechreiz w. Brech. n.	—
1375 M	6	Gonitis tub. destr.	Resectio genu	20	7	10	70	—	—
1376 M	—	—	Phim.-Op.	5	2	10	20	—	—
1377 W	25	Drusenabscess am Hals	Incis. Drainage	20	5	20	50	—	Maxim Puq illenw. zeitw.
1378 W	23	Abscess am l. Vorderarm.	Incis.	15	5	30	60	—	—
1379 M	26	Abscess über d. v. os iloi	do.	40	15	50	140	—	—
1380 W	18	Ostitis cristae ilei.	Alexander	20	5	50	110	—	—
1381 W	21	Pyosalpinx	Salpingotomie	10	10	80	280	—	—
1382 M	33	Struma sarcomat.	Strumectomie	20	10	70	320	Mehrm. Erbrechen w.	Zeitw. maxm. Pupillenw.
1383 M	2	Navus Vascul	Excis	—	3	20	50	Erbrechen w.	—
1384 W	2 1/2	Spina ventosa	Incis. Auskratzung	—	5	30	80	do.	—
1385 W	25	Osteomyelitis fem chron	Incis. Aufmeisslung etc.	—	5	70	190	Erbrechen n.	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Narkose	Dauer d. Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1386	W	49	Fract malleol. int. male sup.	Incis. Gypsverband	20	5	140	—	—
1387	W	13	Neurose d. Kniegelenk.	Incis.	30	10	45	—	—
1388	M	18	Osteomyel. fibul.	do. Drainage	20	10	80	—	—
1389	W	21	Otit med. mit Eiterung in Proc. mast.	Trepan. d. Proc. mast.	50	5	60	—	—
1390	W	30	Lymphosarcoma colli	Excis.	80	5	40	—	—
1391	M	50	Arthritis tuberc. manus dextr.	Resectio manus	100	5	50	—	—
1392	M	21	Struma cystica	Enucleation	70	5	50	—	—
1393	W	34	Cystadenoma mammae sin.	Excis.	50	10	45	—	—
1394	W	55	Carcinoma faciei	do.	40	3	30	—	—
1395	M	30	Stricture urethrae traumatica	Urethromia ext.	70	10	80	—	—
1396	M	3	Hydrocephalus congenit.	Trepanation	10	7	60	—	—
1397	W	55	Tumor Parotidis	Excis.	35	10	45	—	—
1398	W	16	Paratub. Abscess a femur	Resectio part. capit. fem.	30	5	10	—	—
1399	W	17	Osteomyel. fem. chronica	Necrotomie	18	8	50	—	—
1400	M	25	Ostitis phalang.	Incis. Auskratzung	15	5	30	—	—
1401	W	—	Lupus faciei	Auskratzung. Thermocaut.	35	8	15	—	—
1402	M	5	Perityphlitis recti	Incis. Drainage	50	10	80	—	—
1403	W	68	Gonitis tub.	Amput. fem.	40	7	50	—	—
1404	W	17	Ostitis metacarpi V tub.	Incis. Ausmeisslg. Auskurtz.	40	8	20	—	—
1405	M	21	do. IV do.	do.	50	10	20	—	—
1406	M	15	Osteomyelitis tibiae s.	Necrotomie	40	10	45	—	—
1407	W	21	Otit med. m. Eiterung in P. m.	Evid. d. Proc. mast.	50	10	50	—	—
1408	W	17	do.	Trepan. d. Proc. mast.	45	8	70	—	—
1409	M	18	Hernia ing. ext. Hydrac. fem.	Herniotomie	10	15	50	—	—
1410	W	21	Periton. tubere	Laparotomie	50	12	50	—	—
1411	W	25	Gonitis fungosa	Resectio genu	40	10	55	—	—
1412	W	7	Ostitis metatarsi V	Aufmeisslung und Auskurg.	30	10	25	—	—
1413	M	42	Otitis med. m. Eiterung in Pr. m.	Trepanat d. Proc. mast.	50	10	50	—	—
1414	W	20	Struma hyperplast colloides	Enucleation	40	5	50	—	—
1415	W	58	Struma fibrosa	Strumectomy	30	5	55	—	—
1416	—	44	Ostit. rib. tub.	Necrotomie	30	10	35	—	—

Nr.	Sehl.	Alte	Diagnose	Operation	Vorbr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Wauer der Narkose	Verbrauch	Nachbeobachtungen	Bemerkungen
1160	M	20	Cystitis chron.	Resectio cystae	50	5	50	160	Wenig Erbrechen u.	—
1160	M	35	Empyema sin. front.	Trepan sin. fract.	60	6	75	200	—	—
1161	W	35	Periostitis oss. pub.	Incis.	70	6	35	120	Erbrechen nach	—
1162	M	38	Hydrocele testis.	Excis.	60	5	45	160	—	—
1163	M	15	Ostit. metac. indic. tuberc.	Incis. Evid.	40	5	25	100	Erbrechen nach	—
1164	M	16½	Arthrit. sac. tub.	Incis. Necrotomie	40	3	35	100	do.	—
1165	M	5	Lymphomata colli suppur.	Incis.	20	3	20	40	do.	—
1166	M	11	—	Transplant. nach Nasenop.	30	5	30	100	—	—
1167	W	16	—	Incis. do.	40	5	35	160	—	—
1168	W	44	Myomata uteri subser.	Myotomie	50	5	125	220	—	—
1169	W	60	—	Untersuchung	40	5	15	70	Erbrechen nach	—
1170	M	6	Gonitis tub. sin.	Resectio genu	30	3	50	80	—	—
1171	M	18	Otitis med.	Operation	50	7	95	200	—	—
1172	M	22	Spondyl. tub. Fiste! colli	Incis. Spalte! Tampon	40	5	50	100	—	—
1173	W	14	—	Eröff. d. Laparotomiewunde	30	4	35	110	—	—
1174	W	50	Peritrep. Abscessus	Incis.	30	4	35	110	—	—
1175	M	4	Ektopia vesicae Epispadie	Plastik	30	3	60	160	—	—
1176	W	21	Struma colli	Strumectomie	60	5	50	100	—	—
1177	M	36	Phimosi	Plün Op	50	4	20	120	Erbrechen nach	—
1178	M	50	Necrosis maxill. inf.	Necrotomie	40	3	30	140	—	—
1179	M	18	—	Plastik	70	6	75	220	Erbrechen nach	—
1180	W	10	Abscess	Incis.	30	4	15	60	do.	—
1181	M	48	Darmperforation	Laparotomie	50	5	100	190	—	—
1182	W	30	Struma colli	Strumectomie (Enucleation)	50	5	75	140	Erbrechen nach	—
1183	M	17	Fractur patellae	Incis. Fixation	60	6	30	120	do.	—
1184	W	64	Prolaps vagin.	Kolporrhaphie	50	8	90	180	do.	—
1185	W	61	Stilorsio eines Ovarial- cystos	Ovariometrie	30	5	60	100	—	—
1186	W	58	Cystoma ovarii	do.	40	7	55	200	—	—
1187	W	52	Prolap. der vorü und hint. Vag-Wand	Kolpoperineoplastik	30	6	80	120	—	—
1188	M	45	—	Aufn. d. Aut. High. u. Ausk.	50	10	20	180	—	—
1189	M	29	Osteomyelit. fem. chron.	Trepan. d. Femur	60	6	65	155	—	—
1190	M	32	Diphth. chron. mit pelv.	—	—	—	—	—	—	—

S. collab. Sch. 3 mal pkt

Vereinzt. Bronchit.

1491	M	16	Knochentubercul, a. Fussge- lenk und Hand	Necrotomie a. Fuss. Resect. d. Hand	40	8	60	110	Starkes Erbrechen	—
1492	M	18	Osteomyelit. staphyl. colica d. Fibula	Necrotomie d. Fibula sin. Auskrautung Laparot	50 30 60	6 5 10	40 20 40	100 45 100	— Wenig Erbrechen	—
1493	M	6	Tuberc. d. Kniegel. (Reicl.)	Excis	15	3	30	30	Mehrf. Erbr. w. Cyanose	Matte Milch getrunken
1494	W	26	Dermoidcyste d. Ovariums	Excis	35	6	95	150	—	Sch. Vesicularatrn. ü d r Sp
1495	W	5	Tubercul. d. subcut. Zell- gew. a. Fuss	Excis	50	5	15	70	—	Puls frequent u. klein
1496	W	51	Multiple Scroph. oderna knot. Tuberc. d. Os cuneiforme I	Excis	40	5	180	180	—	Lang. d. u. s. h. Excitationst
1497	M	29	Periartic. Abscess n. Coxit.	Excis	70	10	35	150	—	Emphyesen
1498	W	37	Ileus	Darmresect.	40	8	40	90	—	—
1499	M	32	Empyem d. Antr. Highmori	Trepanat. d. Antrum	30	5	30	70	Erbr während	—
1500	M	66 1/2	Carcinoma oesophagi	Gastrostomie n. Albert	100	6	60	240	Erbrechen nach	—
1501	M	11	Hydrocele testiculi	Rad. Op.	10	6	35	80	1 Erbrechen	—
1502	M	34	Tuberc. Lymph. d. Halses	Excis	50	6	85	110	—	Am Tage nachh. stark. Ei- weissgch. d. H. d. all. abn.
1503	W	45	Gr. Fibrom der Bauchhaut	Excis	20	5	15	40	Erbrechen w. und nach	—
1504	W	51	Supra vaginale Hypertroph.	Amput. d. Cervix. Kolpor- rhaphie post.	80	10	55	150	Erbr. im Anfang u. n.	Am Tage nachher Eiweiss in Harn, d. a. w. verschw.
1505	M	5 1/2	Fistel nabpeityphlit. Absc.	Erweiterung und Drainage	60	10	25	100	Erbrechen nach	—
1506	W	30	Prolap. d. v. Vaginal-Wand	Kolporrhaphia anterior	100	5	65	200	do.	Nach der Nark. f. e. T. bed. verstkt. Eiweissg. d. Hrn.
1507	W	18	Tubercul. calcan. Pes plan	Incis auf Calcane.	90	10	70	230	—	Am Tage Harn z. stk. eivh. Am folg. Tag w. verschw.
1508	M	34	Lymphome d. Halses	Excis	50	10	55	200	—	Cyan. u. zeitw. Sist. d. At- mung mit vorh. d. N. Am f. M. Eiwh. in H. A. w. n. m.
1509	M	20	Pseudarthrose der Ulna.	Trepanf. Antirsch. u. Ligatur d. Bruchenden n. Eisendraht	40	5	20	60	—	Etwas Emphysem
1510	W	21	Luxatio des Radius	Excis	70	8	35	110	—	—
1511	W	35	Lipom am Oberschenkel	Excis	20	3	10	40	Erbrechen nach	—
1512	M	—	Sequest. d. I. Phal. d. r. Darm	Excis	100	8	10	100	—	—
1513	M	64	Hernia inguin	Herniotomie	50	4	50	100	—	—
1514	W	53	Ung. incarn	Ausreissen d. Nagels	40	6	40	90	Erbrechen	—
1515	M	45	Fistula ani	Spaltung	50	3	10	50	—	—
1516	W	30	Graviditas extrauterina	Laparotom	60	7	90	160	—	—
1517	W	49	Carcinoma mammae	Amput. mammae	40	6	40	90	Erbrechen	—
1518	W	52	Haematom a. Oberschenkel	Multiple Incis	50	3	10	50	—	—
1519	M	32	Bursitis calcanei	Excis. d. Bursa	60	5	25	90	—	—
1520	W	—	Empyem d. Gallenblase	Cholecystotomie	50	5	85	100	—	—
1521	M	20	Gonitis tuberc.	Resect. genu	60	7	90	160	—	—

Nr.	(Geschlecht)	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesährlicher Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1522	W	45	Paraverticillium u. Ovariell.	Ovariectomie	10	4	70	100	—	—
1523	W	18	Tuberculosis calicem	Ignipunctur	10	3	10	80	—	—
1524	M	49	Struma colloides	Strumectomie	90	10	80	160	—	—
1525	M	22	Pain de hernie	Nacht d. Leistenkanals	60	5	15	60	—	—
1526	M	58	Hernia inguin.	Herniotomie	120	7	55	200	—	—
1527	W	41	Talotetrol des Fussgelenkes	Resect. ped.	30	3	70	120	—	—
1528	W	24	Dermoidcyste u. Otophthik	Excis.	40	4	30	65	—	—
1529	M	27	Tuberculosis testis	Castratio	60	9	35	115	Erbrech. u.	St. Saliv. u. Cyn. w. d. N.
1530	W	49	Cystadenoma mammae	Amput. mammae	10	6	30	80	—	Cyanose w.
1531	M	6	Tuberc. d. Kniegelenk (Reed.)	Auskratzen	30	3	15	40	—	—
1532	M	44	Empyem d. Antre Hygnum	Trip. d. Antre. Hygnum	65	3	15	65	Erbr. d. verschl. Blutes u.	—
1533	M	42	Pso. c. n. n. v. n. v. n.	Tenotomie d. Achillessehne	10	1	12	10	—	—
1534	W	29	Hernia abdominalis	Hern. Lösg. v. Adh. u. Brid	60	5	80	100	Erbrechen nach	—
1535	W	46	Gonarthrit. tub.	Resectio genu	70	6	85	130	—	—
1536	W	42	—	Untersuchung	50	7	15	60	—	—
1537	W	35	Haematosulpinx	Salpingotomie	70	7	45	100	—	—
1538	W	—	—	Untersuchung	60	5	15	100	Cyanose, Erbrechen	Struma
1539	W	2	Hilus	Anleg. c. Ann. pract. natur.	60	5	10	70	1 m. Erbrechen	—
1540	W	42	—	Prothelapnotomie	30	3	10	65	—	—
1541	M	75	Hernia inguin.	Herniotomie	40	5	35	60	Erbrechen	—
1542	M	18	Osteomyelitis hum. chronica	Trepan d. Humerus	40	5	55	90	1 m. Erbrechen w.	Am folg. Morgen eine Spur Eiweiss im H., das nach 4 Tg. wiet. verschw. ist
1543	W	87	Canceroid d. Kopfhaut	Excis.	20	5	15	30	—	Am folg. Tag etwas Eiweiss im H., das nach 2 Tagen wieder verschwund ist
1544	W	50	Myoma uteri	Myotom.	40	5	75	100	—	—
1545	M	27	Hernia inguin.	Herniotom.	80	8	20	100	—	—
1546	W	—	do.	do.	80	8	15	110	—	—
1547	M	10	Verletzung d. Praeputiums	Partiell. Resect d. Praeput.	60	17	10	65	Erbr. i. Anf. d. N. u. nachh	—
1548	M	32	Hernia inguin.	Herniotom.	80	10	45	120	Erbrechen nach	—
1549	M	6	Gonitis tub. (Reed.)	Auskratzen	30	4	15	60	Cyanose b. Beginn d. N. Starke Struma	—
1550	W	18	Tubercul. calcan.	Ignipunctur	80	15	10	100	—	—
1551	M	34	Gonitis tub.	Resect. genu	100	10	85	220	—	—
1552	W	26	Salpingitis (?) Myoma uteri	Castratio	70	5	65	150	Erbrechen	Am Tag n. d. Op. eine Spur Eiweiss i. H., das n. 3. Tg.

1553	M	14	Lymphosarcoma colli	Excis.	30	4	75	170	Erb. d. gsehl. Blutes und Kochsalzlösung	Am Tag n. d. Op. eine Spur Eiweiss i. H., das d. and. Tags wied. verschw. ist
1554	M	2	Phimose	Spaltung d. Praepulviums	10	2	10	20	—	—
1555	W	26	Lymphdr.-Eiterung i. d. Axill.	Drüsenexcis	70	6	15	70	—	—
1556	W	34	Empyem d. Antr. Highmori	Trepan d. Antrum	40	5	60	220	Erb. des gsehl. Blutes	—
1557	W	22	Abscess im Abdomen	Incis u. Drainage	70	5	45	120	—	Am Tag n. etw. Eiw. i. H.
1558	W	17	Tubercul. d. Handgelenkes	Resectio manus part.	40	5	35	80	—	—
1559	M	2	Caries sterni	Auskratzung	10	2	12	20	—	—
1560	W	34	Salpingit.	Salpingotom	75	5	80	150	—	—
1561	W	60	Struma colloid.	Strumectomie	80	10	45	170	—	Aetherisirg. m. d. Arnd'schen Ap.
1562	M	25	Hasenscharte	Rad. Op	108	10	50	210	—	do.
1563	W	32	Abscess a. d. Hüfte	Incis	60	5	20	80	—	—
1564	M	29	Luxativ radii n. Fractur	Resect d. Radiusköpfchens. Entfern. eines Sequest.	60	6	40	160	Erbrechen nach	Am d. Op.-Tag zieml. stkl. Eiw.-Geh. i. H., am folg. Abend verschw.
1565	W	22	Otitis mastoidea	Trepan. d. Proc. mast.	140	10	20	160	Erbrechen w.	Arnd-Apparat
1566	M	50	Sarcoma pari. abd	Excis	60	10	20	120	—	—
1567	W	23	Lymphomata colli	do.	40	5	55	120	Erbrechen	—
1568	W	1	Tuberc. Metacarp II	Incis. Auskratzung	10	3	7	30	—	—
1569	W	5	Div. i. ganzen Körper zerstreute Lupusknoten	Excis	30	5	25	60	Erb. n. u. stkl. Erbr. w.	—
1570	W	53	Papillome beider Ovarien	Ovariectom.	50	10	70	140	1 m. Erbrechen nach	—
1571	W	26	Fibromyoma uteri	Untersuchung	40	5	15	80	Etw. Erbrechen nach	—
1572	M	3/4	Otit. mast	Trep. d. Proc. mast.	20	4	10	25	—	—
1573	W	27	Cholesteatom	Starke'sche Op.	10	15	50	140	Erbrechen nach	—
1574	W	26	Fibromyoma uteri	Myonotomie Castratio	60	6	90	150	—	Am folg. Morg. e. Spur Eiw. i. H., die ab. a. and. Morg. wied. verschwund. ist
1575	M	34	Tuberc. d. Fussgelenkes	Amputat. cruris	60	6	40	140	Erbrechen nach	—
1576	M	39	Tubercul. testis	Castratio	60	8	20	100	—	—
1577	W	60	Prolapsus uteri	Kolporrhaphia ant. et post.	70	8	75	150	—	—
1578	W	22	Hernia ing.	Herniotomie	60	10	35	120	1 Erbrechen nach	—
1579	W	43	Osteomyelit. femor.	Aufmeisselung	100	10	55	200	—	—
1580	W	—	Schmerz. Amput.-Strumpf	Resect. desselben	50	10	20	130	Stk. Erbrechen w.	—
1581	W	18	Tubercul. calcanei.	Incis. Auskratzung	60	10	25	80	do.	—
1582	W	14	Tube. tarsi. Tub.-Dr a Kinn	Inc. a. d. Fussr. Auskr. d. Dr. a. Kinn u. e. Fist. a. Ellb.	60	10	30	80	1 m. do.	Ur. n. d. N. stkl. eiweisslgt. am 3. Tag n. d. Op. wieder verschwunden

Nr.	Alter	Diagnose	Operation	Veranl. obis	Eintritt der Narkose	Innerer Narkose	(Veranl. obis)	Nachwirkungen	Bemerkungen
1583	M 25	Hernia inguin.	Herniotomie	10	15	50	160	—	Sehr unruh. Narkose. Stk. Cyanose und Salivation. Struma. Etwas Potator.
1584	W 21	Nadel i. d. Bauchdecke r.	Extract.	20	5	10	20	—	—
1585	W 23	—	—	40	8	25	80	—	—
1586	W 28	Retraversio uteri. Varicoz.	Alex. Ligatur bd. V. saph.	50	10	65	150	—	—
1587	W 52	Pericardial Abscess	Entfernung	40	10	15	50	Erbrechen nach	—
1588	W 46	Ovarialtumor	Ovariectomie	50	7	50	120	—	—
1589	W 47	Ostitis tarsi	Incis u. Auskratzen	40	6	15	60	1 Erbrechen nach	—
1590	W 35	Fibroma uteri subperiton.	Enucleat.	60	7	65	160	—	—
1591	W 63	Rippenecar.	Rippenresekt.	30	3	55	120	—	—
1592	W 52	Carc. uteri	Totalextirpation u. Kracke	40	5	120	160	—	Am Abd. etw. Eiw. i. H. d. a. folg. Abend weg ist Am folg. Morgen etwas Eiweiss im H.
1593	W 23	Struma colloid.	Strumectomie	60	8	35	120	Erbrechen nach	—
1594	W —	Hernia epigastrica	Rad.-Op.	70	8	30	130	do.	—
1595	W 23	Exostosis digit. ped.	Abtragung	70	7	6	110	—	—
1596	M 16	Zerschnitt. Extensorensehne eines Fingers	Schnennahrt	50	3	20	80	—	—
1597	W —	Lymphdr.-Absc. unt d. Arm	Incis u. Auskratzen	50	3	20	70	—	—
1598	W 23	Dammriss	Dammplastik	90	10	55	130	—	—
1599	W 53	Cystoma ovarii	Ovariectomie	50	5	50	120	—	—
1600	W 28	Tuberculosis ovarii	do.	80	10	80	170	—	—
1601	W 11	Tuberc. calcen.	Exstirpat d. Calcaneus	20	3	45	80	—	—
1602	W 18	do.	do. u. Talus	40	7	60	110	—	—
1603	W 50	Hernia incarcerata	Rad.-Op.	40	10	50	120	Starke Dysp. Cyanose	Etw. Bronchit. 4 Std. n.d.
1604	W —	Carc. uteri	Colotomie. Anus priet. unt.	40	5	40	60	—	Op. Exit a. Lungenoxd.
1605	W 41	Phlegmone d. Hand	Multiple Incis	100	7	10	130	—	—
1606	M 13	Osteomyelit. tib. acut.	Trepan d. Fib.	40	3	15	60	—	—
1607	W —	Ren mobilis	Untersuchung	70	5	10	90	Starkes Erbrechen	—
1608	W 35	Arthrit. deform.	do	70	5	15	20	do. nach	—
1609	M 25	Fractura olecrani	Excis d. Olecran.	50	5	35	100	Erbrechen	—
1610	W 52	Hernia crur. beidseitig	Herniotomie	60	5	65	160	do.	Am folg. Tag etw. Eiw. im H. nach 2 T. weg

	6	Schl. gehaltte Resect. genui	Redressement	20	2	20	80	—	—
1611 M	52	Ron mobilis	Retrofixation d. Niere	70	6	60	130	Erbrechen	—
1612 W	27	Abscess d. Gallenblase	Incis. Drainage	40	5	30	80	—	—
1613 W	28	Hern ing.	Herniotomie	40	5	25	110	Erbrechen nach	—
1615 W	26	—	Resect d. Proc. vermiformis à froid	70	5	60	200	—	—
1616 —	3 1/2	Hernia incarc.	Herniotomie	10	4	30	35	—	—
1617 M	40	Gonit. tubere.	Resect. genui.	60	5	90	250	—	—
1618 M	9	Tuberc. beide Fussgelenke	Resect ped. m. Talus exstir.	10	3	90	110	—	A. f. M. e. Spur Eiw. i. H.
1619 M	71	Ulcus cruris	Transplantat.	80	4	30	110	Geringes Erbrechen	—
1620 W	—	Unguis incarn.	Ausreis. b. Grossezhennägel	50	5	5	70	—	—
1621 W	53	Blasensteine	Cystotomie	80	8	20	120	Geringes Erbrechen	—
1622 W	11	Hernia ing.	Herniotomie	60	4	50	150	Erbrechen	—
1623 W	32	Parametrit. Abscess	Laparot. Drainage	60	4	40	100	do.	—
1624 W	61	Carc. uteri	Untersuchung	50	3	30	90	—	—
1625 W	28	Hern littr. eingekl. m. Absc.	Incis	60	4	10	90	—	—
1626 W	45	Nierentumor	Untersuchung	60	6	10	80	Erbrechen	—
1627 W	36	Haemorrhoiden	Inject. v. Carbolyglerin	70	7	10	100	do.	—
1628 W	21	Hernia ing	Herniotomie	60	8	20	150	—	—
1629 W	30	Phimose	Circumcision	60	6	20	100	—	—
1630 W	59	Dammriss dritten Grades	Anfrischung von Rectum, Scheide u. Naht	50	5	80	140	—	—
1631 W	20	Lymphom. tuberc. colli	Auskratzung	40	4	10	70	Geringes Erbrechen	—
1632 W	—	Perityphlitis m. Abscess	Operation	40	5	20	60	Leichtes Schlämbr. n. Puls etwas schwach.	—
1633 M	16	Hernia ing. sin. Ganglion d. flex. digiti corn. man. dext.	Rad -Op. Excis d. Ganglion Schliessg. Darmresect.	30	5	60	180	Leichtes Erbrechen n.	—
1634 W	28	Anus praeternat.	phal. metatars I	40	10	25	200	Erbr. w. u. n.	—
1635 M	64	Gonitis tub. sin. Arthrit. tub. phal. metatars I	Ablatio fem. sin. Exarticul	40	6	50	209	—	—
1636 M	17	Hydroc. fem. commun. dext. Excis	phal. metatars I	30	3	30	130	—	—
1637 W	7	Prostata hyper troph. Cystit	Castratio dupl.	40	10	15	60	—	—
1638 W	3 1/2	Perityphlitis m. allgem. sept.	Peritonitis	10	3	15	50	Erbrechen nach	—
1639 W	21	Ostit. luct. ulnae dextr.	Aufmeisslung	30	5	35	60	do.	—
1640 W	32	Necrosis maxill. sup. sin.	Neurotomie	30	5	20	50	do.	—
1641 W	35	Retroflexio uteri	Untersuchung	70	7	15	90	do.	—
1642 M	26	Hernia ing. sin.	Herniotomie	60	5	20	90	—	—
1643 M	6	Tubercul. genui	Reresection	10	30	35	50	—	—
1644 W	39	Actinomycose Thoracis	Incis. Auskratzung	40	10	15	140	W. Vitium cord. w. Aether u. nicht Chloroform verw.	—
1645 W	19	Lymphomata colli	Excis	60	6	30	120	1 Erbrechen nach	—
1646 W	35	Retroflexio uteri	Alexand ! Op.	90	10	40	180	—	—

N.	Geschlechts	Alter	Dignose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1647	W	58	Tuberculosis pedis	Resect ped.	60	4	60	180	—	—
1648	M	18	Hernia inguin	Herniotom.	70	10	30	100	—	—
1649	W	21	Ovarialcyste	Ovariectomie	50	7	55	120	—	—
1650	W	16	Cholestratom.	Starke'sche Op	60	7	50	120	—	—
1651	W	71	Carc. mammae dextr.	Excis. Mammae	—	—	—	—	—	—
1652	W	19	Otitis mast.	Ausräumung d. r. Axilla	40	10	45	80	—	—
1653	M	22	Hernia inguin dextr.	Trep. d. Proc. mast	50	5	40	130	—	—
1654	M	3	do	Herniotom.	80	7	40	180	—	—
1655	M	34	Tendovaginitis tubere. der	do.	30	5	25	50	—	—
1656	W	19	Entensorensehn r.	Excis	60	8	45	190	—	—
1657	M	22	Lymphoma colli	do.	70	5	15	100	—	—
1658	W	16	Cholesteatom	Entf. d. Gehörk. r. d. d. Gehörg.	80	15	75	220	—	—
1659	M	10	Phimose	Stärkesehe Op. m.g. Cholest.	70	15	90	210	—	—
1660	W	23	Parityphilitis	Lk. Transplant. r. Stark. Op.	20	5	15	30	—	—
1661	W	46	Hämorrhoiden	Spaltung	50	5	25	80	—	—
1662	M	8	Lymphomata colli	Eröffnung u. Drainage	40	7	22	100	—	—
1663	W	40	Pes valgus paralyt.	Ligatur und Entfernung	40	5	40	100	—	—
1664	M	8	Paranephrit. Abscess	Excis	30	3	8	30	—	—
1665	W	43	Tumor der rechten Parotis	Tenotomie d. Achil' essehne	60	5	30	Starkes Erbrechen nach	—	—
1666	M	18	Lymphom colli	Eröffnung	70	7	20	100	do.	—
1667	M	51 1/2	Ostitis ped.	Excis	75	7	15	100	do.	—
1668	W	64	Struma coll.	Ausratzung	50	10	40	120	—	—
1669	W	60	Myoma uteri	Pirogoff	40	7	45	100	—	—
1670	M	25	Varicocele	Strumect.	100	10	95	210	—	—
1671	W	24	Bursitis prepatellaris dext.	Myomot. Entf. d. Ovarien	50	5	55	210	—	—
1672	W	25	Retroflexio uteri	Excis d. Scrot-Haut, Ligat	50	5	20	90	—	—
1673	W	38	Carcinoma d. Coccyus	u. Excis a. d. Venen	50	5	20	90	—	—
1674	W	47	bd. Ovarien	Excis	50	5	75	200	—	—
				Alexand	60	10	30	120	—	—
				Probelaparotomie	60	7	80	200	—	—
				Ovariectomie	60	7	80	200	—	—
									Wurde v. 3 Jahr. v. Kocher	wegen Carcin. pylori op.

1675	W	21	Struma colloid	Strumectomie	60	10	10	100	1 m. Erbrechen n.	Im Anf. stik. Cyanose
1676	W	32	Retroflexio uteri	Alexand. Op.	50	7	15	90	Erbrechen	—
1677	M	24	Hydrocele vaginal.	Excis	60	7	30	120	Starkes Erbr. n.	Pat. ist Student
1678	W	47	Carcinoma ovarii m. Ascitis	Laparotomie	10	5	40	80	—	Sehr heruntergekommen
1679	W	27	Coxit tub. sinistr.	Resect. coxae	10	3	60	120	Erbrechen nach	—
1680	W	2	do. dextr.	do.	10	1	35	10	—	—
1681	M	24	Tuberc. Lymph d. Halses	Excis	100	10	80	200	Starkes Erbr. n.	Stark. Excitastad. Pat. hustete stik. w. d. N.
1682	W	27	Musarticularis genu. Arthr.	—	—	—	—	—	—	—
1683	W	19 $\frac{1}{2}$	prolif sin	do.	25	5	15	15	1 Erbrechen	—
1684	W	53 $\frac{1}{2}$	Perityphlitis	Resect. d. Proc. vermiform.	30	10	50	120	—	—
1685	W	39 $\frac{1}{2}$	Hernia ing dextr.	Rad.-Op.	60	7	25	80	—	—
1686	M	39	Perityphlit m. Abscess	Eröffnung u. Drainage	10	1	25	50	—	—
1687	M	25	Lymph. d. 2. Leiste	Excis	90	10	80	200	Erbrechen	Etwas Pot
1688	M	25	Hernia ing. sin. incarcerata	Rad.-Op.	90	10	45	160	—	Etw. Emphysem. Starks.
1689	W	61	Prunites vulvae et ani	Neurot. d. N. pudendus.	80	10	75	210	Etwas Erbr. n.	Husten nach Erwachen
1690	W	5	Tuberc. ossis Ilii sin.	Resect. eines Stk d. Criste	50	7	30	120	Etwas Pot.	—
1691	W	58	Ostit tuberc. ped. sin.	Trepan. d. Proc. mast.	25	3	30	30	Pat. erbr., nachd. sie kurz n. d. Op. v. ihrer Mut. Milch bek. hatte	—
1692	W	57	Lymphomata colli	Amput. eruris	40	4	30	100	—	Am Tag n. d. Op. e. Sp. Eiwh. im Urin, am folg. Tag weg
1693	W	53	Caries ster. clavie cost. I sin	Auskratung	40	5	25	60	—	2Tg. post. Op. et. Albuminur.
1694	W	70	Cyste Sarc. d. Submaxill. r.	Resect. sterni clavis et costae	10	4	50	120	—	1 " " " etw. Eiwh. im Urin. Etw. Arterioscler.
1695	W	20	Tendovaginit. tub. d. Sehneuscheide d. Ext. carp. uln. sin.	Excis	50	10	80	140	—	Hadte 1 Jahr vorh. 2 m. Pleuritis
1696	M	14	Hernia i. g. dext.	do.	60	10	25	100	Starkes Erbr. w. u. n.	—
1697	M	48	Carcin. recti.	Herniotomie	10	7	15	110	—	—
1698	M	5	Blödsinn. Epilepsie	Untersuchung	40	7	20	90	Starkes Erbr. n.	—
1699	W	22	Hernia inguin. sin.	Trep.	20	3	35	70	—	—
1700	W	25	Tub. Absc. d. l. Vorderarmes	Herniotomie	70	6	30	90	Etw. Schleimbr. n.	—
1701	M	60	Carc. ventriculi	Eröffnung u. Auskratung	60	7	20	80	1 m. Erbrechen nach	V. ca. $\frac{1}{2}$ J. Pleurit. Eiwh. Eiwh. i. Ur. a. u. 2. Tag
1702	W	1 $\frac{1}{2}$	Syndactylie	Probelaparotom.	70	10	50	170	—	—
1703	M	35	Bursit. praepatell. supp. sin	Einsetzen v. 2 Glasstäbch	15	1	1	15	—	—
1704	W	21	Osteomyel. chron. d. l. Fem.	Eröffnung	40	4	15	40	—	—
1705	M	22	Tendovaginitis tuberc. des Extrens der rechten Hand	Trep. d. Knoch	20	7	25	70	—	—
1706	W	19	Myom d. Corpus uteri	Extrens der rechten Hand Excis " per vaginam	10	10	10	90	Sehr stark. Erbr. nach	—
					60	10	55	120	" "	" "

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis				Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
					Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose			
1707	W	25	Graviditas extraut.	Laparotomie	40	7	65	150	—	—	Am 1. u. 2. T. n. d. Op. eine Spur Eiw. i. Urin. N. musste g.l. n. Beg. d. Op. ausgesetzt w. wegen stück. Dypn. Sie wrd. erst wied. beg., als Feuchtknot. entfi. w.
1708	W	18	Struma colloid. z. T. retro-tracheal	Strumectomie	50	6	20	90	1 Erbrechen nach	—	—
1709	M	21	Struma coll. profunda	do.	80	10	30	120	do.	—	—
1710	W	18 $\frac{1}{2}$	Osteomyel. fem. sin.	Aufzussl. d. Mark. Drain.	40	7	30	110	—	—	—
1711	W	27	Multiple Keuchsticheln	Unternehmung	40	5	35	80	—	—	—
1712	M	20	Osteomyel. chron. fem. dext.	Necrotomie	50	7	50	110	—	—	—
1713	M	11 $\frac{1}{2}$	Syndactylie	Trennung d. Finger	10	1	15	15	—	—	—
1714	M	29	Ischias sin.	Unblut. Dehn. d. Ischiadicus	70	7	2	70	—	—	—
1715	W	4	Otitis mastoid.	Trepan d. Proc. mast.	20	2	15	29	Erbr. n.	—	—
1716	W	25	Struma colloid	Strumect.	10	50	120	10	Stark. Erbr. n.	—	Stk. Aufregungsstadi.
1717	W	24	Hernia ing.	Herniotomie	7	50	30	100	—	—	—
1718	M	58	Caries costae	Resect. costae	60	10	10	60	Stark. Erbrechen	—	—
1719	M	17	Hernia ing. dextr.	Herniotom.	50	7	35	100	—	—	—
1720	W	23	Laes. vaginae et recti	Colpo-perineoplastik poster.	60	10	45	140	—	—	—
1721	W	25	Struma colloid.	Strumect.	90	10	35	130	Stk. Bronch.	Pat. s. unr. Stk. Exaltationsstadi.	—
1722	W	19	Lymph. d. l. Fossa supra-cleriche Struma coll.	Lueis. Strumect.	40	6	55	120	Stk. Erbr. n.	—	Pat. hat Mischblutstauenz. Puls n. d. N. voll u. regelm.
1723	W	17	Lymphonata colli	Lueis.	40	7	60	130	—	—	St. Trachealrussela w. d. N.
1724	M	4 $\frac{1}{2}$	Phim.	Spaltung	5	2	10	5	—	—	—
1725	W	27	Rectovaginalfistel Tumor Abdominis	Aufzussl. u. Naht. Laparot.	40	5	75	160	—	—	Schon v. d. N. s. schw. Stk. Ausomie. Pat. war gegen Ende d. N. einem Collaps nahe, sod. sie i. m. e. halbe Spritze Tinct. Mosch. bekam. Der Coll. ruherte nicht. v. d. N. sond. v. d. überaus schl. Allgemeinzust. d. Frau
4726	W	34	Ovarialtumor	Ovariectomie	80	10	75	160	Stk. Erbrechen nach	—	—
1727	W	58	Arthrit. tub. genu dextr.	Amput. fem.	40	5	60	110	—	—	—
1728	M	38	Multiple Verletzung der Finger der r. Hand	Amput. d. IV. F. Fixation d. V. i. letzt. Interphalangealgel.	70	7	35	140	Starkes Erbrechen	—	—
1729	W	45	Arthrit. tuberc. d. r. Talocruralgelenks	Resect. ped.	50	7	45	110	—	—	—
1730	M	5	Nec. d. II. Phal. d. l. kl. Fing.	Necrotomie	25	2	15	30	—	—	—

1731	W	12	Nicht geheilter Sturke	Atroplastik	70	10	15	135	Starkes Erbr. n.	Pat. sehr aufger. u. erbruehl sch. gz. i. Beginn d. N., als man die Maske näherte
1732	W	66	Carcinoma ventriculi	Gastroenterostomie	60	10	105	210	—	—
1733	W	46	Polyp d. Cervix uteri	Abtreuung	60	7	15	60	Erbrechen	—
1734	W	60	Prolaps d. h. Vaginalwand	Colporrhaphia posterior	80	10	60	160	—	—
1735	W	48	Carcinoma mammae	Amput. mammae dext. Aus- räumung d. Axilla	60	5	50	120	—	—
1736	W	39	Ostitis Tarsi dext.	Resectio d. Naviculare caput	60	7	35	100	Starkes Erbrechen	—
1737	M	6	Perityphlitis à froid	Tali. eunefomie	25	3	70	100	—	—
1738	W	47	Hernia abdominalis	Resect d. Proc. vermiformis	50	7	60	230	Erbrechen	—
1739	W	28	Tumor abdominis	Rad.-Op.	40	5	10	60	do.	—
1740	M	65	Otitis mastoid.	Untersuchung	60	10	15	120	—	—
1741	M	44 ¹²	do.	Trep. d. Proc. mast.	20	2	17	40	—	—
1742	W	28	Tumor ovarii	do	50	5	65	140	Erbrechen	—
1743	M	33	Verletzung d. Arcus volar. sublim. d. l. Hand	Laparot. Punktion. Drain.	100	7	20	140	—	—
1744	W	19	Ostit tuberc. tarsi-dextr.	Untersuchung Incis. zur Feststellg. eines Recid. Gypsverb.	60	5	25	110	Stk. Erbrechen nach	Ueber d. r. Spitze klein- blasiges Rasseln
1745	W	24	Tuberc. d. inn. Genitalien	Entfern. d. r. Ovariums	50	7	60	160	—	—
1746	M	5	Cyste unter d. Galea	Excis	50	5	45	100	—	—
1747	W	48	Carcinoma mammae	Amput. mammae	60	7	40	120	—	—
1748	M	—	Ectopia vesicae	Excis. d. Blase, Verlagerung der Ureteren	30	2	110	140	—	—
1749	W	16	Unguis incarn	Ausreissung des Nagels	60	5	5	60	—	—
1750	W	29	Tumor ovarii	Ovariectomie	50	5	45	130	Erbrechen	—
1751	M	1 ¹²	Pes varus congen.	Kellxeis	20	2	29	40	—	—
1752	M	2	Abscess i. d. Bauchwand	Eröffnung	20	2	15	20	—	—
1753	W	39	Ostitis d. Sacr. u. Ileums r.	Resectio eines Teiles des Sacrum u. Ileum	60	7	85	160	Erbrechen	—
1754	W	54	Sarcom d. Bauchwand	Excis	50	6	150	350	—	—
1755	W	27	Rectovaginalfistel	Anfrischung u. Naht	45	5	30	90	—	—
1756	W	26	Struma profunda	Strumectomie	80	7	15	150	1 Erbrechen	—
1757	M	50	Fractura cruris	Reposit. Gypsverband.	80	7	25	150	—	—
1758	M	1 ¹²	Pes varus congenit	Gypsverband u. Kellxeis	20	1	7	20	—	—
1759	M	21	Wunde a. Daumen d. l. H.	Naht d. Sehne des Extens pollic. lang	80	7	20	80	—	—
1760	W	50	Ovarialtumor	Ovariectomie	70	7	70	170	—	—
1761	M	3	Tubercul. d. l. Kniegelenks	Arthrotomie	30	2	70	80	Erbrechen	—
1762	W	—	Perityphlitis à froid	Resect. d. Proc. vermiform	80	7	70	150	Stk Erbrechen	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verwundt bis Eintritt d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1763	M	3 1/2	Lymphom. colli	Excis	20	2	30	60	Starkes Erbrechen	—
1764	W	35	Abscess im Abdomen	Incis Drainage	60	5	5	60	Erbrechen	—
1765	W	35	Lymphome in d. Axilla	Eröffnung, Drainage	80	5	25	140	1 m. do	—
1766	M	16	Varicocele l. Bruchpforte r	Schluss d. Pforte, Excis d. Varicocele	120	10	45	180	1 m. do. bei Beg. d. N.	—
1767	W	61	Carcinoma mammae dextr.	Cauterisat. Excis	60	5	75	230	Erbrechen	Potator
1768	W	20	Mus articularis genu	Excis	60	5	25	90	—	—
1769	M	24	Ostitis ossis Ilei	Resection d. Crist. u. 1 Theils d. Beckenschäufel.	90	7	35	160	—	—
1770	W	23	Tendovaginit. fung d. Musk. tibialis post.	Excis	60	5	45	160	1 mal Erbrechen	—
1771	W	46	Myome d. Uterus	Hysterectomie	60	5	110	250	Stk. Erbrechen	—
1772	W	30	Prolaps der Vaginalwand.	Descensus uteri	80	5	90	200	—	—
1773	W	27	Tubere. Lymph. d. r. Axillae	Excis	80	5	75	160	Erbrechen	—
1774	M	—	Traumat. Strictur	Uretrotomia externa	60	6	45	140	—	—
1775	W	42	Prolaps d. Uterus	Colporrhaphia	50	5	80	240	Erbrechen w. u. n.	—
1776	M	25	Nadel in der Hand	Extract.	100	10	55	200	—	—
1777	M	32	Veraltete Radius fractur	Extract. eines Splinters	120	10	35	210	Erbrechen	—
1778	M	6	Fract. d. 3 Grundphalang. lk.	Repos. Gypsverband	30	3	12	50	do.	St. Aufregst. m. Cyan.
1779	W	—	Carcinoma uteri	Totalextirpation u. Krasken	60	4	130	200	do.	—
1780	W	—	do.	Auskratzung	60	7	20	80	—	—
1781	M	58	Arthritis. prolifer.	Arthrotomie	100	8	15	125	—	—
1782	W	—	Bauchhernie	Excis.	60	7	75	180	—	—
1783	M	16	Osteomyel. chron. fem.	Knochenreparation	60	5	35	120	—	—
1784	M	21	Perityphlitis m. Abscess	Eröffnung u. Drainage	50	15	60	150	—	Am 1. Tag n. Op. o. Sp. v. Eiw. im Urin
1785	W	28	Fibrom. d. r. Mannbr.	Excis. d. Tumor	40	10	30	100	Erbrechen	W. d. Narkose l. Cyanose
1786	M	48	Intramusculaires Lypom in den Bauchmuskeln	do.	20	15	50	50	Zunahme der Bronchitis	Chr. Bronch. m. Emphysem
1787	—	20	Kryptorchismus m. Hernie Eins.	Castr. u. R.-Op. Ilru d.	80	15	45	160	Erbrechen	Chlorof.-Aether Verb. l. 2
1788	W	19	Lymphomata	Excis	50	15	40	100	do.	—
1789	M	29	Osteomyel. chr. tib. et. fibul.	Knochenrepar. u. Auskratg.	40	7	40	120	—	A 1. u. 2. Tg. n. d. Op.
1790	—	26	Ostitis tib.	Resection	80	7	20	120	—	Sp. v. Eiw. in Urin
1791	—	31	Ostit. mast.	Trepan. d. Proc. mast.	60	7	30	120	—	—

1792	W	60	Retrofl. uteri. Varic. prolaps. Alexand. Unterbind. d. b.d. venna! saph. maj. Kolpoperineoplast.	10	7	110	210	—	Am 1. u. 2. Tg. u. d. Op. Spur. v. Eiw. im Urin
1793	—	18	Ohrpolyp. u. Sarc. i. pr. mast. Trepanat. u. Excis. d. Polyp.	60	7	30	100	—	—
1794	W	29	Tub d. Lendenwirbelsäule Auskratzung	70	10	30	100	—	—
1795	W	4	Pes varus paralyt. Tenotomie d Achillessehne u. Gypsvorband	10	2	7	20	1 mal Erbrechen	—
1796	M	21	Ostit. tub. tibiae. Abmcißl. u. Auskratzung	57	7	22	90	—	Am Tage nach der Op. eine Spur Eiw. im Ur.
1797	W	27	Struma Strumeotomie	60	7	50	100	—	—
1798	W	62	Carcinoma mammae Amputat. mammae	40	7	50	100	—	—
1799	M	46	Neurit tib. postici. Thrombo Nervendehng. u. Unterbindg. d. vena saph. maj.	70	10	35	100	—	—
1800	W	50	Gonitis tubercul. Resectio genu	80	5	80	200	—	—
1801	W	41	Tuberc. d Fussgelenkes Amput. ped.	90	5	45	100	—	—
1802	W	44	Carcinoma mammae Amput. mammae	60	7	70	180	—	—
1803	M	16	Geschwollene Halsdrüse Excis	60	7	15	100	—	—
1804	W	18	Perityphlitischer Abscess Eröffnung	60	5	15	80	—	—
1805	—	23	Eiterung im Proc. mast. Trepan. d. Proc. mast.	100	10	30	160	—	—
1806	—	15 1/2	Pedes vari congenit. Kellexcis u. Tenotomie der Achillessehne.	10	2	45	20	Leichte Bronchitis	Leichte Bronchitis
1807	M	25	Entzündung d. Proc. mast. m. Otit. med. Trep d. Proc. mast	80	7	50	200	—	—
1808	M	14	Kugel in vola manus Extract. d. Kugel	20	5	30	80	Erbrechen w.	—
1809	—	20	Hernia ing. Rad.-Op.	80	5	35	160	Erbrechen nach	—
1810	W	15	do. do.	40	5	25	60	—	—
1811	W	55	Einschnell. d. Finger (Daum.) do. Excis. d. Sesambeins (Daum.)	40	3	20	60	—	—
1812	W	27	Retroflex. uteri. Unq. incarn. Alexand. Op. Excis d Nag. u. Warze	40	5	100	160	Starkes Erbrechen nach	—
1813	—	22	Abscess an Proc. mast. Incis u. Tampon	40	5	15	100	—	—
1814	W	32	Retroflexio uteri Alexander-Op.	40	5	45	100	—	—
1815	M	14	Otit. med. mit Eitrg. i. Pr. m. Trepan.	20	8	40	81	—	Bronchitis
1816	M	26	Hernia inguin (Reeid.) Rad.-Op.	80	10	60	240	—	Nark. s. schwierig. In tief. N. drohte Pat. zu collab. beim Nachl. zu erwachen.
1817	M	47	Subperiost. Absc. a. Proc. m. Eröffn. d. Absc.	40	5	15	80	—	Ist hochgrad anaemisch
1818	W	32	Carcinoma uteri Kraske'sche Op	40	7	100	160	—	—
1819	W	12	Naevus Excis	20	3	15	40	Erbrechen nach	—
1820	M	11	Deh. Narbe gekrümmte Fing do. d. Narbe	20	5	20	60	—	—
1821	W	18	Halsdrüsen Excis	40	7	30	100	—	—
1822	W	39	Eiterung i. Antr. Highmori Trepan u. Auskratzung	80	15	45	200	Erbrechen w. und nach	—
1823	W	28	Eiterige Mastitis Eröffnung d Abscess	30	5	10	40	—	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1824	W	46	Gonitis	Resectio coxae	20	12	60	60	Erbrechen nach	—
1825	W	31	Drüsen am Hals	Excis	60	5	30	120	—	—
1826	M	1/2	Hernia inguin	Rad.-Op	10	2	60	30	—	—
1827	W	23	Geschwollene Leistenröhren	Excis	60	10	40	100	Erbr. n.	A. 1. u. 2. Tg. n. Op. e. Spur Eiw. im Urin
1828	W	26	Bauchhernie	Rad.-Op.	80	10	90	160	—	Am 1. Tag nach Op. do
1829	M	22	Ovaris phant.	Excis	40	5	15	100	—	—
1830	W	18	Gonitis tuberc.	Resect. genu	40	7	19	140	Nach d. Op. collab. P.	—
1831	W	54	Bauchdeckenabscess	Eröffnung	20	5	10	40	—	—
1832	W	11	Eiterung in proc. mast.	Trepanat.	20	5	100	140	—	—
1833	M	12	Osteomyel. fib.	do.	40	7	15	80	Erbrechen n.	—
1834	M	29	Narb. Verschluss d. r. Nasen- loches, infol. Fract. d. os nasal.	Eröffnung	170	60	100	220	Erbr. w. u. n.	P. w. schw. i. N. z. br. Stk. Excitationsstad.
1835	W	17	Varic. d. Vena saph. maj. sin.	Unterbindung	60	7	15	80	—	—
1836	W	11	Mittelohrerweiterung m. Eitrig im proc mast.	Trepan. d. Proc. mast	40	5	95	120	—	—
1837	W	39	Struma colloid.	Strumectomie	40	5	40	100	—	—
1838	W	5	Ostitis tuberc. tibae	Resection	20	2	20	40	—	A. 1. u. 2. Tg. n. Op. e. Spur Eiw. im Urin
1839	W	11	Stirnbasisabscess	Trepan.	20	5	55	80	—	—
1840	W	5/12	Angioma colli	Excis	10	2	20	30	—	—
1841	W	39	Ostit. tube, metatars. I fung.	—	—	—	—	—	—	—
1842	M	33	Narbe a. r. Ellbogen	Resection. Excis d. Narbe	60	10	120	230	—	—
1843	W	35	Cholesteatom mit chronisch. Entzündg. d. Proc mast.	Trepan.	60	10	120	230	—	—
1844	W	32	Fibroma uteri	Laparotomie	40	10	85	180	—	—
1845	W	14	Varices venarum saph. Perityphlitischer Abscess	Beidseitige Unterbindung Incis	30	7	25	60	Erbrechen	—
1846	W	54	Cholelithiasis	Cystosth. Extr. v. 4 Gallenst.	40	5	70	150	Starke Cyan. w u n.	P. coll. nachm. u. st ab Sec. org. ausgep. Forh
1847	M	20	Struma colloid.	Strumectomie	40	10	20	80	—	—
1848	M	32	Recidiv. Perityphlitis	Resect. d. Process. vernif.	80	7	75	220	Erbrechen	—
1849	—	30	Narbe am l. Fuss	Excis	60	7	15	120	—	—
1850	W	21	Tubercul. Axillardrüsen	do.	50	5	70	160	—	—
1851	—	9	Phimose	Discision	40	7	15	60	—	—

1852	—	24	Tubercul. testis	Einseitige Castration	60	7	35	140	Erbrechen	—
1853	M	6	Haut	Laparotomie	10	5	90	60	—	—
1854	M	11	Hämorrhoiden	Ligatur und Excis	80	10	25	110	—	Am Tage n. d. Op. eine Spur Eiw. i. Urin
1855	W	32	Hernia cruralis	Herniotomie	40	7	45	100	—	—
1856	M	17	Fissura ani	Dilatation	50	7	15	70	—	—
1857	W	27	Perityphl. à froid	Resect. d. Proc. vermif.	40	7	60	140	—	—
1858	W	9	Hernia umbilical.	Herniotomie	20	3	30	60	—	—
1859	M	17	Fractura tibiae complicat.	Reposit. und Gypsverband	40	7	20	120	—	—
1860	W	62	Carcinoma uretri	Untersuchung	30	5	15	60	Erbrechen	—
1861	M	36	Perityphlitis à froid	Resect. d. Proc. vermiform	60	7	80	220	—	—
1862	M	41	Hämorrhoiden	Ligatur	60	10	20	100	—	—
1863	M	12	Recidiv. Cholesteatom.	Trepan. d. Proc. mast.	30	7	70	100	Erb.	—
1864	W	22	Lymphad. tub. colli	Incis und Auskratzung	40	5	15	80	—	—
1865	W	52	Carcinoma ventriculi	Laparotomie	40	7	40	100	—	—
1866	W	21	Struma colloid.	Strumectomie	60	10	40	180	Erb. w. u. n.	—
1867	W	42	Tendovaginitis tuberc.	Excis	50	7	135	270	—	—
1868	M	34	Perityphlitis	Eröffn. e. perityphl. Abscess	60	16	25	100	—	—
1869	—	64	Blasensteine	Sectio alta	60	5	55	140	—	A. 1. u. 2. n. Op. Eiw. im Urin
1870	—	69	Handtuberc. Osti tub. ulnae	Amput. antibrachii. Incis u.	60	4	60	150	—	A 1 T. n. Op. Eiw. i. Ur
1871	W	29	Retroflexio uteri	Auskratzung am Ellbogen	60	7	55	160	—	—
1872	W	21	Lebertumor	Alexand.-Op.	60	5	40	140	—	—
1873	W	26	Retroflexio uteri	Laparotomie	60	5	45	180	—	—
1874	M	51	Osteomyelit. chron. tibiae	Alexand.-Op	60	5	45	100	Erbrechen	—
1875	W	35	Retroflexio uteri	Knochenrep. u. Auskratzt.,	40	5	50	120	—	—
1876	W	40	Struma colloid.	Alexand.-Op.	80	7	80	180	Erb. w. u. n.	—
1877	W	62	Mastoiditis acuta	Strumectomie	60	5	100	30	nach Schleimbrech. während Patient w. schwer i. N. reichliches Erbrechen zu br.; stk Schlinschr hochgradige Blässe	—
1878	M	31	Vorwieg. Gastroenteroantronomie, Rückstauung der Galle i. d. Magen; Bauchhern.	Trepan. d. Proc. mast. Darm- u. Pylosusresection, Schluss der Bauchpforte	120	15	130	360	nachher. D. Eiwgeh. d. v. d. Op. i Urin war, n. n. Op. n. zu	—
1879	—	25	Phimose	Discision	60	5	15	100	—	—
1880	—	36	Fistula colli	Excis	100	7	40	200	—	—
1881	M	45	Hernia inguin dextr.	Herniotomie	80	7	30	140	—	—
1882	W	31	Pes varus	Kellexcis	60	4	45	140	Schleimbrechen.	—
1883	W	49	Carcinoma ventric. et hepatic.	Gastroenterostomie	40	4	70	180	—	A 1. Tg. n. Op. Zun. d v. d. Op. i. Ur. vorh. Eiw.
1884	W	64	Sarcom. d. Beckens	Untersuchung	30	4	15	60	—	—
1885	W	24	Atherome d. Kopfhaut	Excis	60	5	25	200	Erbrechen w. und nach	—
1886	W	26	Phlegmone d. l. Unterschl.	Incis	40	5	10	130	—	—
1887	W	21	Urachuscyste	Eröffnung und Auskratzung.	60	1	60	85	Erb. w. u. n.	—

Nr.	Geschlechte	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1888	W	37	Ovarialester	Excis per Laparotomie	60	8	90	150	—	—
1889	M	22	Hernia ing. ext.	Herniotomie	40	6	25	85	—	—
1890	W	20	—	Alexand.-Op.	60	12	120	230	—	—
1891	W	43	Fibroma uteri	Exstirpat. uteri	40	8	120	155	Brechreiz nach	—
1892	M	24	Doppelte Hernia ing.	Rad.-Op.	1	6	55	130	Erbrechen w. der Op.	—
1893	M	69	Prostata hypertrophica	Resect. der Samenstränge	60	10	35	100	—	—
1894	W	23	Tuberculose des Fusses	do. pedis.	30	5	65	130	Erbrechen nach	—
1895	M	13	Rissw u. Quetsch. a. Zeigef. Sehnenriss	Sehnenriss	25	5	25	50	Erbrechen w.	—
1896	M	5	Schussverletz. a. r. Obersch. Inc. u. Entf. e. kl. Metastases.	Inc. u. Entf. e. kl. Metastases.	20	8	20	40	—	—
1897	W	47	Carcinoma recid. nach Total-exstirpat. uteri	Probenreiss	40	8	45	100	Erbrechen nach	—
1898	W	22	Perityphilitis	Eröffnung	20	5	30	8	—	Pat. h. 40° fieberw. P. k. m. zu zähl. Allgem. Zust. M. Chlorof. s. P. u. gut zu narcosis gewesen Dilatatio ventric. sinistra
1899	W	71	Tuberculose d. Haced. Tuberc. meta carp. II	Entfer. Metacarpknochen (II)	20	5	25	10	—	—
1900	W	58	Gonitis tuberc. Arthritis tub. Resectio genu	Rad.-Op.	30	5	85	160	—	—
1901	M	17	Hernia ing. dextr.	Rad.-Op.	50	10	35	120	—	—
1902	W	17	Perityphilitis u. Erkrankung des Caecums	Resect. proc. vermiform. Incis	40	7	50	100	Wenig Erbrechen n.	—
1903	W	19	Osteomyel. d. r. Oberarmes	Eröffn. d. Humerus u. Entleerung d. Eiterherdes	10	12	20	50	Erbrechen w. u. n.	—
1904	W	20	Hernia crural. incarc. Tuberc. Halsdrüsen	Rad.-Op.	40	7	30	80	Erbrechen nach	—
1905	W	67	do.	Resectio d. Drüse	35	7	35	70	—	—
1906	W	43	do.	Entf. d. Metacarp. II. Auskr.	70	12	35	100	Brechreiz am Ende d. N	—
1907	M	38	Osteomyel. metac. II d. tranc.	Entf. d. Metacarp. II. Auskr.	100	20	35	120	—	—
1908	W	17	Luxat. coxae dextr.	Unblutige Reposit. in dem Apparat v. Lorenz	50	10	25	100	Erbr. nachher	—
1909	W	16	Hernia inguin. sin.	Rad.-Op.	40	6	60	110	do.	—
1910	W	32	Rückstauung d. Galle i. d. Mg.	Darmresectio	50	10	35	100	do.	—
1911	M	34	Otitis med.	Eröffnung d. Proc. mast.	60	8	110	250	do.	—
1912	W	7	Furunculose	do. u. Auskratzung	30	6	70	70	do.	—
1913	—	36	Sklerose d. Ohrknöchelchen	Entf. v. Hammer u. Amboss.	40	7	45	150	do.	—
1914	W	20	Carcinoma mammae s.	Amput. m. n. Auskr. d. Achselh.	50	10	90	150	do.	—
1915	W	37	Ischias duplex	Nervendehnung (blutige)	40	8	40	90	do.	—
1916	W	12	Ischias duplex	Nervendehnung (blutige)	30	5	50	60	do.	—

1917	M	15	M. d. K. verw. Beuges, d. l. D. Lösung der Sehne	50	10	35	100	Schleimbrechen nach	—
1918	M	30	Typhilitis	50	18	50	120	Erbrechen w. und nach	—
1919	W	24	Adenoma mammae	60	10	45	120	Erbrechen w. und nach	—
1920	W	50	Cystoma mammae	50	10	25	80	Ganz leichtes Erbrechen	—
1921	W	24	Spitzencondylome	50	12	30	100	Erbrechen nach Operat.	—
1922	W	34	Adenoma mammae beidseitig, kl. Bauchpforte	40	8	45	120	do.	—
1923	W	33	Struma cystica	30	6	30	100	—	—
1924	M	2	Dermoidcyste ob d. l. Auge	35	8	30	80	—	—
1925	W	32	Retroflex. uteri	33	6	50	100	—	—
1926	W	50	Reid. carcinoma mammae	40	8	20	60	—	—
1927	M	18	Variococele sin.	40	10	30	90	Brechen nach	—
1928	M	34	Sehnentrup a. 3. u. 4. Fing. der v. Hand	30	10	30	70	—	—
1929	M	10	Peritonit. tub.	20	5	40	60	do.	—
1930	W	16	Coxitis tub.	30	10	40	75	do.	—
1931	M	2	Olenitis tub.	20	6	35	40	—	—
1932	W	27	Endometritis	80	4	10	80	—	—
1933	M	72	Prostata hypertrophie	30	6	25	50	—	N. w. mit Appar. Arnd
1934	M	52	Carcinoma labii	80	15	90	300	—	unthaltan, wo 50 Proz Aether verloren gehen
1935	W	26	Zurückgebl. Fad. b. Alexand. Herausnahme desselben	40	8	15	60	—	—
1936	W	7	Percestit. d. l. proc. mast. Trep.	30	6	30	50	Erbrechen nach	—
1937	W	23	Struma prof. Nephrit. grav. (Gravid. u. M.)	40	10	50	80	Etwas Schleimbrechen	—
1938	—	34	Verletz. d. 2 u. 3. Zehe d. l. Amput. d. einen an d. Grundphal. Exarticulat. d. 2. Phal. d. andern	30	5	20	60	—	—
1939	W	53	Ovarialcyste	50	10	60	120	—	—
1940	W	32	Wandermiere	60	10	45	120	—	—
1941	W	27	do. Recto-vaginalfistel	40	7	80	130	Erbrechen	—
1942	W	20	Cholesteatom. d. Mittelohrs	50	10	70	140	do.	—
1943	W	41	Haemorrhoiden	60	10	45	140	do.	—
1944	W	30	Struma hyperpl. et colloid.	30	6	60	100	—	—
1945	W	20	Varicen Pruritus	40	10	65	120	do.	—
1946	W	54	Ovarialcyste. Fibroma uteri	40	8	65	110	—	—

Nr.	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
1947 W	38	Skirbus mammae dextr.	Amput. mammae u. Aus- räumung der Achselhöhle	50	10	60	100	—	—
1948 M	21	Fistelgang od. e. erweichte Lymphdr. a. Hals ausgeh	Auskratzung	40	8	25	80	Schleimbrechen nach	—
1949 W	—	Ganglion d. Extensorensehn. d. l. Hand	Excis	40	8	20	60	Erbrechen w.	Vor 3 Jahren chlorof. Dum. 3 T. u. 3 N. Erbr.
1950 M	25	Hernia inguin. sin. (Recid.)	Rad.-Op.	40	10	40	100	do.	—
1951 W	63	Hernia crur. incarc.	do.	50	80	65	170	Erbrechen nach	—
1952 W	35	Carcinoma uteri	Uterusexstirp. per Laparot. Aufklappen d. os pubis	60	7	195	420	Exitus nach Op. Die letzte Aetherg. i. 25 M. vor Ein- tritt der Ex. statt. daher nicht als Aether-Todesfall aufzufassen, Exit. trat inf. gr. Blutverlustes, grosser Schwäche d. Pat. u. lang. Offenl. d. Bauches ein	—
1953 M	3	Lymphangiom	Excis	20	5	40	60	—	—
1954 W	28	Schmerzhaftes Carnuculae	Excis u. Spaltg. d. frenulum	30	5	20	80	Erbr. n. Op. b. z. Abd. d.	—
1955 M	24	Fract Olecran	Knochennaht	120	7	38	200	—	—
1956 M	21	Ostitis purul d. I. Phalanx d. III. Fingers	Exarticul. d. Grundphal. u. Resect. d. Metacarp. III	40	8	20	80	—	—
1957 M	4	Cholesteatom des Felsen- beins und Sinustrombose	Excis u. Auskratz. mittelst Osteot. d. Warzenfortsatzes	20	6	58	80	Mehrm. Erbrechen n.	—
1958 M	41	Cholesteat. d. Felsenbeins	Osteotom. d. Proc. mast. u. Auskratzung desselben	30	7	85	100	—	—
1959 M	27	Varicocele sin.	Rad.-Op.	60	12	55	100	Mehrere Erbrechen n.	—
1960 M	4	Sinustrombose	Nachoperat. Resect. d. pr. m.	10	5	20	20	—	—
1961 M	35	Epididymitis tuberc. dextr.	Castratio	60	15	30	100	—	—
1962 —	21	Ostitis chronic. der linken Fibula	Resect. fibulae u. Auskratz.	40	10	70	160	Mehrm. Erbr. n.	—
1963 W	34	Hernia crur. dextr.	Rad.-Op.	60	12	30	80	do.	—
1964 M	41	Bursit. prepatell. sin. pural.	Excis d. Bursa	40	6	35	120	—	—
1965 M	21	Gangraena d. 3. Phalanx der 2. u. 3. Zehe	Exarticul. Ablatio penis	80	8	18	120	Wenig Schleimbr. nach.	—
1966 M	28	Carcinoma penis	—	60	8	50	140	—	—
1967 M	9	Tuberc. Lymph. i. Bereiche d. r. Kieferwinkels	Excis	60	8	35	140	Wenig Erbrechen n.	—

1968	M	18	Retentio testis inguin dextr.	Repos. u. Fixat. a. d. Scrot.	100	10	55	210	—	—	—
1969	M	54	Tubercul d. Haut auf der	Excis	60	5	20	100	Erbr. n.	—	—
1970	W	46	Ulnarscite des Handgelenks	Supracervicale Amput.	60	10	95	260	—	—	—
1971	W	50	Multiple Fibroid d. Uterus	Exstirpat.	100	12	70	250	2 mal Erbrechen nach	—	—
1972	W	18	Coxit, tubc. m. Abscess i d. r.	Incis u. Auskratzung	40	6	20	80	—	—	—
1973	M	29	Gesäss- u. Leistengegend	Rad.-Op. r. I Schl. d. Pforte	40	6	40	140	—	—	—
1974	W	21	Hernia ing. offene Bauchpf	Excision	40	8	25	100	Ziendl. st. Schleimbr.	—	—
1975	W	29	Lymphoma colli	—	—	—	—	—	—	—	—
1976	M	22	Paraneurisches Exsud. nach Wochenbett	Incis d. Abse. v. Bruch aus	40	6	20	80	—	—	—
1977	M	47	Pertiphyllitis m. Hernie	Exstirp. d. Proc. vermif. u.	80	15	105	270	—	—	—
1978	M	15	Periorchit. hämorrh. dextr.	Vernahung d. Bauchpf.	80	15	25	180	—	—	—
1979	M	21	Lymphadenitis colli purul	Excis d. Tunica vag. propr.	80	15	25	180	—	—	—
1980	W	13	Fadeneintrng. b. op. Hernie	Incis u. Auskratzung	40	8	40	140	—	—	—
1981	W	26	Ped. s. equinovares	Incis u. Auslößig	50	10	20	100	Wenig Erbr. w. u. n.	0.01 Mo. injec. In Zukunft wird jeder Person, d. über 18 Jahre alt ist, vor d. Op. eine Morph.-Inject. gem.	—
1982	M	36	Fibromyoma uteri	Keilexesis	40	8	70	130	Erbr. n.	—	0.01 Mo.
1983	W	32	Cholelithiasis	Supracervicale Amput.	60	10	120	240	—	—	0.01 Mo.
1984	W	56	Dermoideyste d. Ovariums	Probelparotomie	70	10	80	220	—	—	0.01 Mo.
1985	W	17	Schnurleber	Ovariectomie	60	10	70	160	Erbr. n.	—	0.01 Mo.
1986	M	14	Schneidurchschneidung der Musc. indic.	Explorativincis	40	8	35	160	—	—	—
1987	W	13	Schussverletzung des linken Oberschenkel (Pistole)	Sehnennaht	60	10	25	120	Erbrechen nach	—	—
1988	W	53	Carcinoma uteri	Excis d. Geschosses (Stein)	60	8	35	160	—	—	—
1989	W	25	Struma per magna colloid	Gypsverb. n. Klumpffussop.	40	5	20	100	—	—	0.01 Mo.
1990	W	28	Struma colloid.	Totalcxstirpat.	40	5	135	320	Erbr. n. d. Op., d. 2 Tg d	—	0.01 Mo.
1991	W	62	Hern. crur. incarc. epiploic.	Exstirpation	60	10	70	220	Erbr. n.	—	0.01 Mo.
1992	W	42	Ostitis calcanei	do.	60	8	30	120	—	—	0.01 Mo.
1993	W	22	Tuberc. d. Fusswurzelh.	Rap -Op.	60	7	30	100	Erbr. n.	—	0.01 Mo.
1994	M	57	Hernia inguin dupl.	Resectio tuber. calcane.	60	8	45	140	Mehrm. Erbrechen n.	—	0.01 Mo.
1995	M	56	Struma colloid.	Resect ped.	30	20	70	130	—	—	0.01 Mo.
1996	M	30	Fract. hallux mal. sanat.	Rad -Op.	60	8	55	190	—	—	0.01 Mo.
1997	W	44	Fibromyomat. Uterus polyp.	Strumectomie	30	10	22	60	—	—	0.01 Mo.
1998	W	36	Gangraena d. 3 Phl d Zeigf.	Eröffn u. Repos. d. Fragm.	30	12	40	70	Erbrechen nach	—	do.
1999	W	71	Carcinoma mammae	Exstirpat	40	6	35	100	—	—	—
			Ablatio mammae und Aus- räumung der Achselhöhle	Exarticul. d. 3. Phal.	50	6	15	80	Stk. Erbrechen nach	—	—
					60	8	40	200	—	—	0.01 Mo.

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Verbrauch Gesamt	Nachwirkungen	Bemerkungen
2000	W	33	Hern. crur. incarc. epiploic.	Rad.-Op.	60	8	30	120	—	0,01 Mo.
2001	W	28	Hernia ing. int. sin.	do.	60	7	40	170	—	do.
2002	M	22 1/2	Ostitis malleol. intern	Resectio	70	8	50	200	Erb., d. d. g. Tag andau.	do.
2003	W	17	Rect. appendicitis	Exstirpat. d. Proc.	80	10	70	230	Erb. n.	do.
2004	M	8	Fistel (dch. d. Nab.)	Perityph Eröffnung, Drainage	70	10	55	180	—	—
2005	W	46	Hernia umbilicalis	Rad.-Op.	60	7	45	110	Erb. n.	0,01 Mo.
2006	—	1/2	Phimose	Spaltung	—	5	12	10	—	—
2007	M	13	Nadel in der Kniekehle	Incis und Entfernung	40	5	34	90	Erb. n.	—
2008	W	64	Hernia inguin. dupl.	Rad.-Op.	60	8	45	140	do.	0,01 Mo.
2009	W	56	Cholelithiasis	Cholecystotomie, Entfernung	60	7	80	180	2 Erbr'eh v. Gallenach	do.
2010	M	6	Phimose	Circumc. d. Spalt. d. Praep.	30	6	15	40	—	—
2011	W	29	Retroflexio uteri	Alexand.	60	8	60	160	—	0,01 Mo.
2012	W	30	Graviditas tubar. dupl. ?	Lap. u. Exstirp. d. Fruchtsk.	60	8	80	220	—	do.
2013	W	35	Haemorrhoiden	Ligatur der Knoten	60	7	23	90	Erb. n.	do.
2014	W	—	Varices sin.	Unterbg. d. V. saph. maj.	40	5	10	60	do	—
2015	W	28	Lebereirrhose, Gallensteine?	Laparotomie	40	8	50	100	—	—
2016	W	29	Struma coll.	Strumectomie	40	6	30	100	Erb. w. u. n.	—
2017	W	53	Lipoma humeri sin.	Excis	40	3	20	60	—	—
2018	W	18	Ostitis pelvis	Untersuchung	20	4	10	40	—	—
2019	W	31	Retroperitoneale Drüsen	do.	40	3	10	40	—	—
2020	W	—	Perityphl. (Tub. ? d. Caecum)	Resect. d. proc. à froid	40	5	60	100	—	Kein Mo.
2021	M	15	Phimosis	Spaltung	40	4	10	60	Erbrech. w. u. vielm. n.	—
2022	W	69	Carcinoma menti max.	Resect. d. Mittelf. d. U.-Kief. Excis d. carc. Plastic.	40	10	40	60	2 Stund post Op sistiert d. Puls plötzl. Collaps, Exit. trotz künst. Oearp.	2 Std. post. Op. fest. d. Puls plötzl. Coll. Exit. Emboli?
2023	M	71	Hydrocele pernaq. Phim.	Excis, Spaltung	40	10	50	120	—	Kein Mo.
2024	W	16	Pes quinovaris paral.	Arthrodesis	10	5	40	120	Mehrm. Erb. w. und n.	do.
2025	M	16	Vulnus celn manus, Ver- letzung d. Strecksehne	Tenorrhaphie	10	8	30	230	do	do.
2026	M	20	Perityphlitis	Excis d. proc. v. cruff.	10	6	105	60	Etw. Husten während	0,01 Mo.
2027	M	21	Fractura cruris sin. compl.	Reposit.	10	5	20	80	—	Kein Mo.
2028	W	26	Lymphom faciei et colli	Excis	40	5	35	120	Schleimbrecnen nach	0,01 Mo.

2030	W	70 Angiosarcoma brachii	Excis	10	4	25	60	Erbrechen n.	entartet. Puls ansetzend.
2031	W	16 Anlegung d. Gypsvorband. n. Keilexeis		40	6	15	60	do.	—
2032	W	38 Retrof. uteri. Cyst. d. cervix. Aufrieh. u. Narc. Inc. d. Cyst.		80	12	45	160	—	Etwas Fetherz.
2033	—	35 Valvus autabrachii	Tenographie	60	10	25	140	Erbrechen n.	—
2034	W	30 Granulationsnarbe	Excis	80	15	25	120	—	—
2035	W	15 Vereiterte tubere Drüsen	Eröffnung, Auskratzung u. Reponirtg. m. Jod.	50	10	25	80	Erbr. nach	—
2036	M	18 Osteomyelit.	Eröff. d. Abscess i. Femur	30	5	35	60	—	—
2037	M	36 Carcin. metast. a. Wundbohr.	Excis	120	15	90	380	—	—
2038	W	30 Perityphilitis	Excis d. Wurmfortsatzes	20	5	55	80	—	—
2039	W	56 Carcinoma mammae	Excis d. Knoten	20	10	30	100	Erbr. n.	—
2040	M	1 Osteomyelit.	Eröffnung	10	5	20	20	—	—
2041	M	7 Mastoiditis	Trepan. d. proc.	20	10	35	80	—	—
2042	W	24 Ostitis tuberc.	Teilw. Resect. d. Metatars. I	10	10	35	80	—	Myocard. Klappenfehler
2043	W	62 Bauchhernie	Probelaparotomie	10	8	45	100	—	—
2044	W	15 Submucöse Fibrome	Enucleation	20	5	40	80	—	—
2045	W	29 Ovarialtumor	Entf. d. Laparotomie	40	10	45	100	—	—
2046	W	5 Perityphilitis	Eröffn. d. 2. perityphl. Absc.	20	5	55	80	—	—
2047	W	21 Ostitis d. I. Metatarsus	Abtragung d. etwa vortseh. Knoch. d. I. Metatars. I	40	8	25	80	—	—
2048	W	51 Arthritis tubercul.	Abtrag. d. weitererkr. Gew.	40	5	35	110	—	—
2049	W	38 Tendovaginitis tub. d. 3. u. 4. Fing. d. r. Hand	Entfernung d. Fungus	40	5	40	100	—	—
2050	M	16 (Phlebitis tuberc.) cavern.	Incis u. Drainage	40	5	25	80	—	—
2051	W	9 Halsdrüsen	Excis	20	8	50	60	—	—
2052	W	41 Fibr. pend. labii maj. dextr	Abtragung	40	4	30	70	—	—
2053	W	22 Parovarialtumor	Entfernung bd. Tuben u. d. Parovarial-Tumor	80	15	70	230	—	—
2054	W	37 Ankylose d. r. Fussgelenk.	Aufriechung d. Fusses	60	8	20	140	Erbr. n.	—
2055	W	35 Hernia crural dextr.	Abtragung d. Bruchsackes	40	5	60	120	—	—
2056	M	52 Meniscitis d. l. Knies	Entf. d. innern Meniscus	60	8	60	170	Erbrechen nach	Stk. Bronchitis, Leichte r. seitige Pneumon.
2057	W	57 Struma	Strumectomie	20	4	60	100	—	—
2058	W	43 do.	Enucleation	30	6	45	100	Erbrechen nach	—
2059	W	— Abscessus d. l. Mamma	Eröffnung und Drainage	80	6	15	130	do.	—
2060	M	41 Coxit, m. multiple Abscess	Auskratzung do.	40	5	40	120	—	—
2061	M	31 Meniscusablösung	Entfernung d. Meniscus	60	8	55	180	—	—
2062	W	33 Uterus fibroid.	Enucleation	80	10	85	250	Erbrechen nach	—
2063	M	16 Cavernom am l. Fuss	Excis	60	8	55	141	do.	—
2064	W	8 Quetschg. d. l. Phalanx. d. 2. Fing. d. r. Hand	Nahrt	15	4	20	60	do.	—

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2065	M	9	Gonitis tuberc. d. l. Knies	Resectio genu	30	5	100	do.	—
2066	W	57	Grosse Bauchhernie	Zusammenheften	60	10	140	do.	—
2067	M	2	Schl. geh. Vorderarmfractur	Bruch d. Bruchenden u. Fixationsverband	10	3	50	do.	—
2068	W	53	Multiple Myome	Amputatio uteri	50	7	105	—	—
2069	W	48	Carcinoma mammae	Exeis	10	1	35	—	—
2070	—	12	Empyem	Paracentese	5	2	15	—	—
2071	M	38	Fractura patellae	Naht m Silberdraht	6	10	35	—	—
2072	M	18	Tubercul. navicular.	Exeis	10	7	35	—	—
2073	M	31	Tuberc. d. l. Handgelenks	Resectio	10	7	95	—	—
2074	M	1	Hernia inguin.	Abtragung d. Bruchsackes	15	3	45	—	—
2075	M	30	Osteomyelitis tib.	Eröffn. d. Modularrohr Ausr.	10	8	50	—	—
2076	—	12	Phimosis	Rad. Op.	10	3	10	—	—
2077	W	28	Retroflexio uteri	Alexander	10	1	55	—	—
2078	W	27	Parametritis	Eröffnung	10	1	35	—	—
2079	M	5	Ellbogenfractur	Untersuchung	10	3	10	—	—
2080	W	22	Ren mobile	Nephropexie	30	1	60	—	—
2081	M	5	Fractura condyl. extern.	Extraction	20	4	15	—	—
2082	M	26	Gonitis tuberc.	Resectio genu	10	1	70	—	—
2083	M	3	Amnionisch. Abschnürungen	Durchschneid. d. Verbindung zw d. Phal.	10	1	200	—	—
2084	W	—	Lähm.	Abtragung	10	2	10	—	—
2085	M	29	Fractura tibiae	Gipsverband	10	3	20	—	—
2086	M	14	Vol.-Aruffract. mule savat.	Bruch d. geh. Fiet u. Gypsv.	20	1	20	—	—
2087	W	22	Retroflexio uteri	Alexander	10	5	20	—	—
2088	W	30	Hernia crur. dextr.	Rad. Op.	30	1	60	—	—
2089	W	61	Sepsis.	Incis a d. r.	20	1	25	—	—
2090	M	1	Phlegmon d. r. Hand	Incis an der Hand	15	3	20	—	—
2091	M	19	Multiple Drüsen	Ausratzg. do.	10	2	10	—	—
2092	W	53	Fibromyom d. Uterus	Hysterectomie	20	3	55	—	—
2093	M	3	—	Incis	10	10	90	—	—
2094	—	25	Bursitis praetibial.	Abtragung d. Bursa	10	2	25	—	—
2095	—	—	—	—	10	1	15	—	—

Mo-Inject., etw. fr. als ge-
wohn. Kein Excitastad.
s. ruhige N.

[illegible]

Nr	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch d. Mark.	Eintritt der Markose	Dauer der Markose	(Verbrauch bis	Nachwirkungen	Bemerkungen
2137	W	45 Absc. a. d. Ausss. d. Vndarm.	Ausrüstung	60	8	25	100	—	—
2138	M	12 Schld. geheilte Radiusfract.	Brachen derselben.	40	5	15	50	—	—
2139	M	1 1/2 Hernia inguin	Herniotomie	30	2	30	50	—	—
2140	M	5 — Fremdkörp. im G. Extract.	Rad.-Op.	20	3	12	40	—	—
2141	W	18 Hernia ing. beiderseits	do.	40	15	55	110	Erbr. n.	—
2142	W	7 1/2 Rechte inguinal hernie	Rad.-Op.	10	5	75	60	Erbrechen w.	—
2143	W	36 Hernia inguin l.	Ablatio	25	7	50	120	Erbr. n.	Pneumonie v.
2144	W	41 Fibroid uteri	Unters. Brech. d. Adhaesion.	30	9	25	90	—	—
2145	M	28 Alte Luxatio humeri recti	Perineoplast	80	15	25	100	—	—
2146	W	39 Prolapsus uteri	Kollporrhaph.	25	7	70	120	—	—
2147	W	49 Canceroid vag. canc. Drüsen	ant. et post.	40	8	32	100	—	—
2148	M	28 Schld. geh. Fract. d. Rad. sin.	Eröffnung d. Fract.-stelle.	30	10	48	110	—	—
2149	W	35 Extrauterin schwangerschaft	Laparotomie	30	6	72	110	Erbr. w. und n.	—
2150	W	19 Inguinalhernie r.	Rad.-Op.	35	7	37	80	—	Sehr leicht cyanotisch
2151	M	4 1/2 Phimosis	Phim. Op.	10	2	17	25	—	—
2152	—	48 Struma cyst.	Resect	30	6	30	110	—	—
2153	W	30 Ostit. arthrit. tbc. cub. calc.	do.	40	6	65	100	3 Erbrechen w.	—
2154	W	28 Canceroid. d. r. Nasenflügels	d. l. Fusses	30	5	20	70	1 Erbrechen n.	—
2155	W	64 Carcinoma ovarii dupl.	Ablatio	30	5	90	200	—	—
2156	W	23 Struma	Ovariectomie	10	10	75	170	Erbr. w. u. n.	2 Erb. i. flg. N. u. 1 a. M.
2157	W	24 Knieferbein	Strumeetomie	40	10	30	100	Erbrechen w.	—
2158	M	22 Inguinalhernie l.	Ablatio	40	7	15	80	Erbr. nach	—
2159	W	31 Extrauterin schwangerschaft	Laparotomie	40	10	80	100	do.	0,02 Mo.
2160	W	44 Nabelhernie	Rad.-Op.	35	7	35	80	—	0,01 Mo.
2161	W	48 Cysto uteri	Totalexstir	30	6	135	100	—	0,02 Mo.
2162	M	32 Inguinalhernie l.	Rad.-Op.	40	10	45	120	—	do.
2163	W	49 Care. Drüsen d. Achselh. noch v. 2 Jab. op. carc. mam. dupl.	Ablatio	30	7	18	60	—	N. stek. Erbr. sek. Blutg. 12
2164	M	18 Struma	Strumeetomie	40	10	85	140	—	nos. O. für Art für san.

2166	M	11	Fiscula am 3. l. U-Kiefer Zahnehr.	50	10	30	200	—	—	do.
2167	M	—	Tumor intest.	80	15	120	350	—	—	0,01 Mo.
2168	W	20	Perityphlitis (à froid)	10	5	80	110	8 bis 10	Erbrechen n.	0,02 Mo.
2169	W	43	Hernia crur. incare.	40	10	35	80	—	—	do.
2170	M	26	Perityphlitis (à froid)	60	15	75	140	—	—	do.
2171	W	32	Haemorrhoiden	30	10	15	80	Erbrechen nach d. N.	—	0,02 Mo.
2172	M	52	Carcinom, corp. uteri	50	15	70	110	—	—	do.
2173	W	27	Mastoiditis purulenta	60	12	25	100	Erbrechen n. d. N.	—	do.
2174	W	79	Hernia inguinalis incare.	40	15	25	75	—	—	0,01 Morph.; Arterioscler.
										Albuminurie vor der N.
										nachher nicht verwaudet.
2175	M	36	Fractur dupl. mall. dextr.	60	10	10	75	Erbrechen n. d. N.	—	War unvorbereitet
2176	M	43	Hernia epipyl. mobil.	60	15	25	120	do.	—	0,02 Mo.
2177	M	51	Necrose d. Fingerhnochen	50	15	10	80	—	—	do
2178	W	28	Schnitt d. d. Flexorenschne d. 2. r. Fingers	60	10	35	140	—	—	0,03 Mo.
2179	W	40	Panarit.	40	10	10	60	—	—	0,02 Mo. unvorbereitet
2180	M	24	Hydrocele.	60	10	25	120	—	—	0,02 Mo.
2181	M	62	Hernia ing. incare.	50	15	60	110	—	—	Op. mit Lokalanästhesie (Eylectelonid) eingeleitet
										Puls vorher nicht fühlbar
2182	M	18 $\frac{1}{2}$	Vena varicis testis d.	50	12	30	120	Erbr. w. u. n. d. Op.	—	0,02 Mo.
2183	W	57	Cholelithiasis	60	15	75	140	—	—	0,02 Mo. früher 1 m. aeth.
2184	W	14	Ostitis sterni	30	10	70	120	—	—	0,0? Mo.
2185	W	66	Prolapsus recti	40	10	80	120	—	—	0,02 Mo. früh. 1 m. aether.
2186	W	53	Prolapsus uteri	50	10	95	140	—	—	0,02 Mo. früh. 1 m. aether.
			Perineorrhaphie	40	10	10	60	Erbrechen n. d. N.	—	0,02 Mo
2187	W	44	Prolapsus uteri	40	10	10	60	—	—	do.
2188	W	30	Struma	50	12	30	—	—	—	do.
2189	M	18	Struma	60	10	35	110	—	—	0,01 Mo.
2190	W	57	Ovarialcyste	50	10	60	220	—	—	do.
2191	W	42	Varicen	40	10	10	60	Erbrech. w. u. n. d. N.	—	—
2192	W	32	Struma	40	10	35	120	Erbrechen w. d. N.	—	0,02 M. früh. 1 m. aether
2193	W	50	Enostom. a. d. l. V. Sehne.	—	10	25	200	—	—	0,02 Mo.
2194	M	37	Inguinalhernie	—	15	25	160	—	—	0,02 Mo. Fetherz.
2195	W	40	Ovarialcyste	30	7	80	140	—	—	Puls klein u. schw. d. d. m. Aetherinjection
2196	W	20	Retroflexio uteri	40	6	45	100	Erbr. n.	—	0,02 Mo.
2197	W	19	Tbc. Drüsen am Hals	40	10	30	100	Erbrechen w. d. N.	—	do.
2198	W	37	Carcinoma vaginae	60	7	90	250	do.	—	do.
2199	M	8	Tbc. Abscess a. d. l. Hüfte Incision	30	5	15	60	do.	—	1 m. aetherisiert V. 97
2200	W	18	Tbc. Absc. a. r. Ellbogengelenk. Auskratzung	30	7	10	60	Erbr. w. und n. d. N.	—	5 m. aetherisiert

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Ve. brach bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2201	M	50	Hydro- u. Varicocele	Incis., Ligatur	60	12	40	180	—	0,01 M 1 m. aetheris.
2202	M	54	Spermatocoele	Excis.	50	7	15	120	Erbrechen n. d. N.	0,02 Mo.
2203	W	4 1/2	Nabelhernie	Herniotomie	20	5	10	40	—	—
2204	W	20	Ren mobile	Untersuchung	60	12	10	80	Erbrechen n. d. N.	Unvorbereitet
2205	W	2	Angioma frontis	Excision	30	3	20	50	do.	—
2206	W	54	Uterus-Polyp	Enucleation	60	8	10	80	—	0,02 Mo.
2207	W	20	Wanderniere	Nephropexie	40	10	50	140	—	0,02 Mo. 1 m. aeth. N. 2204
2208	W	5	Perityphlitis	Resect. app. vermie.	20	5	30	60	—	—
2209	M	14	Drüsen in der Achselhöhle	Ausräumung	30	5	20	60	—	—
2210	W	—	Retroflexio uteri	Alexander	40	7	70	120	Erbrechen w. d. N.	0,02 Mo.
2211	W	20	Retroflexio uteri	Resect. append.	60	10	40	150	—	do.
2212	M	21	Colica appendicales	Resect. append.	80	15	25	160	—	do.
2213	W	49	Carcinoma uteri	Exstirpat.	40	7	35	110	Erb. n. d. N.	Vorth. schw. aussetz. Puls
2214	M	21	Nachblut. n. oper. Perityph.	Incis., Drainage	60	7	30	200	—	vid. 2212
2215	W	19	The Compla. int. fem. dextr.	Resect. genu	30	5	75	110	—	Tracheot. w. Oedema pulmon.
2216	W	17	—	—	30	5	10	50	—	—
2217	W	17	Carcinoma recti	Anus praeter nat.	30	5	15	80	—	0,01 Mo.
2218	W	—	Hernia incarc.	Herniotomie	30	5	35	100	—	Schw. Puls unvorher.
2219	W	19	Wunde am Ellbogen	Plastik	30	7	30	80	—	6 mal aetherisiert
2220	W	—	Tbc. Dr. d. Regio submax. s.	Incis.	40	5	8	80	—	Unvorbereitet
2221	W	25	Hernia crur. incarc.	Herniotomie	30	5	30	70	—	Unvorbereitet
2222	M	32	Mastoiditis purul.	Trepanat.	80	10	35	220	Erbrechen n. d. N.	—
2223	M	18	Wunde a. r. Unterschenkel	Naht	30	5	15	60	—	Op. m. schl. Lokalaeth. angf.
2224	W	47	Ileus nach anus praeternat.	Laparot. Panet. d.	40	5	45	120	—	Starb n. 7 Tg. Care. b. over.
2225	W	18	Perityphl. purul.	Peritonit.	30	5	25	90	—	d. ut., rect. u. Periton.
2226	M	57	Hernia umbilic.	Herniotomie	60	5	25	180	—	Eru. n. 5 Tg. allg. p. Per
2227	W	30	Lipoma d. l. Oberarms	Exstirpat.	30	5	15	60	—	0,02 Mo.
2228	W	30	Retroflexio uteri	Alex.	30	5	75	140	—	—
2229	W	48	Struma	Strumectomie	30	5	40	160	—	0,02 Mo.
2230	W	43	Sarcom a. d. r. Achsel	Exstirpat.	60	10	35	140	—	do. Vit. cond.
2231	W	23	Hernia inguin. sinistr.	Herniotomie	50	7	20	120	Erb. n. d. N.	0,01 Mo.
2232	M	27	Hernia inguin.	do.	60	5	30	180	—	do.
2233	M	45	Tbc. Drüsen am Hals	Incis.	60	10	25	180	—	do.
2234	M	29	Hernia ing.	Herniotomie	60	5	30	180	—	Unvorbereitet

2235	M 41	Hernia inguin	Herniotomie	50	5	25	140	—	0,01 Mo
2236	M 41	Necrose an d. V. Zehe	Neurotomie	80	5	10	80	—	do.
2237	M 41	Hernia ing.	Herniotomie	100	7	48	190	—	do.
2238	M 15 1/2	Ostitis tibiae	Auskratzung	180	8	15	120	Erbr. n.	—
2239	M 32	Retroflexio uteri	Alex.	80	8	45	130	—	0,01 Mo.
2240	M 8	Retroflexio uteri	Resectio gen.	30	3	75	90	—	—
2241	M 18 1/2	Phimose	Circumcision	80	6	10	100	—	—
2242	M 20	Meniscitis gen. sin.	Excis d. Meniscus	80	7	35	150	—	0,01 Mo.
2243	W 45	Hernia ing. Cyst. v. Ligat. rotund	Excis d. Cyst. Herniotomie	80	6	30	130	—	do.
2244	W 50	Vereit the. Drüse v. d. Ohr	Excis	70	5	35	150	Erbrechen	—
2245	W 68	Carcin. mam.	Rad.-Op.	50	5	45	05	—	0,01 Mo.
2246	M 21	Cholesteatom.	do.	50	4	45	100	—	do.
2247	W 14	Caries des Paukengewölbes	Ausräumung	50	5	70	140	—	—
2248	M 25	Phimose	Circumcision	50	5	10	80	—	0,01 Mo.
2249	M 37	Knie-trauma	Untersuchung	70	7	10	80	Sehr ger. Erb. n. d. N. fr. 2 m. chlorof. jedesmal 2 Tg. Erbr.; P. schildert die Aethermark. viel angen.	—
2250	M 32	Perityphlitis	Laparotomie	40	4	17	90	—	—
2251	W 33	Hernia ing.	Herniotomie	70	8	40	140	Erbrechen n. d. N.	0,01 Mo.
2252	W 23	Sehnen-durchschneidung	Sehnennaht	60	5	20	90	—	—
2253	M 41	Anal-fistel	Cauterisation	100	13	30	220	—	00,1 Mo. Alkoh. st. Excit.
2254	M 45	Carcin flexur. col. dext.	Exstirpat	40	5	140	200	—	0,01 Mo.
2255	M 33	Arthrit. tub. gen.	Resect. gen.	80	7	80	230	—	do.
2256	W 28	Ovarialcyste	Ovariectomie	50	6	30	80	—	do.
2257	W 20	Perityphlitis	Resect. append. verm	70	6	30	100	—	do.
2258	W 34	Hernia crur.	Herniotomie	70	6	30	130	—	—
2259	W 29	Retroflexio uteri	Alex	70	8	40	140	—	—
2260	W 27	Caries d. Fusswurzelknoch.	Auskratzung	60	6	30	120	—	—
2261	W 54	Doppels Hernia crur	Auskratzung	70	6	40	120	—	—
2262	W 21	Struma colloides	Herniotomie	70	7	40	180	—	0,005 Mo.
2263	M 10 M	Hernia inguin	Strumectomie	70	7	40	180	—	—
2264	W 50 d	l. ovarium m Cyste im l. Labium prolabit.	Herniotomie	20	2	20	40	—	—
2265	W 30	Struna coll.	Exstirpat.	60	6	30	120	—	—
2266	M 14	Tub Abdom. Drüsen	Strumectomie	80	7	40	120	—	0,005 Mo
2267	W 21	Osteomyelitis chron. tib.	Laparotomie	40	4	35	100	—	—
2268	M 32	Hydrocele test.	Anfeisslg. u. Auskratzung	60	6	40	100	—	Früher 1 mal aethenis
2269	W 32	Ovarialeyste	Rad.-Op	100	8	40	140	—	0,01 Mo.
2270	W 60	Perinephrit. Abscesse	Ovariectomie	50	5	60	120	—	—
2271	M 30	Struma	Entfernung u. Drainage	90	7	60	220	—	—
2272	W 30	Ovarialeyste	Strumectomie	60	6	45	120	—	—
	W 30	Ovarialeyste	Ovariectomie	70	5	50	140	—	—

Nr.	Alter	Diagnose	Operation	Verwund. ebis Eintr. d. Narb.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2273 M	38	Absprengung des cond. int. Exeis	Exeis, Auskratzung	120	8	50	250	—	0,01 Mo.
2274 M	45	The. Hadsdrüsen	Ovariotomie	60	6	50	120	Hefiges Erbrechen	—
2275 W	21	Ovarialeyste	Incis. u. Luxat humeri	60	8	60	140	—	—
2276 W	5	Fract. u. Luxat humeri	Incis. u. Repos.	40	4	25	70	—	—
2277 W	20	Bursitis præpatell.	Exeis	50	5	20	80	—	—
2278 W	40	Bursitis coccyg et sacri	Incis. u. Entfernung	70	5	40	100	—	—
2279 W	—	Struma	Strumectomie	60	6	50	120	—	—
2280 —	4 M.	Hernia inguin. beids.	Herniotomie	30	4	40	80	—	—
2281 —	5 J.	Hernia umbil.	do.	30	3	40	70	—	—
2282 W	18	Perityphlitis	Exeis d. proc. verm.	70	7	35	120	—	—
2283 W	60	Carcinoma recti	Exeis	50	5	50	140	—	—
2284 W	42	Schleimhautentzündung u. Ulcer. Anus	Exeis	60	5	25	120	—	—
2285 W	32	Prolaps uteri	Colporrhaph. ant. et post.	60	6	70	140	—	—
2286 M	1 1/2	Hernia inguin.	Herniotomie	20	5	35	40	—	—
2287 W	6 1/2	Retract. d. r. Hand n. Verbr.	Incis. u. Transplant.	20	5	55	30	1 mal Erbrechen	—
2288 W	8 1/2	Osteomyelitis d. l. Tib.	Eröffnung u. Ausräumung	15	2	35	60	1 mal "	—
2289 W	13	Ostit. calcan.	Eröffnung	20	9	20	60	1 mal "	—
2290 W	50	Abscess im Abdomen	Eröffn. v. d. Vag. a. l. e. Fist.	80	7	30	110	—	—
2291 M	19	—	—	80	15	90	100	—	—
2292 W	59	Lipom am r. Knie	Entfernung	40	10	20	60	—	—
2293 M	31	Luxat. menisci inf.	Exeis	40	5	35	80	—	—
2294 M	42	Hernia inguin. dextr.	Herniotomie	30	5	35	100	1 mal Erbrechen	—
2295 W	44	Uterusfibrom. Ovarialeyste	Hysterectomie abdom.	30	10	95	120	—	—
2296 W	2 1/2	—	—	20	5	25	30	—	—
2297 W	35	Struma	Strumectomie	20	1	45	80	Mehrm. Erbrechen	Nare, mit 10,0 Chloräthyl. eingel. Strupa hatte d. Atm. sehr st. behindert Vorher 10,0 Chloräthyl
2298 M	25	Perityphlitis	Exeis d. proc. verm.	30	5	50	90	—	10,0 Chloräthyl.
2299 W	2 M.	Hernia inguin.	Herniotomie	15	5	25	30	Mehrmals Erbrechen	do.
2300 W	20	Ostit. cond. int. tib.	Resect	30	10	50	80	—	do.
2301 W	59	Pied bot. doul.	Pyrogeff	20	5	45	60	—	do.
2302 W	2 1/2	Traum. Flexor-Semementz	Tenorrhaphie	15	2	35	50	—	do.
2303 W	22	Arthr. tub. gen.	Auskratzung d. Fistein	30	5	30	100	Mehrm. Erb. w. u. n.	do.
2304 M	28	Ulcer und Varices	Auskratzung v. Venenresect	30	2	60	90	—	do.
2305 M	17	Osteomyelitis tib.	Sequestrotomie	20	5	60	100	—	10,0 do. Mo. 0,01 2 m

2306	M	40	Fract. patell.	Nacht	30	15	100	10,0 Chloräthyl; h. noch
2307	M	35	Hernia inguin	Herniotomie	60	10	90	Bronchikat. n. verschl.
2308	W	17 1/2	Drüsen in den Axilla beids.	Exstirpat.	40	5	35	10,0 Chloräthyl.
2309	M	57	Carcinoma penis	Ablat d. glans, pen.	30	2	105	10,0 Chloräthyl.
2310	W	20 J	Pertiphyllitis	Incis	20	5	15	10,0 " Eryth. im Ges.
2311	W	5 1/2	Anagl. d. r. Fusses	Gypsverband	20	1	15	hätte Reintr.
2312	M	55	Rectract. d. Palm. aponeur.	Resect. d. Apon.	60	5	140	10,0 Chloräthyl; Emph.
2313	W	31	Recto-vagin. Fistel	Obstrat. d. Fistel	20	2	40	10,0 Chloräthyl.
2314	W	38	Ovarialeyste	Ovariotomie	40	10	70	do.
2315	W	31	Recto-vagin. Fistel	—	20	2	100	do.
2316	M	50	Hernia umbil.	Herniotomie	20	10	50	do.
2317	M	34	Struma	Strumectomie	15	10	60	do.
2318	W	40	Hernia umbil.	Herniotomie	20	2	15	do.
2319	W	52	Varicen an beid. Beinen	Ligatur beider Saphenen	40	2	40	do.
2320	W	25	Cystocoele	Colpor. ant.	20	1	60	do. W. zu r. Aetherg
2321	W	18	Retrolflexio uteri	Alex	20	5	70	nach Chloräth. w. inf
2322	W	32	—	Untersuchung	20	2	100	Atmst. k. Atm. gem. w.
2323	M	17	Tbc. genu	Resectio gen.	15	5	60	10,0 Chloräthyl.
2324	M	30	Schmndurchschneidung	Nacht	20	5	50	do.
2325	W	30	Humerus fractur	Gypsverband	20	5	20	do.
2326	W	10	Schmndurchschneidung	Nacht	15	2	80	10,0 Potator unvorberit.
2327	W	33	Abscess am Sacrum	Ausräumung	20	2	75	— unvorberitet
2328	W	36	Extraterin - Schwangersch.	Exstirp. d. Foet. u. d. Adn.	20	15	50	10,0 Chloräthyl.
2329	W	27	Ophor. Salpingitis tbc.	Exstirpat.	20	10	105	do.
2330	M	51	Pertiphyllitis	Eröffnung	20	5	60	do.
2331	M	15	do.	Resect. d. proc. verm.	20	2	60	do.
2332	M	30	Varicen am Bein	Ligatur der Saph.	20	2	50	10,0 Chloräthyl.
2333	W	52	Carcinoma, Halsdrüsen	Ausräumung	40	6	30	do.
2334	M	10	Pes varus paralyt.	Resectomie	10	15	60	do.
2335	W	25	Extraterin - Schwangersch	Laparotomie	60	3	65	do.
2336	M	41	Verletzung der Meniscus	Exstirpation	20	2	35	3 T. vorh. chlor. schw. P.
2337	M	35	Euristis paralyt.	do.	20	1	40	10,0 Chloräthyl.
2338	W	9	Floberktelg im Fusse	do.	20	5	35	do.
2339	W	27	Parovarialeyste	do.	20	5	120	do.
2340	W	43	Abscess im Douglas	Eröffnung und Drainage	20	1	80	10,0 Chloräthyl.
2341	M	14	Multiple Knochenruberul.	Ampt. d. r. B. oberh. d. K.	20	1	90	do.
2342	W	30	Luxat. d. radius	Reposit. n. Gypsverband	20	2	160	do.
2343	M	45	Lupus surae	Excis	20	7	25	do.

Nr.	Geschlechte	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2344	W	26	Retroflexio uteri, Prolaps.	Alex., Colporaph.	20	5	80	170	Etwas Brechreiz	—
2345	M	28	Lymphadenit. colli	Incis v. Auskratzung	30	9	25	110	—	—
2346	W	24	Incontinent. alvi	—	30	5	30	145	Erbrechen	—
2347	W	45	Carcinoma mam.	—	20	5	45	125	Brechreiz	—
2348	W	45	Fibromyoma uteri	Hysterectomie	70	5	100	150	—	—
2349	M	—	Perityphitis	Incis	30	5	25	90	—	—
2350	M	—	Lipoc. am Oberg.	Excis	30	5	15	60	—	—
2351	W	30	Hypert. carc. l. ovid uteri	Amput. carc. Alex.	30	10	90	150	Erbr. n.	—
2352	M	51	Arthritis tabet. gen.	Resect. d. Kniegelenkes	40	5	90	120	Viel Eib.	10,0 Chloroathyl.
2353	W	32	Fissura ani. Tumor. i. Dougl.	Untersuchung	30	5	20	60	Erbrechen	do.
2354	M	15	Flöbertk zw. d. Metacarp. I.	Extract.	30	10	25	70	do.	do.
2355	W	30	Nierenstein	Blossl d r. N. Ls. d. Adhas.	40	10	60	100	do.	do.
2356	W	32	Necrose der Tibia	Sequestrotomie	20	10	50	100	Erbrechen d. ganz. Tag	do. K. Eiw. v. u. n.
2357	W	40	Myom d Uterus	Myotomie	20	5	120	100	Erbrechen	do.
2358	M	1 1/2	Hernia inguin	Radical-Operation	10	5	25	20	do.	do.
2359	W	30	Lymphoma colli	Incis, Auskratzung	10	5	10	30	do.	do.
2360	M	60	Unterkiefer n. Nare.	Entf. d. nektr. Part.	20	5	75	50	—	10,1 Chloroath. do.
2361	W	—	Sarcoma auf der Achsel	Excis.	60	10	35	140	—	10,0 Chloroath. do.
2362	W	51	Doppelseit ovarialeyste	Ovariectomie.	20	5	65	100	Erbrechen	do.
2363	W	13	Necrose d Felsenbn.	Trepanation	20	5	90	110	do.	do.
2364	W	20	Retroflexio uteri	Alex.	30	10	60	90	—	do. Etw. Eiweiss v. u. n. d. op.
2365	M	29	Struma	Strumectomie	10	20	60	120	Etwas Erbrechen	do. Kein Eiw. vor; n. d. Op. 0,5 Promill; nach 48 Stunden verschw.
2366	W	40	Ovarialcyste	Ovariectomie	20	10	70	90	Brechreiz	10,0 Chloroath. K. E. v. u. n.
2367	W	33	Ovarialtumor	Extirpation	20	5	80	100	—	Kein Eiweiss v. u. n.
2368	W	51	Vaginaltumor.	Erföffnung	10	5	55	100	Erbrechen	10,0 Chloroath. K. E. v. u. n.
2369	W	42	Retroflex. uteri	Alexander	10	2	65	05	—	Kein Eiweiss v. u. n.
2370	W	32	Hernia inguin. incarc.	Herniotomie	20	5	40	30	Erbrechen	do. do. unverb.
2371	W	32	Nect. d. Darnies n. Herniot	Resect. von 12 cm. Darm	20	5	65	100	do.	Kein Eiweiss
2372	W	26	Mastitis suppar.	Incis Drainage	20	5	20	30	—	do.
2373	W	10	Perityphitis	Resectio proc. mast	10	2	50	110	—	10,0 Chloroath. K. Ei.
2374	M	70	Tbc. Senkungsabscesse	Punktion	30	5	25	30	—	do.
2375	M	7	Ostit. calcan	Excochleation	10	2	30	50	—	do.
2376	M	6	Hernia inguin	Rad.-Op.	10	2	20	50	Erbrechen	do.

2377	M	7	Fract. condyl. ext. humeri	Reposition, Knochennaht	10	2	15	70	Erbrechen	15,0 Chloroath. Kein Eiw.
2378	W	35	Doppels. Ovarialeyste	Ovariotomie	20	5	70	110	—	do.
2379	W	42	Hernia ing. Retrofl. uteri	Rad.-Op. Alex.	30	5	65	120	—	do.
2380	W	42	Hern. crur. dupl. Varicen	Rad.-Op. Ligatur	20	5	50	80	—	do.
2381	M	80	Tumor testic.	Hodenexstirp.	40	8	40	100	—	do.
2382	W	23	Extrauterin gravid.	Entfernung bd. Tuben.	20	5	55	120	—	do.
2383	W	20	Perityphlitis	Resect. d. proc. verm.	50	10	55	180	Erbrechen	do.
2384	W	20	Perityphl. Exsudat	Incis. Drainage	20	5	40	60	—	do.
2385	W	20	Ulcera cruris. Varicen	Doppelseit. Ligat. d. Saph.	40	10	25	80	—	do.
2386	M	32	Sequest. am Schädel	Sequestrotomie	60	20	40	100	—	do.
2387	W	—	Drüsen am Hals	Exstirpation	30	5	15	60	—	do.
2388	W	—	Tbc. d. Metatarsalknochens	Resection	30	5	30	50	—	do.
2389	W	35	Perityphl. Oophoritis	Exstirp d. proc. v. Ovariot.	30	5	50	100	—	do.
2390	M	42	Perityphlitis	Exstirp. d. proc. verm.	30	10	65	120	Erbrechen	do.
2391	W	—	Ren mobile	Nephropexie	50	5	65	220	do.	do.
2392	W	50	Ascitis, Tbc.	Laparotomie	20	5	15	80	do.	do.
2393	M	25	Ostit. tub. ped.	Resectio	20	3	55	100	Erbrechen	do.
2394	M	2	Hypospadie.	Bildg. eines Kanals	10	10	40	30	—	do.
2395	M	21	Schneiddurchschneidung	Sehnennaht	40	10	30	80	—	do.
2396	W	—	Perityphlitis	Resect. proc. verm.	40	2	50	100	—	do.
2397	M	5 M	Hernia inguin	Rad.-Op.	20	5	25	40	—	do.
2398	M	—	do.	do.	30	10	45	120	—	do.
2399	M	—	Hernia umbil.	do.	40	10	50	200	—	do.
2400	M	42	Hernia ing	do.	50	10	50	230	—	do.
2401	W	35	Hernia incar. Myom. uteri	Rad.-Op. Amput. d. uterini	40	5	95	150	—	do.
2402	W	5 M	Angiom. lab. major.	Excis	10	5	15	30	—	do.
2403	W	46	Carcin mammae	Excis	20	10	40	120	—	do.
2404	W	21	Perityphlitis	Resect. d. proc. verm.	50	5	110	220	—	do.
2405	M	38	Gangraena dig. V ped.	Ablatio	40	10	25	120	—	do.
2406	M	31	Fract. patell.	Sutur.	60	10	40	220	—	do.
2407	M	40	Haemorrhoiden	Excis	40	10	45	130	—	do.
2408	W	30	Prolaps. vag. Care. mam.	Drüsenexstirpation	40	5	100	180	—	do.
2409	W	50	Recidiv. v. Care. mam.	Ovariotomie	20	5	25	60	—	do.
2410	W	30	Ovarialeysten	Ovariotomie	20	5	25	100	Erbrechen	do.
2411	M	2	Hyposp.	Bildg. eines Kanals	20	5	45	60	do.	Etw. Eiw.
2412	W	38	Hernia crur. sin. ing. dext.	Rad.-Op. bds.	20	10	40	101	do.	do.
2413	M	29	Perityphlitis	Resect. proc. verm.	60	5	40	100	do.	do.
2414	W	33	Carcin. uteri	Totalexstirp. ut.	20	5	90	110	do.	do.
2415	W	46	Papillom. d. Ovar.	Ovariotomie	20	5	40	40	—	do.
2416	M	31	Perityphlitis	Res. proc. verm.	30	5	45	100	Erbrechen	do.
2417	W	64	Hernia incar.	Herniotom. Darmresection	20	5	65	90	—	do.
2418	M	27	Tub. ped.	Resectio tarsi	20	2	95	200	Erbrechen	5,0 Morphing. Unvorbereit. 10,0 Chloroath. Kein Eiw.

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintritt d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2419	W	8	Drüsenabszess	Incis	20	2	10	30	Wenig Erbrechen	—
2420	M	24	do.	Incis	30	10	20	50	Erbrechen	5,9 Chlorath, Kein Eiw.
2421	M	52	Perityphl. Masekthermie	Res. pr. v. Rep. d. H. m. Nt.	10	5	60	120	do.	do.
2422	M	2	Hypostadi.	Bildung d. Kanals	10	2	60	10	do.	do.
2423	W	30	Retroflexio uteri	Alexander	30	5	50	90	—	do.
2424	W	52	The calum.	Resectio d. calic.	20	5	60	100	Erbrechen	do.
2425	W	55	Drüsenabszess am Hals	Incis u. Excochl.	30	5	30	90	do.	do.
2426	W	19	Bursitis prepatell.	Excis der bursa	50	5	15	60	—	do.
2427	M	20	Osteomyel. Absc. a. Othersch.	Incis und Excochl.	30	5	20	100	Erbrechen	do.
2428	M	18	Perityphlitis	Resect. der proc. verm.	40	10	55	120	do.	do.
2429	W	55	Drüsenabszess	Incis	40	10	20	100	do.	do.
2430	M	25	Empyem d. Pankenhöhle	Trepauat	40	10	75	150	do.	do.
2431	W	40	Osteomyelitis	Incis	40	5	20	100	do.	do.
2432	W	48	Exart. rib.	Exstirpation	20	5	30	50	do.	do.
2433	M	49	Tbc. d. Fusses	Pirogoff	20	5	15	10	do.	do.
2434	M	10	Spasmen der Obersch.-Musk.	Tenotomie d. Adhiärsch.	20	5	55	50	do.	do.
2435	M	12	Perityphlitis	Resectio proc. verm.	20	5	50	100	do.	do.
2436	M	24	Traum. Abscess am Finger	Amputation	30	5	10	80	do.	do.
2437	M	19	Beid. osteomyel. rib.	Excochl.	30	5	60	120	do.	do.
2438	M	31	Perityphlitis	Res. proc. verm.	30	5	20	110	do.	do.
2439	M	30	Schmerzquerquetschung	Sichnemah	30	5	50	10	do.	do.
2440	W	—	Varicen	Ligaturen	10	5	60	100	do.	do.
2441	M	11	Ostit. syphilit. rib.	Excochl. Resectio	20	5	135	180	do.	do.
2442	W	59	Carcinoma recti	Exstirpation	40	15	80	120	do.	do.
2443	W	32	Struma	Strumectomie	20	5	120	120	do.	do.
2444	W	60	Carcin. ventric.	Magenresect. n. Kocher	20	5	40	60	do.	do.
2445	W	75	Cystadoma mam.	Ablat. m.	40	10	50	120	do.	do.
2446	M	18	Schmerzzerreissung	Naht	20	5	70	100	Erbrechen	do.
2447	W	52	Tbc. ostit. ulnare heids.	Osteotomie	20	5	25	120	Wenig Erbrechen	do.
2448	W	26	Am. Polipst. d. proc. m. Incis.	—	40	10	90	125	—	do.
2449	W	32	Fibroma uteri	Myomotomie	10	7	50	80	Erbrechen	do.
2450	W	40	Oodhrifts	Laparotomie	10	10	40	100	—	do.
2451	M	25	Struma	Strumectomie	60	4	20	120	Erbrechen	do.
2452	M	30	Varicen	Ligatur	40	3	40	100	do.	do.
2453	W	40	Exostose d. Fibul.	Osteotomie	40	3	40	100	do.	15,0 Chlorath

2454	M	55	Hydrocele	Incis	40	10	20	60	5,0 Chloroeth. Kein Eiw.
2455	W	11	Perityphlitis	Resect. d. proc. verm.	80	10	60	60	do.
2456	W	45	Rippenecrose	Neotomie	40	10	30	100	do.
2457	M	12	Fract. antibrachii	Rep. Gypsverb.	40	10	15	80	do.
2458	W	6	do.	do.	20	3	20	20	5,0 Chloroeth. do.
2459	W	24	Ovarialtumor	Ovariectomie	40	10	50	100	do.
2460	W	12	Verrucae	Excis	40	5	10	80	do.
2461	M	34	Hernia ing.	Herniot.; res. d. proc. verm.	40	10	50	140	do.
2462	W	25	Atrophic uteri	Untersuchung	40	5	15	70	5,0 Chloroeth. do.
2463	M	25	Meniscus	Excis	60	10	40	160	do.
2464	W	14	—	Tenotomie	10	5	40	100	—
2465	W	—	Osteomyelitis	Neotomie	40	5	80	110	5,0 Chloroeth. Kein Eiw.
2466	W	27	Ostit. fem.	Osteotomie	40	7	55	120	do.
2467	W	—	Coxitis tib.	Resectio	20	5	120	100	do.
2468	W	14	Zahnabscess	Incis	10	7	10	40	do.
2469	M	64	Sequest. d. tib.	Sequestrotomie	40	5	40	100	Vorher Bronchitis
2470	W	34	Panaritium	Incis	20	2	10	20	5,0 Chloroeth. Kein Eiw.
2471	M	52	Oberkiefer caries	Ausr. Unterbindg. d. Carotis	40	4	80	120	do.
2472	W	6	—	Gypsverband	20	3	15	40	do.
2473	W	9	Perityphlitis	Resect. proc. verm.	20	4	25	60	do.
2474	M	20	Osteomyl. fem.	Eröffnung	40	4	60	160	do.
2475	W	8	Perityphlitis	Res. proc. verm.	60	3	40	110	do.
2476	M	16	Schusswunde	Entfernung der Kugel	10	5	20	60	—
2477	M	46	Strict. d. Harnröhre	Urethrotomie inf.	60	5	40	120	—
2478	W	51	Ovarial carcin.	Ovariectomie	20	5	35	60	5,0 Chloroeth. Kein Eiw.
2479	W	51	Prolaps. uteri	Colporaph. Dammplastik	20	4	70	100	Kachexie. Asaites
2480	M	26	Gonitis	Resect. gen.	20	6	150	150	5,0 Chloroeth. Kein Eiw.
2481	W	11	Lymphadenitis colli	Anskratzung	20	4	15	40	do.
2482	M	30	Panaritium	Incis	40	3	15	60	do.
2483	M	40	—	Cystoscopie	—	—	—	—	Unvorbereitet
2484	W	20	Hernia inguin	Rad.-Op.	20	4	30	80	Vorh. 1 Prom. Albumen; nachh. unverändert
2485	M	18	do.	do.	20	4	25	60	—
2486	M	34	do.	do.	60	7	25	120	5,0 Chloroeth. Vorher Bronchitis
2487	W	32	Perityphlitis	Res. proc. verm.	40	6	25	120	5,0 Chloroeth.
2488	M	30	Cholesteatom.	Trepan. d. proc. mast	20	4	25	40	—
2489	M	22	Perityphlitis	Res. proc. verm.	40	7	50	120	—
2490	W	37	Retroflexio uteri	Alex	10	7	45	120	5,0 Chloroeth. do.
2491	W	36	do.	do.	20	4	50	100	do.
2492	—	—	Necrose d. Sch.	Sequestrotomie	40	6	40	80	do.
2493	M	35	Phlegmose	Incis	60	10	25	180	—
					60	7	10	80	Fischer.

Nr.	(Geschlecht)	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2494	M	69	Structur der Harnröhre	Urethrotomie int.	40	6	25	140	—	—
2495	M	17	Perityphlitis	Res. proc. verm.	40	7	30	120	—	5,9 Chloroäthyl.
2496	M	57	Carcin. lab. inf.	Excis	40	8	46	—	—	—
2497	W	36	Meniscitis	do.	120	10	70	300	Erbrechen	—
2498	M	53	Fibroma uteri	Hysterectomie	20	3	30	140	—	Sehr schwache Pat
2499	W	15	Otitis med.	Trepanat.	40	6	50	120	—	—
2500	M	30	Retroflexio uteri	Alex.	20	4	55	60	—	—
2501	W	34	Fract. tib.	Repos. Gypsverband	60	7	20	160	Wenig Erbrechen	—
2502	M	13	Perityphlitis	Incis	20	5	35	80	—	—
2503	M	20	Ovarialtumor	Ovariectomie	20	4	60	100	—	—
2504	W	20	Fract. tib.	Rep. Verb.	60	10	30	100	—	—
2505	M	33	Retroflexio uteri	Alex.	20	4	50	60	Etw. Erbrechen.	Kein Eiw.
2506	W	28	do	do.	20	4	40	80	—	do.
2507	W	36	Struma intrathor.	Resectio	40	6	70	100	—	—
2508	W	—	Tbc. Drüsen	Excis	60	5	10	100	—	—
2509	—	25	Hernia ing.	Rad.-Op.	40	5	35	80	—	Kein Eiw.
2510	W	24	Carcin. mammae	Amput. m.	20	5	60	100	—	—
2511	W	32	do.	do.	40	5	45	120	—	—
2512	W	32	Myoma uteri	Enucleation	20	5	120	80	—	—
2513	W	36	Struma	Strumectomie	40	6	60	100	—	Vit. cordis
2514	M	21	Hernia ing.	Rad.-Op.	40	4	35	40	—	—
2515	M	13	Perityphlitis	Res. d. proc. verm.	40	6	75	50	—	—
2516	W	62	Tbc. ped.	Amputat.	20	4	30	100	—	—
2517	W	23	Perityphlitis	Res. d. proc. verm.	20	4	50	30	—	—
2518	W	38	Carcinoma uteri	Totalexcisurpat.	40	6	150	180	—	—
2519	—	4	Coxitis	Gypsverband	10	3	30	100	—	—
2520	M	51	Tbc. pedis	Pirogoff	60	8	70	30	—	—
2521	W	69	Anus praeternatur.	Schliessung dess.	40	6	70	150	—	—
2522	W	4	Pyemie. Multiple Abscesse	Eröffn. an 5 Orten	10	1	60	100	—	—
2523	W	28	Gallensteine	Cholecystotomie	40	8	90	80	—	—
2524	W	38	Sehnen durchschneidung	Naht	20	4	60	110	—	—
2525	M	22	Ankylos. gen.	Gypsverb.	40	6	40	120	—	—
2526	M	50	Hydrocele fun. sperm.	Rad.-Op.	60	6	30	110	—	—
2527	M	40	Perityphlitis	Res. proc. verm.	40	6	50	140	—	0,01 Moph.
2528	M	19	Struma	Strumectomie	40	5	30	100	—	—

2529	M	19	Luxat cubit.	Resect. cub.	60	90	140	—	—
2530	M	20	Hernia ing. dupl.	Rad.-Op.	60	5	05	100	Elwas Erbr.
2531	M	60	Pyæmie	Amput. fem.	20	2	35	40	—
2532	M	39	Hydrocele	Rad.-Op.	40	3	20	40	—
2533	M	9	Vergrößerte Lymphdr.	Incis.	20	2	10	20	—
2534	W	1 1/2	Spina ventosa	Ausratzung	20	2	10	20	—
2535	W	—	Recid. crur. rect. carcin.	Excis	50	7	106	225	—
2536	M	53	Struma	Strumectomie	90	11	70	220	—
2537	M	—	Subluxat. gen	Arthrodese	75	14	135	225	—
2538	M	37	Pyam. Abscesse i. Sacrum	Partielle Resectio	45	5	40	85	—
2539	W	—	Luxat. coxae congen.	Resect. coxae	25	4	105	110	—
2540	M	—	Perityphlitis	Rad.-Op.	45	6	50	100	—
2541	M	—	Eingewachsener Nagel	Part. Nagelexcis	50	6	20	90	do.
2542	M	15	Tbc. gen.	Resectio gen.	60	7	93	160	do.
2543	W	4 1/2	Perityphlitis	Rad.-Op.	40	11	60	60	do.
2544	M	23	Hernia ing	do.	65	10	50	120	do.
2545	W	—	Chron. Oophoritis Perityphl.	Rad.-Op. Ovariectomie	65	11	60	170	do.
2546	W	—	Fistel im l. Scheidengewölbe	Plast. Op.	30	4	50	100	do.
2547	W	58	Hernia ing.	Rad.-Op.	30	4	35	85	do.
2548	W	14	Otitis med.	Trepan.	10	2	20	25	do.
2549	W	15	Struma	Strumectomie	30	6	50	80	do.
2550	M	27	Tbc. Fist. a. d. Trochantergeg.	Excis	30	7	80	140	do.
2551	M	62	Carcinoma recti	Darmresect.	115	13	190	440	do.
2552	W	50	Abscess d. r. Wade	Eröffnung	40	6	12	60	—
2553	W	8	Fungus genu.	Arthrectomie	30	5	80	110	do.
2554	W	—	Periproctitis	Spaltung	50	5	35	120	do.
2555	W	—	Ovarialhernie	Rad.-Op.	60	10	45	300	do.
2556	W	—	Uterus polyph.	Totalexcisurp. d. Uterus	40	4	60	75	—
2557	W	52	Adnex.-Fibrom	Salpingitis	80	9	120	30	do.
2558	W	—	Drüse a. l. Kieferwinkel	Laparotomie	30	5	25	30	—
2559	W	—	Spina ventosa	Excis	10	2	22	115	—
2560	W	29 1/4	Klumpffuss	Exarticulation	—	—	—	—	—
2561	W	6	Empyem d. cellul. mast.	Plast. Verläng. d. Achillessehne, Redressement	20	2	23	65	do.
2562	W	76	Carcin. mam	Trepan.	25	4	60	240	do.
2563	M	29	Blasenpapillom	Ablatio m.	30	6	50	230	do.
2564	W	—	Periproct. Abscess	Sect alta vesic.	120	9	80	75	—
2565	W	9	Ostitis tbc. u. gonitis	Spaltung	40	8	85	60	—
2566	M	18	Perityphlitis	Resectio gen.	25	2	55	125	—
2567	W	24	Empyem d. cellul. mast.	Incis	30	6	15	220	—
2568	W	—	—	Trepan.	75	14	60	200	—

Vorher collabiert.

K. Eiw.

do.

Stark cachektisch

Kein Eiweiss

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2568	W	—	Extrauterin gravid.	Laparotomie, Entfernung	77	7	55	220	—	—
2569	M	64	Hernia ing.	Rad.-Op.	100	5	55	200	Erbr. n.	Kein Eiweiss
2570	M	20	Hydrocele testis	Spaltung	70	6	20	100	do.	—
2571	M	64	Hernia ing. u. Epid. abh.	Rad.-Op. u. Castratio	70	6	50	100	do.	K. Blw., dag. the i. Urin
2572	W	—	Hämorrhoid.	Ligatur und Abtragung	80	10	30	140	do	Sehr anämisch
2573	W	—	Schling. purul.	Abtragung, Ovariectomie	100	14	90	290	—	—
2574	W	4	Klumpfuß	Osteot. Redressement, Verl.	20	1	35	70	—	—
2575	W	27	Perityphlitis	Rad.-Op.	70	10	50	110	Etwas Erbrechen	Anämisch
2576	W	27	Exostose am Fuss.	Excis.	40	12	20	50	—	—
2577	W	28	Struma coll.	Strumectomie	100	7	55	270	—	—
2578	M	29	The. d. Blaseschleimhaut	Scetio alta	100	8	90	360	—	0.01 Mo.
2579	W	—	Haemoral the.	Resect. d. Darnes	56	9	135	300	—	—
2580	W	26	Hernia ing. dextr.	Herniotomie	85	15	30	130	—	—
2581	W	—	Drüsen u. Abscesse a. Fuss und in der Leiste	Excis.	10	1	60	80	—	—
2582	M	—	Abscesse u. resect. genu	Spaltung	60	10	60	110	—	—
2583	M	60	Hernia ing. bds.	Rad.-Op.	70	10	50	140	—	—
2584	W	—	Peritonit. the.	Laparotomie	40	14	55	150	—	0.02 Mo.
2585	W	—	Carcin. mam.	Ablatio m.	50	9	75	180	—	—
2586	W	29	Osteomyelitis fem.	Osteoclase	80	10	50	210	—	Cachexie.
2587	W	—	Struma profunda	Strumectomie	50	5	15	100	Erbrechen	Schwächlich
2588	W	—	Salpingitis, Oophoritis	Ovariectomie	60	7	75	220	Cyanose stark	0.015 Mo.
2589	M	10	Nabel-Dermoid.	Excis.	30	5	20	50	—	do
2590	W	60	Carcinom. pylori	Gastro-Enterostomie	50	8	105	280	—	Schwächl. 2 m. collaps.
2591	W	26	Ovarialkystom	Ovariectomie	80	12	40	110	Erbrechen	dessh. Kochsalzlufus.
2592	W	18	Unguis incarn.	Nagelentfernung	50	9	20	70	—	—
2593	M	—	Meniscitis	Resectio d. mam.	100	12	45	160	Erbrechen	—
2594	W	—	Mam. carcin. recid.	Entfernung	80	14	60	140	—	—
2595	M	—	Hydrocele test.	Excis.	30	2	50	110	—	—
2596	W	—	Luxatio clavic. supraacrom.	Repos. u. Fix.	60	10	10	130	—	—
2597	W	—	Perityphlitis	Rad.-Op.	30	5	10	120	—	—
2598	W	—	Struma colloid.	Strumectomie	70	12	55	150	—	Anf. 200 m ³ Aeth. w. 20 Tr. Cl. plupumil. ein- gesetzt. Narcose rubio-

2599	W	Hernia ing.	Rad	60	7	60	100	—	do.
2600	W	Synovitis manus	Op.	90	12	32	110	Erbrechen	do.
2601	M	Phimosis	Phim. Op.	20	4	20	70	—	do.
2602	M	Ileus l. Carcinoma recti	Anus praternatur.	80	11	45	140	Leichtes Besommensein	do. Kein Eiweiss
2603	M	Carcin. ventr. inoper.	Explorativ. Eröffnung	120	12	40	175	—	Kein Eiweiss
2604	M	Ileus infol. eingekl. Hernie	Laparotomie	60	5	30	110	—	Zusatz v. alp. pur. K. E
2605	W	Ostitis criste tibie	Eröffnung u. Thermoaufer	60	8	25	120	—	W. sehl. P. 700,0 Koch-
2606	M	Varicen	Ligatur d. ven. saph.	100	8	25	180	—	salzlosung inf.
2607	M	Sehnenquetschung	Nacht	100	8	20	185	Stark. Erbrechen	Zus. v. alp. pur. K. Eiwe.
2608	W	Tbc. Knicabscess	Spalt u Drainage	50	6	30	110	Erbrechen	do.
2609	W	Mefritis	Curettement	80	7	35	140	—	Kein Eiweiss
2610	M	Bursitis praepatell.	Ausschälung	180	14	40	270	Erbrechen	do.
2611	W	Carcinoma uteri	Hysterectomie p. vag.	80	11	110	290	—	do.
2612	W	Ovarialcysten	Ovariectomie	60	10	45	140	—	do.
2613	W	Tbc. cubiti.	Resect. d. Ellbog.	60	11	110	260	Erbrechen	do.
2614	W	Carc. uteri. Ovarialcysten	Hyster- u. Ovariectomie	7	5	45	455	—	do.
2615	W	Osteomyelitis fem.	Untersuchung	70	6	100	100	—	do.
2616	M	Fract. epicondyl. humeri	Gypsverband	20	3	175	125	—	do.
2617	M	Carcinom. recti	Laparotomie	110	10	15	500	—	do. 0,02 Mo.
2618	W	Carc. mammae	Ablatio	80	12	60	210	—	do.
2619	M	Perityphlitis	Rad -Op.	80	10	180	120	—	do.
2620	W	Struma	Strumectomie	100	12	115	100	—	do.
2621	W	Hernia umb.	Rad.-Op.	60	8	45	360	Erbrechen	do.
2622	M	Fussgelenk tbc.	Pirogoff	110	15	60	360	—	do.
2623	W	Carc. rect.	Rad.-Op.	110	12	35	170	—	do.
2624	W	Ren mobile	Nephropexie	60	10	70	150	—	do.
2625	W	Prolaps. uteri et vag.	Colporraph. ant. et post.	60	11	135	120	—	do.
2626	W	Tbc. Synchondritis stern.	Ecrasement	40	6	70	150	—	do.
2627	W	Retrof. uteri	Alex.	70	8	100	120	—	do.
2628	M	Magenstrict. inf. Ulcus	Entero Gastrotomie	60	7	35	150	—	do.
2629	M	Radialis contus.	Freilegung d. rad.	10	3	46	220	Erbrechen	do.
2630	M	Hernia inguin. tbc. Neben-	Herniotomie. Excis d. tbc.	110	16	80	50	Exit. i. Narc. vid Pg. 119 Zu wen. vorb v. Pg. 119	do.
2631	M	hoden, beids.	Nebenrhoden	90	15	55	—	do.	do.
2632	W	Schusswunde	Extract d. Geschosses	50	17	—	130	—	do. S. schwächl.
2633	W	Mam. carcin recidiv.	Excis	50	7	35	100	—	K. Eiwe. V. stik. Dyagn.
2634	W	Struma prof. retrotrachealis	Strumectomie	60	10	50	110	Erbrechen	Kein Eiweiss
2635	M	Fussgelenk tbc.	Amputation	50	7	50	150	—	do.
2636	M	Carcinoma cardiaë	Gasterotomie	40	12	50	110	Starkes Erbrechen	do.
2637	W	Perityphlitis	Radical-Operation	20	12	40	140	—	do.
		Pes varus paralyt.	Kellexcis					—	

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2635	W	—	Carcinoma mammae recid.	Excis	60	10	55	140	Starkes Erbrechen	Kein Eiweiss. Unvorher.
2639	W	52	Struma colloid	Strumectomie	40	9	50	90	—	do.
2640	W	—	Strumitis	Incis	50	10	30	75	—	do.
2641	W	—	Quetschung d. kl. Fingers	Nacht	70	12	35	100	Erbrechen	do.
2642	M	—	Beckenabscess	Spaltung	40	8	15	60	—	do.
2643	M	2½	Lymphangit. purul.	Drainage	15	3	20	30	—	do.
2644	W	42	Kystofibrom d. Uterus	Hysterectomie p. lap.	80	14	110	250	—	do.
2645	M	35	Tbc Abscess a. l. Mall. ent.	Incis	90	18	13	110	—	do.
2646	W	23	Perityphilitis	Radical-Operation	50	4	55	80	—	do.
2647	M	—	Carcin. pen.	Amput. pen.	80	15	120	290	—	do.
2648	W	30	Retroflexio uteri	Alexander	60	15	50	130	—	Kein Eiweiss. 0,01 Mo.
2649	W	3	Pes varius paralyt.	Achillotomomie	10	1	20	30	—	do.
2650	W	44	Spin. vent. u. Rippencar. the.	Ampt. d. F. u. Rippenresect.	60	8	60	140	—	do.
2651	W	38	Perityphilitis	Radical-Operation	50	5	30	80	Erbrechen	do.
2652	W	48	Multipl. Fibromyom. uteri	Hysterec. p. Laparatomie	60	10	100	200	—	do.
2653	M	58	Antrax im Nacken	Spaltung mit Thermocauter	50	8	25	120	—	do.
2654	M	15	Infect. Kniegelenkentzündg.	Resectio	170	23	75	270	—	Kein Eiweiss 0,02 Mo.
2655	W	32	Tumoren im Parametrium	Entf. d. l. Ovar. u. Tl. d. Param.	90	8	70	180	—	do. 0,05 Mo. v. s. schl. P.
2656	W	32	Hernia ing.	Radical-Operation	70	10	30	120	Erbrechen	Kein Eiweiss. 0,01 Mo
2657	W	25	Perityphilitis	Resect. der proc. verm.	60	8	45	150	—	do.
2658	W	31	Arthritis. purul. sin.	Punktion des Knies	70	7	20	100	do.	do.
2659	W	36	Coccygodynie	Resectio ossis coccyg.	95	13	30	115	do.	do.
2660	W	43	Fibroid d. Uterus	Uterectomie	90	10	105	300	do.	do.
2661	W	15	Struma	Strumectomie	100	10	30	130	do.	do.
2662	W	44	Arthr. the. gen.	Resectio gen.	90	13	75	150	—	do.
2663	M	20	Phimose	Phim. op.	70	5	12	110	—	Pt. ging b. n. d. Op. heim
2664	W	32	Ilcus	Laparotomie	70	5	75	230	—	Kein Eiweiss. 0,01 Mo.
2665	W	17	Eingewachsener Nagel	Entfernung d. proc. vern.	70	5	7	70	—	Kein Eiweiss
2666	M	15	Appendicitis	Resection d. proc. vern.	120	12	90	230	—	do.
2667	M	63	Carcinoma ventriculi	Gastrotonie	90	13	60	250	—	Kein Eiweiss. 0,01 Mo
2668	W	42	Hernia crur.	Herniotomie	80	5	30	170	—	Kein Eiweiss
2669	W	20	Schmündurchtrennung	Nacht	60	7	18	90	—	do.
2670	M	26	Hoden the.	Castration	120	13	30	210	Erbrechen	Kein Eiweiss. 0,01 Mo
2671	M	02	Carcin. rect.	Excis	60	5	75	250	—	do.
2672	W	21	Asthma	Excis	100	10	20	190	—	do.

2673	W	11	Coxit. Ankyl.	Manuelle Abduktion	50	7	45	100	Erbrechen	do.	Vorh. k. Eiwh., n. e. Sp. Kein Eiweiss
2674	W	56	Hernia ing.	Rad.-Op. Res. proc verm	90	7	40	150	do.	do.	—
2675	W	15	Peritonitis	Laparotomie	50	5	45	120	do.	do.	—
2676	M	14	Osteomyel. tib.	Abmeisslung	80	8	46	150	do.	do.	Vorh. k. Eiwh., n. e. Sp. Kein Eiweiss, 0,01 Mo
2177	W	27	Vers tauchung d. r. Hand	Entfernung d. os. lunat.	130	15	35	150	do.	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2678	M	23	Hernia ing.	Rad.-Operation	60	7	35	170	Erbrechen	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2679	W	26	Prolaps. uteri	Kolporrhaphie	100	12	70	270	do.	do.	Kein Eiweiss, 0,008 Mo.
2680	W	34	Oophritis beids.	Laparotomie	70	10	80	200	do.	do.	Kein Eiweiss
2681	W	17	Struma	Strumectomie	60	8	55	150	do.	do.	Kein Eiweiss
2682	M	34	Spermatocele	Entfernung	100	13	30	120	Erbrechen	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2683	W	13	Osteomyelitis	Ausmeisslung	70	7	90	170	do.	do.	Kein Eiweiss
2684	M	48	Carcin. recti	Resectio	90	13	105	400	do.	do.	Kein Eiweiss
2685	W	11	Coxitis	Gypsverband	60	10	25	100	Erbrechen	do.	Kein Eiweiss
2686	W	51	Fibro-Lipom am Fuss	Excis	80	8	90	100	do.	do.	do.
2687	W	37	Stenose d. Pylorus	Gastro-Enterostomie	80	15	90	260	do.	do.	do.
2688	W	48	Ulcus-Narbe d. Magens	Gastro-Enterostomie	80	15	45	330	do.	do.	do.
2689	W	50	Mastit. tbc.	Resection d. M.	100	15	50	180	do.	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2690	W	30	Retroflexio uteri	Alexander	80	10	65	190	Erbrechen	do.	do.
2691	W	48	Prolaps. uteri	Kolporrhaphie	80	10	20	170	do.	do.	Kein Eiweiss
2692	W	13	Ostitis tbc.	Auskratzung	40	10	30	60	do.	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2693	M	29	Hernia crur.	Radical-Operation	130	15	100	170	do.	do.	do.
2694	W	27	Salpingitis tbc.	Salpingectomie	100	15	25	250	do.	do.	Kein Eiweiss
2695	W	31	Fissura ani	Dilatation	90	10	30	130	Erbrechen	do.	do.
2696	W	40	Krampfaderen	Ligatur	110	10	15	180	do.	do.	do.
2697	M	1/2 J.	Phimose	Spaltung	50	5	85	80	do.	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2698	W	20	Salpingitis	Laparotomie	80	8	90	160	Erbrechen	do.	do.
2699	W	30	Appendicitis	Laparotomie	110	10	55	300	do.	do.	do.
2700	M	25	Ovarialtumor	Ovariectomie	100	10	75	160	Erbrechen	do.	do.
2701	M	62	Prolaps. d. antr. praternat.	Auskratzung	80	10	30	220	do.	do.	do.
2702	W	44	Knie tbc. recid.	Schluss d. aus pr. nat.	50	10	35	100	do.	do.	do.
2703	M	34	Luxation d. Mittelfingers	Resection	150	18	120	200	Erbrechen	do.	do.
2704	W	38	Parovarialcyste	Laparotomie	90	10	110	230	do.	do.	V. u. n. e. Eiwh. 0,01 Mo
2705	M	32	Magenblutung	Laparotomie	120	12	45	300	do.	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2706	M	38	Carcinoma penis	Tellw. amputation	80	8	45	280	Erbrechen	do.	do.
2707	W	30	Struma	Strumectomie	80	10	50	120	do.	do.	do.
2708	W	30	Dammriss	Kolporrhaphie	80	10	40	160	do.	do.	do.
2709	M	41	Fract. I ad. et ulur	Verband	90	10	25	150	do.	do.	Potator
2710	W	53 1/2	Adenoma mammae	Entfernung	70	13	45	80	Erbrechen	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2711	W	30	Verrucae	Excis	80	5	70	220	do.	do.	do.
2712	W	31	Sehnervenverletzung	Naht	80	8	45	250	do.	do.	do.
2713	W	54	Ostitis und gonitis tbc.	Amputation	60	10	15	110	do.	do.	do.
2714	W	35	Ostitis media	Trepanation	70	8	12	125	Erbrechen	do.	do.

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Nark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2715	W	41	Tumor im l. Paramet.	Untersuchung	75	7	12	90	Erbrechen	Kein Eiweiss
2716	W	63	Senkungsabsz. a. Oberschl.	Incis	90	8	30	120	do.	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2717	W	6	Lipom an d. Schulter	Excis	30	4	25	70	—	Kein Eiweiss
2718	W	37	Struma	Strumect.	70	8	35	100	—	Kein Eiweiss, 0,01 Mo
2719	W	22	Appendicitis	Resect. d. proc. verm.	60	5	40	140	Erbrechen	do.
2720	W	22	Uterusblutung	Laparotomie	90	5	40	130	—	Kein Eiweiss
2721	W	18	Retroflexio uteri	Alex.	80	10	50	180	Erbrechen	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2722	W	41	Salpingitis	Laparotomie	110	10	120	300	—	do.
2723	M	20	Perityphilitis	do.	130	13	55	185	Erbrechen	Kein Eiweiss
2724	M	30	Struma	Strumectomie	70	7	35	110	—	Kein Eiweiss, 0,01 Mo.
2725	W	53	Canceroid a. Labium	Excis	70	6	60	140	Erbrechen	do.
2726	W	62	Abscess	Incis	70	10	20	70	—	do.
2727	W	36	Extra-uterin-gravid.	Laparotomie	70	7	65	160	—	do.
2728	W	33	Perityphilitis	Incis	50	7	45	140	—	do.
2729	W	43	do.	Laparot. u. res. proc. verm.	70	15	70	150	—	do.
2730	W	64	Cholelithiasis	Laparotomie	70	13	120	200	—	do.
2731	W	56½	Tumor d. Mesent.	do.	50	8	30	100	—	do. 0,01 Mo.
2732	W	13	Osteomyelitis	Incis	80	10	30	80	Erbrechen	do. —
2733	W	13	Perityphilitis	Res. d. proc. verm.	40	7	15	110	do.	do. —
2734	M	55	Struma maligna	Strumectomie	60	15	90	340	do.	do. —
2735	M	14	Perityphilitis	Entfern. d. proc. verm.	90	8	40	120	do.	do.
2736	W	42	Retrofl. uteri u. Myomata	Laparotomie u. Ventrifix.	90	8	60	250	—	do.
2737	W	24	Strumitis	Incis	70	8	30	120	—	do.
2738	W	57	Bauchwandhernie	Rad.-Op.	70	8	40	130	Erbrechen	do.
2739	M	5	Hernia serotal.	do.	50	8	25	60	—	Kein Eiweiss
2740	M	23	Omarthrit.	Pröfñ. d. Gelenkr.	150	20	180	530	Erbrechen	do. 0,01 Mo.
2741	W	47	Retroflexio uteri	Alex.	100	12	60	170	—	do. do.
2742	W	42	Nadel im Arm	Excis	80	4	20	130	Erbrechen	Kein Eiweiss
2743	W	19	Struma. Cristaurium	Strumect. Excis d. Crist	130	20	95	250	do.	do. 0,01 Mo.
2744	M	22	Gelenkm. i. Knie	Eröffnung d. Exl.	110	10	30	160	—	do.
2745	W	24	Ovarial-Cyst.	Ovariectomie	110	10	60	180	—	do.
2746	W	46	Uterusmyom.	Supravagin. Uterus-Exstirp.	70	7	100	250	—	do.
2747	M	29	Hernia inguin.	Rad.-Op.	130	10	40	270	—	do.
2748	W	32	Retroflexio uteri	Alex.	150	10	45	180	—	do.
2749	M	6	Hernia inguin.	Rad.-Op.	70	10	30	80	—	do.

2750	W	58	Carcin. ventr.	Gastro-jejunostomie	70	7	40	120	Kein Eiweiss, Mo.-Atr.
2751	W	8	Lymphomata colli	Excis	40	4	55	100	Kein Eiweiss
2752	W	33	Perityphlitis	Res. proc. verm	60	12	60	100	Erbrechen
2753	M	27	Ostitis cost.	Incis. Ausräumung.	110	15	70	200	—
2754	W	55	Uterus-Fibroid.	Hysterectomie	90	15	170	320	Kein Eiweiss, Mo.-Atr.
2755	W	60	Adenoma mammae	Excis	70	10	30	90	do.
2756	M	12	Ostitis tbc. ped.	Pirogoff	70	8	30	160	Erbrechen
2757	W	37	Perityphlitis	Laparotomie	70	9	70	300	do.
2758	W	43	Myomata uteri	Supravagin. Exstirpat.	70	9	90	100	Kein Eiweiss, Mo.-Atr.
2759	M	12	Appendicitis	Laparotomie	40	8	40	380	K.E. N. m. Somnof. einkl
2760	M	34	Struma	Strumectomie	120	10	90	70	Kein Eiweiss Mo.-Atr
2761	W	16	Ganglion in d. Hohlhand	Excis	70	8	15	220	Kein Eiweiss
2762	M	22	Hernia ing.	Rad.-Op.	80	10	50	—	Kein Eiweiss, Mo.-Atr.
2763	M	38	Fremdkörper im Knie	Gelenkeröffnung	110	15	25	360	do.
2764	W	54	Uterustumoren	Hysterectomie	90	10	135	200	Erbrechen
2765	M	36	Ostitis m.	Trepan.	110	15	30	220	Kein Eiweiss
2766	W	30	Varicen	Ligatur	140	15	40	280	do.
2767	W	56	Fibroid d. Uterus	Totalexstirpat. d. Ut.	100	15	105	270	do.
2768	W	54	Carcin. ut.	Supravagin. Exstirp.	80	12	130	170	Kein Eiweiss, Mo.-Atr
2769	W	27	Struma	Strumectomie	70	10	50	260	do.
2770	W	24	Cholesteatom. d. l. Ohres	Trepan.	70	10	65	40	do.
2771	M	1 1/4	Mastoiditis	do.	40	8	40	80	Kein Eiweiss
2772	M	8	Appendicitis	Laparotomie	50	4	45	180	do.
2773	W	30	Retroflexio uteri	Alex.	80	10	65	110	Kein Eiweiss, Mo.-Atr
2774	W	8 1/2	Mastoiditis	Trepan.	40	5	55	160	Kein Eiweiss
2775	M	62	Appendicitis	Res. d. pr. verm.	110	12	30	160	do.
2776	M	17	Coxitis tbc.	Resect. coxae	110	15	75	170	V. u. n. d. Op. E., "
2777	W	62	Cystitis tbc	Eröff. d. Blase u. Ausbrenn.	100	12	75	250	Kein Eiweiss
2778	W	39	Uterusfibroid	Supravagin. Exstirpat. d. ut.	80	12	90	120	do. Mo.-Atr
2779	W	23	Peritonitis tbc.	Laparotomie	70	8	45	160	do. Mo.-Atr
2780	M	14	Osteomyelitis	Sequestrotomie	70	7	65	120	Kein Eiweiss
2781	W	17	Gelenkm.	Gelenkeröffnung	80	10	40	250	do. Mo.-Atr.
2782	W	39	Abscess	Eröffnung u. Ausräumung	70	10	105	80	Kein Eiweiss
2783	M	7	Phim	Phim. Op.	55	6	15	130	do. Mo.-Atr.
2784	M	44	Entzündung	Incis	70	10	30	100	do.
2785	M	51	Ganglion d. Handgelenkes	Excis	80	8	25	160	do.
2786	M	18	Hernie epig.	Herniotomie	120	15	40	100	do.
2787	W	8	Osteomyelitis	Sequestrotomie	90	10	30	200	do.
2788	M	16	Strichhöhlenentzündung	Eröffnung der Höhlen	80	15	120	150	do.
2789	W	24	Cholesteatom.	Trepan.	60	6	60	80	do.
2790	W	5	Lähm d. Quadricep. sura	Achillototomie	20	3	20	150	do.
2791	M	32	Drüsenentzündung	Excis	100	12	70	145	do.

Nr.	Geschlecht	Alter	Diagnose	Operation	Verbrauch bis Eintr. d. Mark.	Eintritt der Narkose	Dauer der Narkose	Gesamter Verbrauch	Nachwirkungen	Bemerkungen
2792	W	48	Tbc Periton	Laparotomie	100	7	60	145	—	Kein Eiweiss, Mo.-Atr.
2793	W	68	Mastitis	Excis	70	15	30	90	—	do.
2794	W	37	Uterustumor	hysterectomie	130	8	130	360	—	do.
2795	W	23	Lymphom. coli	Excis	50	5	20	90	Leichtes Erbrechen	do.
2796	W	57	Arthrit. tbc. ped.	Resection	40	8	45	90	—	do.
2797	W	45	Sarcoc. d. r. Mam	Exstirp. d. M.	90	12	65	140	—	do.
2798	W	73	Hernia ing d.	Rad.-Op.	35	5	25	85	—	Vor. E. nach. n. m. M.-Atr.
2799	W	58	Carcin uteri	Hysterect.	90	8	120	250	—	Kein Eiweiss, Mo.-Atr
2800	W	32	Extrauterin gravid	Laparotomie	60	6	90	200	—	do.
2801	W	38	Myom uteri	Supravagin. Hysterect.	70	8	90	250	—	Vor. E. nach. n. m. M.-Atr.
2802	M	5	Hernia ing.	Rad.-Op.	40	8	30	80	—	Kein Eiweiss, Mo.-Atr
2803	W	53	Arthrit. tbc. d. Ellbogens	Resectio	70	8	80	250	Erbrechen	do.
2804	M	4	Invaginatio. d. Darm.	Laparotomie	70	4	90	170	—	—
2805	W	49	Carcin. mam.	Excis	70	10	60	190	Erbrechen	Kein Eiweiss, Mo.-Atr
2806	W	39	Ovarialcyste	Laparotomie	110	10	70	220	—	do.
2807	W	19	Appendicitis	do.	90	13	30	160	—	do.
2808	W	44	Uterus fibroid.	Hysterectomie	75	7	35	90	Erbrechen	do.
2809	W	63	Lipom	Excis	75	8	12	80	do.	Mo. 0,01
2810	W	44	Fibrom. uteri	Hysterectomie	70	7	75	230	—	do.
2811	M	5	Pes equinus	Tenotomie	35	3	35	75	—	Mo.-Atr.
2812	M	—	Carcin penis recid.	Laparot. Drüse i. Becken ev	90	10	45	245	—	do.
2813	W	9	Hernia umbilic	Rad.-Op.	30	3	15	50	Erbrechen	—
2814	W	53	Lymph. cyste	Exstirp.	70	5	10	80	Leichtes Erbrechen	do.
2815	M	20	Appendicitis	Res. pr. vermif.	80	10	65	220	do	do.
2816	W	6 1/2	Ino. per. luxat. hum.	Blutige Repos.	50	5	110	140	Erbrechen	do.
2817	W	16	Hernia umbilic	Rad.-Op	80	8	25	95	do	do.
2818	M	15 1/2	Schnittwunde	Naht	50	5	70	170	do.	do.
2819	M	51	do.	Excis d kl Fingers	30	3	20	80	do.	do.
2820	M	28	Verletzg. d. kl. Fingers	do.	80	12	20	110	do.	do.
2821	W	46	Ovarialcyste	Exstirpat. d. Cyst.	80	12	70	220	—	Mo.-Atr.
2822	W	50	Carcinom. mam	Exstirp.	95	14	65	150	—	do.
2823	W	37	Hernia ing.	Herniotomie	110	12	85	200	—	do.
2824	W	25	Lipom.	Exstirp	80	8	27	110	—	do.
2825	W	37	Struma colloid.	Strumectomie	80	9	30	115	—	do.
2826	W	27	Ovarialcyste	Ovariotomie	95	12	70	220	—	do.

2827	W	32	Carcin. d. mesenter	Laparotomie	90	8	105	280	Erbrechen	do.	Kein Erweis.	Mo.-Atr.
2828	W	15	Panarium	Exstirp. versch. Teile	60	5	17	70	do.	do.	do.	—
2829	W	18	Haemorrhoiden	Exstirp.	60	7	17	100	—	do.	do.	do.
2830	W	50	Tbc. d. Fussgelenkes	Amputat.	70	5	30	170	—	do.	do.	do.
2831	W	—	Carcinom. uteri	Totale Hysterectomie	70	6	120	220	—	do.	do.	do.
2832	W	5	Tbc. d. Fussgelenkes	Auskratzung	40	4	15	50	Erbrechen	do.	do.	—
2833	W	39	Hernia umbil.	Rad.-Op.	90	10	30	110	—	do.	do.	do.
2834	W	27	Tbc. d. Ellbogengelenkes	Resection	50	4	70	220	Erbrechen	do.	do.	do.
2835	W	34	Oophoritis	Ovariectomie	50	7	120	210	—	do.	do.	do.
2836	M	4	Hyperflex. d. Finger	Plast. Op.	40	30	45	90	—	do.	do.	—
2837	M	28	Fingerverletzung	Amput.	90	10	10	150	—	do.	do.	do.
2838	M	53	Fingerfractur	Rep. Verb.	100	10	25	110	—	do.	do.	do.
2839	M	40	Epidyd tbc.	Castrat.	140	14	25	240	—	do.	do.	do.
2840	M	19	Struma	Strumect.	100	9	45	140	Erbrechen	do.	do.	—
2841	W	6	Luxatio coxae	Bl. Repos.	70	6	105	160	—	do.	do.	do.
2842	M	14	Verletzg. d. r. Zeigefingers	Amput.	50	5	5	70	Erbrechen	do.	do.	do.
2843	M	22	Kl. Tumor (Lipom)	Ablatio	110	8	7	170	—	do.	K. E. v. et n. d. op. M.-Atr.	—
2844	W	48	Ren mobile	Fixation	70	5	105	260	—	do.	Kein Erweis.	Mo.-Atr.
2845	W	33	Cholelith.	Laparotomie	60	5	105	155	—	do.	do.	do.
1846	W	46	Carcin. mam.	Exstirp.	70	5	50	145	—	do.	do.	do.
2847	M	15	Varicocele	do.	80	6	30	130	—	do.	do.	do.
2848	M	10M.	Hernia ing.	Rad.-Op.	35	3	40	105	—	do.	do.	—
2849	W	7	Luxat humeri	Repos.	50	6	16	130	—	do.	do.	—
2850	W	32	Arthrit gen.	Resectio	100	8	55	240	Erbrechen	do.	do.	—

Es würde uns zu weit führen, in alle Details dieser 2850 Aethernarkosen einzutreten; wir sehen uns deshalb gezwungen, die Fälle mehr gruppenweise zu behandeln.

Betreff der Angaben müssen wir bemerken, dass die Vornamen oft ungenügend angegeben waren, teilweise nur der Anfangsbuchstabe, so dass das Geschlecht des Patienten nicht immer festgestellt werden konnte. Infolge mehrfacher Abwesenheit des Hausarztes kamen auch einige Auslassungen in den Aufzeichnungen des Alters etc. vor, die nachher nicht mehr nachgeholt werden konnten. Es ist jedoch diese Auslassung von keiner wesentlichen Bedeutung.

Wir heben aus vorstehenden Tabellen der besseren Uebersicht halber folgende Zahlen hervor:

Von den Narkotisierten waren:

Männlich	1139
Weiblich	1621
Ohne Angabe	100

In Bezug auf das Alter sind:

Kinder unter 1 Jahre	51
1—5 „	145
5—10 „	131
Sodann 10—20 „	475
20—30 „	612
30—40 „	433
40—50 „	337
50—60 „	239
60—70 „	113
70—80 „	28
80—90 „	1
Ohne Altersangabe	285

Dauer der Narkose:

Bis 30 Minuten	1176
30—60 „	1057
60—90 „	409
90—255 „	174
Dauer nicht angegeben	34

Unter den Operationen erwähnen wir vor allem:

72 Alexanderoperationen,
214 Herniotomien,

145 Strumectomien,

366 Laparotomien.

Der Aetherverbrauch bis zum Eintritt der Narkose ist ein sehr verschiedener:

das Minimum ist 10,0,

das Maximum 180,0;

bei 133 Narkosen wurden mehr als 100,0 Aether verbraucht bis zum Eintritt der Narkose. Der Aetherverbrauch bis zum Eintritt der Narkose hängt, abgesehen von der Individualität des zu Narkotisierenden, wesentlich von der Methode der Darreichung ab und natürlich von der vorausgegangenen Anwendung anderer Narcotica, wie Morphinum, Chloroethyl. Im Durchschnitt wurden bei Kindern bis zum Eintritt der Narkose 10,0—20,0 Aether verbraucht; bei Erwachsenen variierte die nötige Menge zwischen 30,0 bis 60,0.

Wie die Menge des zur Narkose notwendigen Aethers, so ist auch die Zeitdauer vom Beginn der Aetherapplikation bis zum Eintritt der Narkose eine sehr verschiedene und hier übt die Methode der Anwendung den grössten Einfluss aus, einen bedeutend grössern als auf die Aethermenge. Wir sehen aus unsern Tabellen, dass in einer nicht geringen Anzahl von Fällen die Narkose in weniger als einer Minute, ja sogar in 30 Sekunden eingetreten ist und wir haben 352 Narkosen verzeichnet, welche in weniger als zwei Minuten eintraten. Das Maximum der Zeitdauer bis zum Eintritt beträgt 24 Minuten. Bei 96 Narkosen verstrichen mehr als 10 Minuten bis zum Eintritt derselben. Die Durchschnittsberechnung ergibt für Kinder eine Zeitdauer von 1—2 Minuten, für Erwachsene von 5—10 Minuten.

Der Gesamtverbrauch an Aether ist natürlich ein sehr verschiedener; die Grenzen liegen da weit auseinander. Die Menge ist keineswegs in direktem Verhältnis zur Dauer der Operation. Die Individualität des Patienten spielt da die grösste Rolle. Wir sehen, dass man bei ziemlich lang, über eine Stunde dauernden Operationen mit einer relativ geringen Aethermenge von 100,0—120,0 auskommen kann, während anderseits ganz kurze Eingriffe grosse Aether-

mengen bis 200,0 und darüber benötigten. Wir haben als Minimum 20,0 Aether für eine Narkose verzeichnet, als Maximum 530,0. In 244 Narkosen wurden über 200,0 Aether verbraucht; in ungefähr 2600 Narkosen ist man also mit weniger als 200,0 Aether ausgekommen.

Wir wollen aber gleich hier bemerken, dass diese Aethermengen wiederum in keinem direktem Verhältnisse stehen zu den Nachwirkungen, namentlich auch nicht zum Erbrechen. Wir sehen Patienten, welche kaum 100,0 Aether erhielten, während und nach der Operation stark erbrechen, während andere mit 3—400,0 Aether nur wenig und gar nicht erbrochen haben.

Wir kommen hiemit zu den Nachwirkungen und wollen das bereits angeführte Erbrechen zuerst erwähnen.

Erbrechen während oder nach der Narkose kam im ganzen bei 987 Narkosen, also ungefähr in 29 % sämtlicher Fälle vor. In einer verschwindend kleinen Zahl von Fällen dauerte das Erbrechen lange, einen halben bis einen ganzen Tag an. Ein-, zwei-, dreimaliges Erbrechen bildet die Regel. Dieses Erbrechen ist gewöhnlich nicht mit der starken Uebelkeit verbunden, wie nach Chloroform. Die Patienten fühlen sich auch nachher schnell wieder wohl und haben nach ganz kurzer Zeit Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme. Viele Patienten haben bald nach dem Erwachen Thee oder Milch oder Suppe genommen, ohne irgendwelche Störung ihres Allgemeinbefindens und nicht wenige haben wenige Stunden nach der Narkose das Spital im besten Wohlbefinden verlassen und sind nach Hause gegangen. Wie sich das Erbrechen bei den Mischnarkosen verhielt, werden wir bei diesen kurz erwähnen.

Aus unsern Angaben geht also hervor, dass das Erbrechen nach Aethernarkosen keineswegs die Regel ist, sondern dass es in unsern Fällen nur ungefähr in 29 % sämtlicher Narkosen vorgekommen ist, dass dieses Erbrechen meist ein sehr leichtes, sich selten wiederholendes und noch seltener länger andauerndes ist. Da Ridgen¹⁾ angibt, dass bei Chloroformnarkosen das Er-

¹⁾ Lancet 1874.

brechen bei 32,8 % der Fälle vorkommt, so ergibt sich, dass der Aether weniger Erbrechen verursacht, als das Chloroform.

Die Cyanose tritt nur bei der Erstickungsmethode auf. Bei richtiger Luft-Aether-Mischung und bei der Julliard'schen Applikationsweise ist sie nicht zu beobachten. Wir finden sie denn auch tatsächlich bei unsern Fällen nur am Anfange, während jener kurzen Zeit, als die Erstickungsmethode angewendet wurde.

Nicht selten beobachtet man das Auftreten eines Erythems im Gesicht, am Körper und an den Extremitäten, welches auf medikamentöse Einwirkung zurückzuführen ist. Es verschwindet sehr bald wieder und ist ohne pathologische Bedeutung.

Namentlich bei aufgeregten Patienten tritt häufig ein starkes Zittern auf, welches, wenn ihm auch keine grosse Bedeutung zukommt, doch für den Operateur hinderlich ist. Durch Morphinuminjektionen kann die Zahl dieser sog. Zitternarkosen bedeutend vermindert werden.

Die schlimmsten Nachwirkungen, die man dem Aether zuschreibt, sind seine reizenden Wirkungen auf die Atmungsorgane und die Nieren.

Was nun die reizende Wirkung des Aethers auf die Atmungsorgane anbetrifft, so ist allerdings zuzugeben, dass der Aether dieselben mehr reizt, als etwa das Chloroform. Dagegen ist nicht zu vergessen, dass je nach der Anwendungsweise des Aethers die Reizwirkung verschieden ausfällt. Während man bei der Erstickungsmethode sehr unangenehme Nebenwirkungen nach dieser Richtung erlebt hat, ist dies bei der milden Anwendungsweise nach Julliard weniger der Fall. Man kann sogar diese Gefahren so sehr verringern, dass hier ein Unterschied von der Chloroformnarkose nicht mehr zu konstatieren ist.

Während nun die allgemeine Ansicht dahin geht, dass Erkrankungen der Luftwege nach einer Aethernarkose auf eine direkte Reizwirkung des Aethers zurückzuführen seien, nehmen Andere, wie Nauwerck und Grossmann den Standpunkt ein, dass mehr die Aspiration infektiösen Mundinhaltes

dafür verantwortlich gemacht werden müsse. Auch Hölscher gibt dieser Meinung Ausdruck, wenn er sagt:

1. Ausser einer geringfügigen vermehrten Schleimabsonderung üben die Aetherdämpfe keinerlei Reizwirkung auf die Tracheal- und Bronchialschleimhaut aus.

2. Das bei der Aethernarkose vorkommende Trachealrasseln beruht immer auf Aspiration von Mundinhalt und ist bei richtiger Technik wohl zu vermeiden.

3. Die nach Aethernarkose auftretenden Krankheiten der Luftwege¹ sind meist die Folge einer solchen Aspiration infektiösen Mundinhaltes.

Wir sind in Uebereinstimmung mit Gerster ebenfalls der Ansicht, dass die starke Schleimabsonderung und die Aspiration des Secretes nicht ohne Bedeutung für die Erkrankung der Luftwege ist. Denn:

1. Wäre die Reizung der Luftwege wirklich eine „spezifische“ Wirkung des Aethers, so müssten die Erkrankungen derselben viel häufiger sein, als sie es in Wirklichkeit sind. In unsern Aethernarkosen finden wir 8 Pneumonien und etwa 1 Dutzend Bronchitiden, also nicht einmal 1 % sämtlicher Fälle. Eine Patientin, welche nach der Narkose an Pneumonie erkrankte, gibt überdies noch an, schon am Tage vor der Narkose Schmerzen und Stechen in der Seite gehabt, dies aber verschwiegen zu haben. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass diese Pneumonie schon vor der Narkose im Entstehen begriffen war.

Angesichts dieser Zahlen von einer direkt reizenden, entzündungserregenden Wirkung des Aethers zu reden, scheint uns zum mindesten sehr gewagt.

2. Die Lungenaffektionen nach Aethernarkose kamen früher bei noch weniger gut ausgebildeter Darreichungsweise häufiger vor, als jetzt. Bei richtiger und sorgfältiger Darreichung lässt sich diese Nachwirkung meist vermeiden. Es liegt nun auf der Hand, dass die Eigenschaften und Wirkungen des Aethers früher und jetzt die gleichen waren. Durch die sorgfältige Darreichung hat man nicht die Wirkungen des Aethers verändern können, wohl aber lässt sich die Aspiration von Schleim entweder ganz verhindern, oder auf ein Minimum beschränken. Man hat noch einen weiteren

Fortschritt gemacht, indem man, wie dies Dastre zuerst getan, die Schleimabsonderung durch vorherige Injektion von Atropin oder wie Becker durch Beimischung von *ol. pini pumilionis* zu vermeiden sucht; der Erfolg ist ein durchaus positiver. Wir führen noch an, dass einer unserer Patienten kurz nach überstandener Pneumonie und einer nach Bronchitis ätherisiert wurde ohne den geringsten Nachteil für die Respirationsorgane. Es wurden auch einige mit *Phthisis pulmonum* behaftete Patienten wegen anderweitiger Affektionen ätherisiert, ohne dass sich der Zustand ihrer Lungen irgendwie veränderte. Dagegen wurde eine bereits bestehende Bronchitis vorübergehend verschlimmert und aus einer zweiten entwickelte sich eine ziemlich schwere Bronchopneumonie. Man wird also bei bestehenden Lungenerkrankungen besser nicht ätherisieren. Für Vermeidung von Lungenerkrankungen nach Aethernarkose wird man sein Augenmerk nicht ohne Erfolg auf die Schleimabsonderung und die Aspiration von Schleim zu richten haben. Je weniger Schleim aspiriert wird, um so weniger sind Katarrhe oder Entzündungen des Respirationstraktus zu fürchten.

Die Erfolge bei den Atropin-injektionen und bei der Beimischung von *ol. pini pumilionis* sind so ermutigend, dass eine Fortsetzung der Versuche in dieser Richtung nur wünschenswert sein kann.

Ein häufig dem Aether gemachter Vorwurf ist der schädliche Einfluss desselben auf die Niere. Der Einwand ist zwar bereits öfters widerlegt worden und wir verweisen diesbezüglich auf die schon oben erwähnte Arbeit von Lerber. Es ist durch zahlreiche Untersuchungen erwiesen, dass nach Narkosen, sei es mit Chloroform, sei es mit Aether, Albuminurie auftrat. v. Lerber zieht aus seinen Untersuchungen folgenden Schluss: Die „Aethernarkose ist im stande, vorübergehende Albuminurie zu erzeugen, doch besteht bei erkrankter Niere keine Indikation, Chloroform statt Aether anzuwenden, weil in Bezug auf die Nephritiden die Verhältnisse beim Chloroform noch ungünstiger sind als beim Aether.“

In den von uns angeführten Fällen wurde in der

Mehrzahl der Urin vor und nach der Narkose auf Eiweiss und teilweise auch auf Zucker untersucht.

Es ergab sich folgendes Resultat:

Vor der Narkose kein Eiweiss — nachher Eiweiss: 33.

„ „ „ Eiweiss, nachher Eiw. Gehalt un-

verändert: 7.

„ „ „ „ „ vermehrt: 1.

„ „ „ „ „ vermindert: 3.

In sämtlichen 33 Fällen, in welchen Eiweiss nach der Narkose auftrat war der Eiweissgehalt ein sehr geringer, oft nur eine Spur und in allen Fällen war das Eiweiss nach 3, höchstens 4 Tagen wieder verschwunden. Zucker wurde nie gefunden. Es ergibt sich hieraus übereinstimmend mit v. Lerber, dass Aether im stande ist, vorübergehende Albuminurie zu erzeugen, dass er dies in unsern Fällen in etwas mehr als 1 % der Fälle getan hat und dass diese Albuminurie sehr schnell und vollständig wieder verschwunden ist. Es ist aber auf die auffällige Tatsache aufmerksam zu machen, dass in 3 Fällen vor der Narkose vorhandener Eiweissgehalt, nachher vermindert war. Es bilden also vorhandene Nierenerkrankungen keine Kontraindikation zur Anwendung des Aethers; der Einfluss auf die Nieren überhaupt ist ein sehr geringer.

Es erübrigt noch zu erwähnen, dass die Aethernarkose in 26 Fällen von ausgesprochenem Vitium cordis angewendet wurde, bei denen eine Chloroformnarkose nicht so indiciert wäre; in allen diesen Fällen war der Verlauf der Narkose ein völlig normaler.

Ferner musste öfters in Notfällen ohne jede Vorbereitung ätherisiert werden, so dass die Patienten kurz vorher gegessen oder getrunken hatten. Der Verlauf dieser Narkosen war keineswegs ein ungünstiger und gerade in Bezug auf das Erbrechen nicht wesentlich schlimmer, als bei vorbereiteten Narkosen. Die Erklärung dieser auffälligen Tatsache findet sich darin, dass, wie auch Garré annimmt, nicht der volle Magen, sondern der zähe Schleim im Rachen die Ursache des Erbrechens zu sein scheint.

Was die Feuergefährlichkeit des Aethers anbetrifft, so ist auch diese vielfach übertrieben worden, Julliard hat

schon seit vielen Jahren bei Gaslicht ätherisiert und nie einen unangenehmen Zwischenfall erlebt. Auch Dumont ätherisiert im Spital Salem die Nottfälle ohne Bedenken bei Gaslicht. Die einzige Bedingung ist, die Lichtquelle etwas oberhalb der Aethermaske zu halten. Da die Aetherdämpfe spezifisch schwerer sind als die Luft, so fallen dieselben zu Boden und können mit der erhöhten Lichtquelle in keine Berührung kommen. Auch die Anwendung des Thermokauters ist möglich, nur nicht in unmittelbarer Nähe der Maske, also nicht am Kopfe. Schon Demme und Bourgeois haben, wie wir eingangs erwähnt, vor mehr als 50 Jahren den Thermokauter in Aethernarkose angewendet. Wir selber sahen ihn mehrmals an der chirurgischen Klinik in Genf durch Julliard anwenden. Auch Dumont hat ihn seit 1886 nicht weniger als 24 Mal angewendet, ohne je etwas Unangenehmes dabei zu erleben. Die Feuergefährlichkeit lässt sich also bei den nötigen Vorsichtsmassregeln meistens vermeiden.

Wir haben anfangs darauf hingewiesen, dass man mehrfach versucht habe, verschiedene Narkotica zu kombinieren, in derselben Narkose nacheinander anzuwenden, um die Narkose weniger gefährlich zu machen und üble Zufälle eher zu vermeiden. Man ging von der Ansicht aus, dass es weniger gefährlich sei, verschiedene Narkotica in geringern Dosen zu verwenden, als ein einziges Narkoticum in grösserer Dosis. In der chirurgischen Klinik in Bern wurde längere Zeit hindurch die Narkose mit Chloroform eingeleitet und mit Aether fortgesetzt; Dr. Wilson in New-York leitete umgekehrt die Narkose mit Aether ein setzte sie mit Chloroform fort. Julliard empfahl, zur Erzielung einer ruhigeren Narkose vorher Morphinum subcutan zu injizieren.

Zuerst Dastre und nach ihm Riedel und Rushmore setzten dem Morphinum noch Atropin zu.

Koenig leitete die Aethernarkose mit 10,0 Chloräthyl ein.

Becker setzte dem Aether ol. pini pumilionis zu.

Auch in unsern Fällen sind zahlreiche Kombinationen versucht worden. Es wurde:

Chloraethyl angewendet in	131	Fällen.
Morphium injiziert in	397	„
Morph-Atropin injiziert in	68	„
Ol. pini pumilionis zugesetzt in	10	„
Mit Somnoform eingeleitet in	1	„

Vergleichen wir nun diese Narkosen (kombinierte Narkosen) mit den übrigen reinen Aethernarkosen, so fällt uns auf den ersten Blick auf, dass der Verbrauch an Aether bis zum Eintritt der Narkose nicht wesentlich kleiner ist; wir brauchen auch hier 40,0—50,0—100,0 Aether zur Erzielung der Narkose. Wir erreichen höchstens eine Verminderung dieser Anfangsmenge von durchschnittlich 10,0 Aether; ebenso verhält es sich mit der Zeit bis zum Eintritt der Narkose; es ist kaum eine Verkürzung dieser Zeit von durchschnittlich 1—2 Minuten zu erzielen. Dies gilt hauptsächlich für die Anwendung von Chloraethyl vor dem Aether.

Bei den Injektionen von Morphinum ist ein Unterschied sowohl in Bezug auf die zur Erzielung der Narkose notwendige Menge Aether, als auch auf die Zeit bis zum Eintritt derselben nicht nachzuweisen. Im Gegensatz hievon hat Comte gefunden, dass bei Mo-Injektionen eher mehr Aether notwendig sei zur Erzielung der Narkose als ohne dieselbe.

Dagegen ist bei den Morphinuminjektionen die Fortsetzung der Narkose leichter als bei der reinen Aethernarkose und bedarf hiezu einer etwas geringen Menge Aether. Unsere Zahlen weisen dies zwar nicht in so auffallender Weise nach, wie Comte in seiner Arbeit: „De l'emploi de l'éther sulfurique à la clinique chirurgicale de Genève“ dies schildert; immerhin ist auch hier ein Unterschied bemerkbar.

Die Kombination Morphinum-Aether erweist sich als besonders vorteilhaft bei Alkoholikern. Es ist ja genügend bekannt, dass die Chloroformnarkose bei Potatoren sehr gefürchtet war und doch kommen gerade diese infolge Unfälle häufig „unters Messer“. Günstiger gestalten sich die Verhältnisse schon bei der reinen Aethernarkose. Wir haben hier wenig zu fürchten; als unangenehme Nebener-

scheinung ist die sehr heftige Excitation zu nennen. Wenn wir nun vor Beginn der Narkose eine Morphinuminjektion machen, so wird auch hier die Narkose ruhiger, die Excitation eine viel geringere.

Was nun die Nachwirkungen betrifft, so haben wir eine Zusammenstellung gemacht in Bezug auf das Erbrechen und haben folgendes Resultat erhalten:

Von sämtlichen 2850 Narkotisierten haben er-	
brochen	987, also 29 %
Bei den reinen Aethernarkosen von 2244	
haben erbrochen	562, also 29 %
Bei vorheriger Anwendung von Chloraethyl	
131 haben erbrochen	63, also 48 %
Bei vorheriger Morphinuminjektion haben von	
397 erbrochen	138, also 35 %
Bei vorheriger Morphinum-Atropin-Injektion	
von 68 haben erbrochen	17, also 25 %

Wir können also den Satz von Comte: Conclusion 4 P. 181: „Les vomissements sont un peu plus fréquents avec la methode combinée“ in Bezug auf die Kombination des Aethers mit Chloraethyl und Morphinum gelten lassen; stehen aber vor der sehr interessanten Tatsache, dass

1. im allgemeinen, wie früher schon betont, nur 29 % sämtlicher mit Aether Narkotisierten erbricht, dass

2. die blosse Morphinuminjektion (von 0,01 Morphinum) diese Zahl etwas erhöht auf 35 %, dass

3. durch Chloraethyl ziemlich häufiger Erbrechen bewirkt wird, als durch die reine Aethernarkose; statt 29 % haben wir hier 48 % der Fälle, und endlich

4. dass die Injektion von Morphinum-Atropin die Häufigkeit des Erbrechens auf 25 % der Fälle reduziert.

Der Unterschied ist doch ein zu auffallender, um nicht volle Beobachtung zu verdienen und es wäre sehr zu wünschen, wenn in dieser Richtung zahlreiche Versuche gemacht würden.

Wie erklärt sich diese auffallende Erscheinung? Nach Ansicht verschiedener Autoren, wie Garré, liegt die Ur-

sache des Erbrechens nicht ausschliesslich in einer direkten Reizung durch den Aether, sondern in dem reichlich abgesonderten Schleim, der sich im Rachen massenhaft ansammelt und teilweise mit Aether durchtränkt, verschluckt wird. Es ist auch nicht der volle Magen, der das Erbrechen bewirkt; denn wir sehen bei unvorbereiteten Narkosen das Erbrechen nicht häufiger auftreten als bei vorbereiteten, d. h. solchen mit leerem Magen und wir sehen namentlich, dass bei diesen letzteren grosse Mengen Schleim erbrochen werden aus dem vorher nüchternen Magen.

Nach der Ansicht genannter Autoren bewirkt dieser angesammelte Schleim reflektorisch das Erbrechen. Da nun das Atropin die Schleimabsonderung vermindert, so hat dasselbe indirekt auch einen günstigen Einfluss auf das Erbrechen und es erklärt sich somit leicht, dass, wie es bei uns der Fall war, das Erbrechen nach vorausgegangenen Morphinum-Atropin-injektionen weniger häufig ist als bei der reinen Aethernarkose und den übrigen Formen der kombinierten Narkosen. Wir kommen also auch hier dazu, wie bei der Aufzählung der Lungenkomplikationen, die Kombinierung des Aethers mit Morphinum-Atropin als eine vorteilhafte anzunehmen. Im Uebrigen ergeben unsere Zahlen über die Mischnarkose mit Morphinum die gleichen Resultate, wie sie Comte in seinen Conclusions P. 180 aufgeführt hat, besonders Conclusion 1: *la methode combinée ne diminue pas le temps nécessaire pour obtenir l'anesthésie.*

Ebenso Conclusion 5: *Chez les alcooliques les injections de morphine diminuent la force et la fréquence de l'excitation,* und: Conclusion 2, Absatz 2:

La quantité d'éther nécessaire pour maintenir le malade anesthésié est notablement plus petite.

Ähnliche Ueberlegungen, wie sie den Atropininjektionen zu grunde liegen, haben Becker bewogen, dem Aether ol. pini pumilionis, Latschenöl, beizumischen. Er schreibt darüber im Zentralblatt für Chirurgie, Jahrg. 1901, es sei zweckmässig, bei der Aethernarkose die Schleimabsonderung so viel als möglich zu vermeiden; er findet aber Atropin für zu gefährlich und wendet statt dessen die Terpene an.

Tierversuche von Rossbach haben gezeigt, dass Einblasungen von reiner Luft in die Trachea die Sekretion vermehren, dass aber Einblasungen von mit Terpentinöl durchtränkter Luft dieselben vermindern, ja gänzlich aufheben kann. Becker zieht aber das Latschenöl dem Terpentinöl vor, weil es bei gleichen Wirkungen angenehmer riecht und auch die Anwendung des Aether für die Patienten angenehmer sei. Becker hat auf je 200 cm³ Aether 20 Tropfen ol. pini pum. zugesetzt, welches sich darin sofort löst und hat mit diesen Mischungen ungefähr 500 Narkosen ausgeführt. Becker hat selbst bei bestehender Bronchitis, bei Lungentuberkulose, Empyem und Emphysem alter Leute Narkosen mit dieser Mischung ausgeführt und irgend welche Verschlimmerung dieser Leiden nicht beobachtet. Wir haben 10 Narkosen nach der Becker'schen Methode verzeichnet; irgend welche Besonderheiten haben dieselben nicht gezeigt. Es findet sich bei diesen 10 Narkosen nur 2 Mal Erbrechen und 1 Mal leichteres Benommensein nach der Narkose angegeben; wir können deshalb auch keine Schlüsse daraus ziehen. Es genügt uns aber zu konstatieren, dass auch Becker die Verminderung der Schleimabsonderung als einen wichtigen Faktoren bei den Aethernarkosen ansieht, also durchaus das gleiche Ziel anstrebt, wie wir mit den Morphinum-Atropininjektionen. Welche der beiden Methoden dieses gemeinsame Ziel besser erreicht, müssen weitere Versuche erst feststellen. Die Hauptsache wäre, dass dieses Ziel überhaupt erreicht und dadurch die Aethernarkose von mancher unangenehmen Neben- und Nachwirkung befreit wird.

Was nun die Kombination des Aethers mit Chloräthyl anbetrifft, so haben wir in unsern 131 Fällen allerdings einen ziemlich grössern Prozentsatz Erbrechen, als bei andern Kombinationen oder bei der reinen Aethernarkose.

Koenig, der eingehende Versuche mit Chloräthyl und mit Chloräthyl-Aether gemacht hat und seine Resultate im Jahre 1900 in seiner Arbeit über Chloräthyl-Narkosen veröffentlichte, führt diesen Umstand ebenfalls an, glaubt aber zugleich, dass dieser Nachteil der Chloräthyl-Aether-

Kombination durch Verbesserungen der Technik zu eliminieren sei, wie es ihm bei seinen Versuchen tatsächlich gelungen ist. Als Vorteil dieser kombinierten Methode muss betont werden, dass

1. die Narkosen sehr leicht eintreten, dass
2. eine möglichst geringe oder gar keine Exzitation eintritt und dass

3. namentlich diese Narkosen für die Patienten sehr angenehm sind. Einer unserer Patienten, der früher schon einmal ätherisiert worden war, erklärte, die Narkose mit Chloraethyl-Aether, sei der frühern, reinen Aethernarkose vorzuziehen. Der Geruch sei angenehmer und es fehle namentlich jedes Erstickungsgefühl.

Wir sind also in Besitze mehrerer, vorteilhafter Kombinationen des Aethers mit andern Narkoticis und werden uns je nach den vorhandenen Indikationen zu der einen oder andern entschliessen.

Wir hatten bei der Besprechung der Nachwirkungen der Aethernarkose bereits Gelegenheit, einige Einwände gegen die Anwendung des Aethers zu widerlegen; es erübrigt uns aber noch, auf weitere Einwände einzutreten.

Es wird vor allem behauptet, der Aether eigne sich nicht für Kinder und ebenso wenig für Patienten in hohem Alter. Sogar Garré, ein warmer Verteidiger des Aethers, schreibt in seinen Mitteilungen aus der chirurgischen Klinik zu Tübingen im Jahre 1891: „Da sich Kinder bekanntlich durch grosse Toleranz gegenüber dem Chloroform auszeichnen, so sehe ich keinen Grund ein, hier dasselbe durch den Aether zu ersetzen. Wir pflegen deshalb Kinder unter 4 Jahren immer mit Chloroform zu narkotisieren.“

Dem kann aber entgegen gehalten werden:

1. dass das Chloroform bei Kindern nicht ungefährlicher ist als bei den Erwachsenen und dass unter den bekannten Chloroform-Todesfällen nicht wenige gerade Kinder betreffen,

2. dass aber die Kinder auch den Aether gut ertragen, dass die Aethernarkosen bei Kindern schön und ohne jeden Zwischenfall verlaufen.

Es wird dies durch die angeführten Narkosen unwider-

leglich bewiesen. Es sind nicht weniger als 51 Kinder, die noch nicht einmal ein Jahr alt waren, teilweise nur wenige Wochen zählten, ohne jeden Zwischenfall mit Aether narkotisiert worden, ferner 145 Kinder unter 5, 131 unter 10 Jahren. Die Narkosen zeichneten sich sämtlich durch sehr raschen Eintritt, durch den ruhigen, glatten Verlauf und durch die geringen Nachwirkungen aus. Erbrechen war bei Kindern nicht einmal häufig. Wir sagen deshalb: Da wir das Aetherisieren als die Normalmethode (nur Kontraindikationen ausgenommen) annehmen und da die Kinder den Aether sehr gut vertragen, so sehen wir keinen Grund ein, hier eine Ausnahme zu machen und den Aether durch Chloroform zu ersetzen. Es bedienen sich denn auch die HH. Prof. Stöös und Tavel in der Kinderklinik zu Bern seit längerer Zeit des Aethers bei ihren Narkosen und zwar mit vollem Erfolge. Julliard bezeichnet den Umstand, dass bei Kindern hie und da die Atmung stille stehe, als nicht so gefährlich, indem das Herz dabei immer ruhig weiter schlage; er sagt: *Je préfère encore exposer les enfants que j'opère à l'arrêt brusque de la respiration par l'éther, accident „plus inquietant que réellement périlleux, plutôt qu'à l'arrêt du coeur par le chloroforme contre lequel on est sans ressources“.*

Es muss übrigens hier nachgetragen werden, dass Garré schon im Jahre 1893 in seiner Arbeit die Aethernarkose p. 40 sagt: Kinder jeden Alters, selbst in den ersten Lebensmonaten, ertragen den Aether sehr leicht. Und Comte führt einen Fall an, wo ein Neugeborner an Hasenscharte in Aethernarkose operiert wurde. Der Vorwurf, Aether eigne sich nicht für Kinder, dürfte damit zur Genüge widerlegt sein.

Der andere Vorwurf, der Aether sei bei Greisen nicht anwendbar, ist, wenn möglich, noch weniger berechtigt als der erstere. Von unsern Fällen wurden in Aethernarkose Patienten operiert:

im Alter von 60—70 Jahren:	113
„ „ „ 70—80 „	28
und über 80 Jahre:	1

Gewiss bilden schon diese Zahlen einen eklatanten

Beweis für die Nichtigkeit des erwähnten Einwandes. Lassen wir noch einige Autoren sprechen. Garré sagt: „Bei Greisen liegt an und für sich noch weniger Grund vor, vom Aether abzusehen, als bei Kindern, es sei denn, dass chronische Veränderungen der Respirationsorgane vorlägen. Gerade mit Rücksicht auf die nicht selten degenerativen Prozesse des Herzmuskels dürfte der Aether vor dem Chloroform den Vorzug verdienen.

Wir sehen also, dass kein Alter eine Gegenanzeige gegen die Aethernarkose abgibt.

Campiche schreibt: „Les vieillards comme les enfants le supportent très bien.“

Es ist uns diese Tatsache jedoch keineswegs auffallend. Durch zahlreiche Versuche ist es bewiesen, dass bei Anwendung des Aethers der Puls besser, kräftiger wurde, dass die Herzaktion sich hebe. Wenn wir nun bedenken, dass, wie Garré dies ebenfalls anführt, im Greisenalter die Herztätigkeit durch degenerative Prozesse im Herz gewöhnlich eine mehr oder weniger geschwächte ist, so besteht nicht nur keine Kontraindikation gegen die Anwendung des Aethers bei Greisen, sondern geradezu eine Indikation für die Aethernarkose.

Im Jahre 1901 erschien in Lausanne von Campiche eine ziemlich ausführliche Arbeit, betitelt: Contribution à l'étude de la narcose à l'éther. Sie behandelt 745 Operationen, wovon 511 mit Aether und 205 mit Chloroform narkotisiert wurden; bei den übrigen wurden Mischnarkosen angewendet: Chloroform-Aether oder umgekehrt. Wir wollen von seinen Schlussfolgerungen nur zwei herausnehmen; vor allem conclusion 7: „l'éther étant moins dangereux que le chloroforme, doit être adopté comme l'anesthésique de choix à cause des avantages énormes qu'il a sur son rival.“

Diese Schlussfolgerung findet sich in Uebereinstimmung mit einer grossen Anzahl von Arbeiten und Publikationen und die grosse Zahl der Chirurgen schliesst sich derselben an.

Anders verhält es sich mit der Conclusion 6, welche lautet: „Mais, chez la grande majorité des malades, il ne

donne lieu à des accidents, que s'il est associé à certaines interventions particulièrement favorables à l'éclosion des complications pulmonaires, ce sont: les opérations de hernie, les laparotomies et les strumectomies.“ Diesen zweiten Satz mit der darin enthaltenen, sehr weit gehenden Einschränkung in der Anwendung der Aethernarkose können wir an Hand unserer Statistik nicht als richtig anerkennen. Wir haben oben nicht weniger als 214 Herniotomien, 145 Strumektomien und 366 Laparotomien angeführt, die seit 1885 unter Aethernarkose gemacht worden sind, also im ganzen 725 Operationen, welche Campiche als besonders günstig für den Eintritt von Komplikationen namentlich von Seite der Lungen bezeichnet. Und hiebei können die Operateure mit voller Befriedigung auf den Verlauf dieser Aethernarkosen und dieser Operationen zurückblicken. Die Komplikationen waren keineswegs häufiger, als bei andern Eingriffen. Die Laparotomien verliefen ruhig, ohne jede Störung; ebenso die Herniotomien. Bei den Strumen finden wir häufig die Bezeichnungen: magna, permagna, profunda, maligna; wir finden dabei erwähnt, dass sie durch Druck auf die Trachea Dyspnoe erzeugt hatten etc. Trotz aller dieser gewiss ungünstigen Momente, ist bei dieser grossen Zahl von Strumektomien keine einzige schwere Komplikation zu verzeichnen. Angesichts dieser Zahlen wird man es selbstverständlich finden, wenn wir den Absatz 2 der Conclusion 6 von Campiche nicht beipflichten können.

Da wir nun gerade bei den Laparotomien sind, so wollen wir einem Einwande begegnen, der noch sehr oft, namentlich von den Gynaicologen erhoben wird, nämlich der mangelhaften Muskelentspannung in der Aethernarkose. Diese mangelnde Erschlaffung der Bauchmuskeln hindere länger dauernde Eingriffe; es sei deshalb der Aether bei denselben nicht zu gebrauchen.

Auch Howald macht darauf aufmerksam, dass die Muskeler Erschlaffung schwer zu erzielen sei und gibt an, dass bei länger dauernder Narkose die krampfhaften Atembewegungen der Bauchmuskeln ein bedeutendes Hindernis bilden. Er zieht daraus den Schluss, dass sich die Aethernarkose

besonders eigne für gynaicologische Untersuchungen, die wenig Zeit beanspruchen, und für kurzdauernde Operationen, wo eine gute Analgesie verlangt wird z. B. Entfernung von Polypen, Uterusauskrazungen, Onkotomien etc.

Wir halten auch dem gegenüber die von uns angeführten zahlreichen Laparotomien, welche nicht nur kurze Eingriffe darstellen, sondern 2 Stunden und mehr dauerten und bei denen die Operateure nicht unter mangelhafter Entspannung der Muskeln oder unter krampfartigen Bewegungen der Bauchmuskeln zu leiden hatten. Wir finden bei sämtlichen 366 Laparotomien nie eine solche Bemerkung angebracht; sondern es wurde im Gegenteil öfters dabei bemerkt: völlige Entspannung der Muskeln und ähnliches.

Interessant ist es der obigen Schlussfolgerung Howald's eine Notiz Fueters gegenüber zu stellen, gemäss welcher im geraden Gegensatz zu ersterem Prof. Vaucher in Genf die Aethernarkose für gewisse Operationen von langer Dauer anwandte, z. B. bei Abdominaltumoren, während er bei kleineren gynaicologischen Eingriffen chloroformiert.

Wir halten also dafür, dass man, wie dies in unsern Fällen getan wurde, sowohl bei kurz als bei lange dauernden gynaicologischen Eingriffen den Aether verwenden dürfe. Ein gleiches hat nach der Angabe von Fueter Prof. Jentzer in Genf seit 1881 getan, „der bei allen chirurgischen Eingriffen seiner geburtshilflich-gynaicologischen Praxis die Aethernarkose anwendet, stets damit zufrieden war und dabei nie Unglück gehabt hat.“

An der geburtshilflich-gynaicologischen Klinik in Bonn wurden diesbezüglich die ganz gleichen Erfahrungen gemacht.

Breitenbach schreibt aus genannter Klinik: „Es zeigte sich die Muskelereschlaffung der Bauchdecken auch in Aethernarkose als vollständig; komplizierte Untersuchungen daher ebenso leicht möglich, als in Chloroformnarkose und selbst bei ausgedehnten Bewegungen des Zwerchfelles wurde der Operateur bei Laparotomien unter Anwendung der

Trendelenburg'schen Hochlagerung nicht von den Därmen belästigt. Nicht weniger war die Erschlaffung oder Beckenmuskulatur eine vollständige, so dass bei Operationen per vaginam die Dislokation der zu operierenden Partien in dem Bereich der äussern Genitalien leicht zu stande gebracht werden konnte. Unsere Erfahrungen mit der Aethernarkose sind also ganz vorzügliche; sie leistet für alle gynaicologischen Eingriffe die besten Dienste und ist nicht genug vor dem Chloroform zu empfehlen.“

Wie erklären sich aber die so verschiedenen Resultate der Beobachtungen über die Aethernarkose? Wir halten dafür, dass dies zum grossen Teile von der Applikationsweise und von der grössern oder geringern Uebung des Narkotiseurs herrührt. Die Einleitung einer Narkose, sei es mit diesem oder jenem Narkotikum, ist eine der wichtigsten und verantwortungsvollsten Handlungen in der gesamten ärztlichen Tätigkeit. Es ist dies eine Handlung, die man trotz ihrer Wichtigkeit nach absolviertem Staatsexamen noch nicht beherrscht, sondern erst lernen und üben muss.

So haben wir denn auch bei unsern Narkosen die Beobachtung gemacht, dass jeweilen beim Eintritt eines andern Assistenten resp. Narkotiseurs anfangs die Narkosen weniger gut verliefen und dass namentlich mehr Aether verbraucht werden musste, um denselben Effekt zu erzielen, als bei einem geübten Assistenten. Es waren jedesmal beim Eintritt eines andern Narkotiseurs eine Anzahl Narkosen notwendig, bis derselbe die Narkosen beherrschte und die letztern wieder völlig ruhig verliefen.

So erklären wir uns denn auch, dass man bei einigen Versuchen mit Aether über mangelhafte Wirkung des Aethers, über spät eintretende Narkose, über unvollständige Narkose etc. etc. klagt, während man an andern Orten bessere Erfolge aufweisen kann. Schon Julliard macht auf diesen Punkt aufmerksam. Es ist aber die Methode der Aetherisierung sehr wichtig, weshalb wir auf dieselbe kurz eintreten wollen. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass auch für die Aethernarkose eine richtige Vorbereitung des Patienten von grösster Wichtigkeit ist.

Für die Darreichungsweise des Aethers unterscheidet man 2 Methoden.

1. Die sogenannte Erstickungsmethode. Bei derselben werden gleich anfangs etwa 50—60 cm³ Aether in die Maske gegossen und dieselbe rasch aufgesetzt. Diese Methode hat den Vorteil, dass die Narkose sehr rasch, schon nach 1—2 Minuten eintritt. Sie ist jedoch sehr unangenehm für die Patienten; dieselben haben das Gefühl, als müssten sie ersticken, daher der Name. Die Initialerscheinungen sind aber sehr heftige: starke Aufregung, Husten, Cyanose, stertoröse Atmung und oft sogar Asphyxie. Dumont und Fueter haben diese Methode nur im Anfänge angewendet.

Ohne dass sie dabei einen unangenehmen Zwischenfall erleben mussten, haben sie sich doch dieser schweren Anfangerscheinungen wegen bald zu der 2. Methode bekehrt, zur Julliard'schen Methode.

Der Vorgang bei derselben ist folgender: Patient wird in Rückenlage gebracht und von allen beengenden Kleidungsstücken befreit. Sodann wird er angehalten Mund und Augen zu schliessen und nur durch die Nase zu atmen. In die unten beschriebene Maske werden 20 grm. Aether eingegossen und dieselbe ganz langsam und allmählig dem Gesichte des Patienten genähert. Dies hat den Vorteil, dass Patient nicht plötzlich vom Aether, wir möchten sagen über-rumpelt wird, sondern dass er sich allmählig daran gewöhnt; zudem ist auf diese Weise noch der Zutritt frischer Luft ermöglicht.

Nach ungefähr 1—2 Min. wird eine zweite, gleich grosse Dosis in die Maske gegossen. Nun wird über die Maske eine Kompresse gelegt, welche die erstere etwas überragt. Diese Kompresse hat nur den Zweck, zu verhindern, dass die Aetherdämpfe, die seitlich ausströmen, sich in's ganze Zimmer verbreiten. Nach kurzer Zeit tritt nun gewöhnlich der Schlaf ein; bisweilen ist man allerdings genötigt, weiter Aether zuzugiessen, um eine richtige Narkose zu erzielen. Es soll dies aber vorsichtig geschehen, damit nicht Aether auf das Gesicht des Patienten hinunter läuft. Es ist nun keineswegs nötig, den Puls des Patienten beständig zu kontrollieren, wie beim Chloroform. Der Nar-

kontinuierliche Lüftung von Zeit zu Zeit die Maske und beobachte die Gesichtsfarbe; im übrigen richte er sein ganzes Augenmerk auf die Respiration. So lange diese regelmässig ist, ist keine Gefahr vorhanden. Wird die Atmung unregelmässig, so lüftet man fleissig die Maske, lässt frische Luft eintreten und hebt den Unterkiefer nach vorn so, dass die untere Zahnreihe vor die obere zu stehen kommt. Nachher wird langsam und vorsichtig die Narkose wieder aufgenommen. Dies ist gegenwärtig allgemein anerkannt das beste Verfahren beim Aetherisieren.

Man hat der Aethernarkose vorgeworfen, sie sei zu schwierig und bedürfe zu komplizierter Apparate. Nichts ist unrichtiger als das; denn zweifellos die einfachste Maske ist die von Dumont modifizierte Julliard'sche Maske: Ein einfaches Drahtgestell mit Wachstuch überzogen; in dem Gestell ist ein zweiter, innerer Bogen, der sich in einer Scharnier öffnen und schliessen lässt. Zwischen Gestell und Bogen wird eine mehrfache Schicht hydrophiler Gase beschichtet, in deren Mitte sich eine Flanellrosette befindet. Gase und Flanellwatte können bei dieser Maske leicht jedesmal durch neue ersetzt werden. Diese Julliard'sche Aetherisierungsmethode und die Julliard-Dumont'sche Aethernmaske haben sich vor allen andern Methoden und Masken als die einfachsten praktischen und besten bewährt und finden vielfache Verwendung.

Noch auf 2 Punkte, die sich aus unserer Statistik ergeben, muss hingewiesen werden. Es ist vor allem der tadellose Verlauf der Aethernarkosen bei Patienten, welche mit Herzfehlern behaftet waren. Hier, wo das Chloroform so gefürchtet ist, haben wir im Aether ein Narkotikum, das ohne Bedenken angewendet werden kann und von Dumont auch in einer Reihe von Fällen angewendet worden ist mit dem besten Resultate: der Puls wurde jeweilen voller und kräftiger, die Herzaktion eine bedeutend bessere.

Ebenso wichtig scheint uns aber der andere Punkt zu sein: der überaus gute Verlauf der Aethernarkosen bei Zahnoperationen. Von 67 aufgezeichneten Zahnarkosen fanden wir keine einzige Komplikation von Belang; dieselben verliefen alle glatt. Wir würden also auch in Zu-

kunft für die Zahnoperationen immer wieder die Aethernarkose anempfehlen,

So sehr jedoch alle diese Erfahrungen zu gunsten des Aethers sprechen, so haben wir leider auch bei dieser Narkose Todesfälle zu beklagen. Bei diesen Fällen ist jedesmal genau zu prüfen, ob es sich um einen Todesfall handelt, der dem Anaesthetikum als solchem zur Last zu legen ist, oder um einen solchen, der während der Narkose unter jedem andern Narkotikum vorkommen würde. Wir haben leider bei unserer Statistik von beiden Categorien je einen Fall zu verzeichnen.

Der 1. Fall betrifft Nr. 223 einen 49jährigen Mann mit einem Abscess der Gallenblase, der perforiert war und secundäre Peritonitis erzeugt hatte. Es wurde die Laparotomie angeführt. Die Narkose leitete Herr Dr. Fueter, ein mit der Aethernarkose durchaus vertrauter Collega. Bis zum Eintritt der Narkose wurden 50 cm³ Aether verbraucht; die Narkose trat schon nach zwei Minuten ein. Der Eintritt der Narkose war also ein sehr rascher; er war ruhig, ohne Excitation; keine starke Salivation, kein Brechreiz. Patient schläft ganz gut, bis nach Verlauf von nicht ganz einer Stunde er zu stöhnen und zu reagieren anfängt. Etwas Aether macht ihn wieder insensibel und er schläft ruhig weiter. Bald darauf reagiert er wieder und spannt. Conjunctivalreflex ist vorhanden; Patient sieht aber bloss aus, atmet unregelmässig und oberflächlich; kein Rasseln. Die Zunge wird sofort hervorgezogen und künstliche Respiration eingeleitet. Die Atmung stockt plötzlich trotz aller Wiederbelebungsversuche; auch das Herz steht ebenfalls nach einigen Schlägen plötzlich still. Es wird sofort zur Blosslegung des Herzens geschritten und letzteres massiert. Dabei werden nur einige Flimmerbewegungen verursacht. Das Blut des Patienten war nicht schwarz. Für die ganze Narkose, die etwas weniger als eine Stunde dauerte, wurden nur 75 cm³ Aether verbraucht, also eine sehr geringe Menge. Der Verlauf dieses Falles ist vom Bilde des Aethertodes so vollständig verschieden, dass es sicherlich nicht dem Aether zugeschrieben werden kann. Es handelt sich hier vielmehr unzweifelhaft um einen deutlich ausge-

sprochenen Fall von Shock, dessen Eintritt durch folgende Umstände sehr begünstigt wurde:

1. Patient war vor Operation durch lange Krankheit sehr heruntergekommen;

2. Er stand unter Opiumwirkung;

3. Es bestand bereits secundäre Peritonitis.

Dieser Fall wurde dem Professor Julliard zur Beurteilung unterbreitet. Auch er theilte die Auffassung, dass es sich um keinen eigentlichen Aethertodesfall handle.

Anders dagegen liegen die Verhältnisse bei dem 2. Fall (Nr. 2630):

Patient, 42 Jahre alt, an doppelseitiger tuberc. Epididymitis und linkseitiger Leistenhernie leidend, war durch vorausgegangene Malariaerkrankung schon bedeutend abgeschwächt. Ueberdies liess sich der Patient zu wenig zur Operation vorbereiten und trat aus ausseren Gründen erst am Abend vor der Operation in's Spital ein. Patient war vor der Narkose sehr ruhig. Der narkotisierende Assistent, Herr Dr. Galli, gibt zwar an, Patient sei erst nach 16 Minuten (?) eingeschlafen; es scheint uns dies aber unwahrscheinlich und auch Dr. Dumont kann sich nicht erinnern, dass Patient so auffallend spät eingeschlafen sei. Die Narkose verlief anfangs normal; nur war Patient etwas blass und hatte profusen Schweiss. Es wurde zuerst die Herniotomie ausgeführt, dann links das tbc. Nebenhodengewebe excidirt. Inzwischen war von Anfang der Narkose an gerechnet ungefähr eine Stunde verstrichen und man war an die Operation der rechten Seite übergegangen, als beim Patient Rasseln auftrat, aus der Nase reichlicher, blutig tingierter Schleim zu fliessen begann. Sofort ward die Maske beseitigt, der Schleim entfernt, Kiefer nach vorn emporgehoben. Als trotzdem die Cyanose stärker und das Blut schwarz zu werden begann, wurde sofort zur künstlichen Atmung geschritten, unter Inversion des Patienten.

Mit jedem Druck auf die seitlichen Thoraxpartien entleert sich aus der Trachea zuerst eine Unmasse blutiger, rötlichen Schleimes mit Luftblasen untermischt, daneben

gelblich-bräunliches Wasser. Sofort wird die Tracheotomie ausgeführt. Durch die Kanäle fliesst ununterbrochen Schlamm und braune Flüssigkeit aus. Die Pupillen sind ad maximum erweitert, keine aktivem Atemzüge mehr sichtbar, kein Herzstoss mehr hörbar. Der Exitus ist eingetreten infolge acuten Lungenödems. Sektion: Lungen ad maximum gebläht, so dass das Pericard fast ganz davon bedeckt wird. Herz von normaler Grösse und normaler Consistenz; ziemlich viel epicardiales Fett. Aus allen Bronchien und Alveolen fliesst in massenhafter Menge rötlich trübe, mit spärlichen Luftblasen untermischte Flüssigkeit. Luftgehalt ist absolut verschwunden; die Lungen lassen sich vollständig auspressen. In der linken Lunge sind diese Verhältnisse noch auffallender als in der rechten. Keine hyperämischen Partien in den Lungen erkennbar, keine Spitzentuberkulose, keine umschriebenen, pneumonischen oder katarrhalischen Prozesse. Das Ganze bietet, wie vorausgesetzt, das Bild des typischen, akuten Lungenödems dar.

Daneben ist die Milz stark vergrössert, Kapsel geschrumpft, wahrscheinlich chronischer Malaria-Milz-Tumor.

Wir haben also hier ein vom ersten durchaus verschiedenes Bild und stehen nicht an, diesen Fall leider als Aethertod zu bezeichnen.

Fragen wir uns noch, was sich aus unserer Statistik für Indikationen und Kontraindikationen zur Anwendung des Aethers ergeben, so ist das Resultat kurz folgendes. Wir haben bei der Aethernarkose einzig von Seite der Atmungsorgane etwas zu fürchten. Es bilden also auch einzig Erkrankungen dieser Organe eine Kontraindikation zur Aethernarkose. Wenn also Knapp in New-York gar keine Kontraindikation gelten lassen will, so ist das wohl zu weit gegangen. Wir halten deshalb, gestützt auf die Beobachtungen an unsern Narkosen, dafür, dass das Aetherisieren das Normalverfahren und nur bei Behinderung der Atmung oder bei Affektionen der Atmungsorgane durch ein anderes Narkoticum zu ersetzen sei.

Fassen wir unsere angeführten Fälle nochmals in's

Auge, so halten wir dafür, dass diese 2850 Aethernarkosen allerdings noch keine grosse Statistik darstellen, dass sie aber doch zahlreich genug sind, besonders im Hinblick auf die genauen Beobachtungen und Notierungen, um namentlich im Vergleich und in Verbindung mit den Beobachtungen und Erfahrungen an andern chirurgischen Instituten einige Schlüsse über die Verwendbarkeit des Aethers zur Narkose zu ziehen. Unsere Schlüsse sind daher kurz folgende:

1. *Der Aether ist ein vorzügliches Narkoticum und in der Mehrzahl der Fälle dem Chloroform vorzuziehen.*

2. *Der Aether ermöglicht eine vollständige Narkose, sowie eine völlige Entspannung der Muskeln, so dass er auch für alle gynaecologischen Fälle, für Laparotomien unbeachtet der Zeitdauer des Eingriffes zu empfehlen ist.*

3. *Der Aether ist auch bei Herzfehlern und Schwachzuständen des Herzens gestattet, wo Chloroform meistens kontraindiziert ist; ebenso eignet sich Aether besser bei Alkoholikern der geringen Gefährlichkeit wegen, als Chloroform.*

4. *Der Aether eignet sich vortrefflich als Narkoticum zu zahnärztlichen Operationen.*

5. *Eine Altersgrenze zur Anwendung des Aethers gibt es nicht, weder nach unten, noch nach oben.*

6. *Eine Gegenanzeige gegen den Aether von Seite der Nieren existiert nicht. Bestehende Nierenaffektionen werden durch die Aethernarkose nicht verschlimmert. Die bisweilen nach Aether beobachtete Albuminurie ist eine vorübergehende und durchaus harmloser Natur.*

7. *Bei bestehenden akuten Lungenaffektionen ist der Aether kontraindiziert.*

8. *Das Erbrechen ist bei Aethernarkosen jetzt schon weniger häufig, als bei Chloroform und lässt sich durch Kombinationen mit andern Narkoticis wahrscheinlich noch vermindern.*

9. *Die Kombinationen des Aethers mit Chloräthyl, mit Morphinum, mit Morphinum-Atropin, mit ol. pumilionis erweisen sich je nach dem Zwecke, den man im Auge hat, als vorteilhaft.*

10. *Das Erlernen und Einüben des Aetherisierens ist zur Erzielung eines glatten Verlaufes der Narkose erforderlich.*

Zum Schlusse möchten wir noch einen Ausspruch des ehrwürdigen greisen Chirurgen Julliard in Genf anführen; er sagt:

Tout homme qui se fait endormir par l'éther ou par le chloroforme risque sa vie.

Il la risque cent fois moins avec l'éther qu'avec le chloroforme.

De deux maux inévitables, je choisis le moindre!



Literatur:

1. Kocher, Encyklopädie der gesamten Chirurgie.
2. — Chirurgische Operationslehre. 4. Auflage.
3. v. Lerber, Einwirkung der Aethernarkose auf Blut und Urin.
4. Fueter, Klin. und experiment. Beobachtungen über die Aethernarkose.
5. Koenig, Die Chloraethylnarkose.
6. Haslebach, Experiment. Beobachtungen über die Nachwirkungen bei der Bromaethyl- und Chloraethylnarkose.
7. Howald, Ueber die Aethernarkose in der Geburtshülfe u. Gynaecologie.
8. Breitenbach, Ueber die Aethernarkose und ihre Bedeutung für die Gynaecologie.
9. Julliard, L'éther est-il préférable au chloroforme?
10. Conte, De l'emploi de l'éther sulfurique à la clinique chirurgicale à Genève.
11. Campiche, Contribution à l'étude de la narcose à l'éther.
12. Garré, Aether oder Chloroform?
13. Gavé, Die Aethernarcose.
14. *Korrespondenzblatt für Schweizerärzte.*
15. *Zentralblatt für Chirurgie.*

